

Rapport nr. 441500.009

**Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en  
SOA-poliklinieken: Tabellen 1997 en 1998**

Bijlage bij: Jaarverslag 1997 en 1998 (441500.008);

M.J.W. van de Laar, J. Rijlaarsdam, T. Coenen <sup>1</sup>

februari 2000

1 Stichting SOA-bestrijding

Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten laste van Inspectie voor de Gezondheidszorg in het kader van het project 441500, "Epidemiologie en surveillance van SOA".

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, 3720 BA Bilthoven,  
telefoon: 030 - 274 91 11, fax: 030 - 274 29 71



## Verzendlijst

1	Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg
2-3	Ministerie van VWS, Directeur-generaal
4-5	Inspecteur Infectieziekten van de Inspectie Gezondheidszorg
6	Hoofdinspectie voor de preventieve en curatieve gezondheidszorg
7	Voorzitter van de Gezondheidsraad
8-9	Landelijke Vereniging voor GGD's
10	Landelijk Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding
11-27	Streeklaboratoria
28-45	Leden IGZ-infectieziekten overleg RIVM
46-105	Sociaal verpleegkundigen SOA/AIDS bestrijding, GGD's
106-165	Artsen infectieziektenbestrijding, GGD's
166	Landelijk Overleg Infectieziektenbestrijding
167-172	Hoofden SOA-poliklinieken
173	Prof.dr.J.van der Meer, Nederlandse Vereniging voor Infectieziekten
174	Prof. dr. H. Verbrugh, Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
175-177	Stichting soa-bestrijding
178	Stichting AIDS Fonds
179-185	Nationale werkgroep herziening SOA-surveillance (17)
186-188	Bestuur SOA-commissie, Ned. Ver. Dermatologie en Venereologie
189-198	Bestuur Nederlandse Vereniging voor Studie van SOA
199-200	Ziekenfondsraad
201	Dr. H. Bijkerk
202	Depot Nederlandse Publicaties en Nederlandse bibliografie
203	Directie RIVM
204	Prof. dr. ir. D. Kromhout
205	Dr. M.A.E. Conyn-van Spaendonck
206	Dr. J.G. Loeber
207	Dr. T.G. Kimman
208	Dr. ir. A.M. Henken
209	Dr. ir. J.C. Seidell
210	Dr. P.G.N. Kramers
211-250	Medewerkers Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie
251-253	Auteurs
254	Hoofd Voorlichting en Public Relations RIVM
255	Bibliotheek RIVM
256	Bureau Rapportenregistratie
257-299	Bureau Rapportenbeheer



## INHOUD

Toelichting op de gegevensverwerking en tabellen

<b>DEEL A NATIONALE GEGEVENS 1997</b>	<b>9</b>
CONSULTEN EN KENMERKEN BEZOEKERS	9
1 Aantal consulten naar GGD en soort uitgevoerd onderzoek	9
2 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek	10
3 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek	10
4a Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD	10
4b Reden van SOA-onderzoek en HIV-test	11
4c Aantal consulten naar reden van bezoek en soort onderzoek met diagnose	11
5 Aantal bezoekers naar leeftijd en geslacht	11
6 Aantal bezoekers naar land van herkomst en geslacht	12
7 Aantal mannen naar seksuele gerichtheid en uitgevoerd onderzoek	12
8a Aantal mannen naar prostitutie en uitgevoerd onderzoek	12
8b Aantal vrouwen naar prostitutie en uitgevoerd onderzoek	12
9 Aantal bezoekers naar druggebruik en geslacht	13
10 Aantal bezoekers naar SOA in anamnese en geslacht	13
GESTELDE DIAGNOSES EN KENMERKEN VAN PATIENTEN	14
11 Aantal gestelde diagnoses naar geslacht	14
11a Aandeel van verschillende diagnoses naar geslacht	15
11b Lokalisatie i.g.v. gonorrhoe (incl. PVG), naar geslacht	16
11c Lokalisatie i.g.v. chlamydia-infectie, naar geslacht	16
12 Aantal infecties in geval van gestelde diagnose	16
13a Diagnoses naar leeftijd, mannen	17
13b Diagnoses naar leeftijd, vrouwen	17
14a Diagnoses naar land van herkomst, mannen	18
14b Diagnoses naar land van herkomst, vrouwen	18
15 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen	19
16a Diagnoses naar prostitutie, mannen	19
16b Diagnoses naar prostitutie, vrouwen	19
17 Diagnoses naar druggebruik, mannen en vrouwen	20
18a Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen	20
18b Diagnoses naar soort SOA in anamnese, mannen	20
18c Diagnoses naar soort SOA in anamnese, vrouwen	21
19 Aantal HIV-testen met uitslag naar geslacht en risicogroep	21

<b>DEEL B</b>	<b>NATIONALE GEGEVENS 1998</b>	<b>23</b>
<b>CONSULTEN EN KENMERKEN BEZOEKERS</b>		<b>23</b>
1	Aantal consulten naar GGD en soort uitgevoerd onderzoek	23
2	Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek	24
3	Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek	24
4a	Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD	24
4b	Reden van SOA-onderzoek en HIV-test	25
4c	Aantal consulten naar reden van bezoek en soort onderzoek met diagnose	25
5	Aantal bezoekers naar leeftijd en geslacht	25
6	Aantal bezoekers naar land van herkomst en geslacht	26
7	Aantal mannen naar seksuele gerichtheid en uitgevoerd onderzoek	26
8a	Aantal mannen naar prostitutie en uitgevoerd onderzoek	26
8b	Aantal vrouwen naar prostitutie en uitgevoerd onderzoek	26
9	Aantal bezoekers naar druggebruik en geslacht	27
10	Aantal bezoekers naar SOA in anamnese en geslacht	27
<b>GESTELDE DIAGNOSES EN KENMERKEN VAN PATIENTEN</b>		<b>28</b>
11	Aantal gestelde diagnoses naar geslacht	28
11a	Aandeel van verschillende diagnoses naar geslacht	29
11b	Lokalisatie i.g.v. gonorrhoe (incl. PVG), naar geslacht	30
11c	Lokalisatie i.g.v. chlamydia-infectie, naar geslacht	30
12	Aantal infecties in geval van gestelde diagnose	30
13a	Diagnoses naar leeftijd, mannen	31
13b	Diagnoses naar leeftijd, vrouwen	31
14a	Diagnoses naar land van herkomst, mannen	32
14b	Diagnoses naar land van herkomst, vrouwen	32
15	Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen	33
16a	Diagnoses naar prostitutie, mannen	33
16b	Diagnoses naar prostitutie, vrouwen	33
17	Diagnoses naar druggebruik, mannen en vrouwen	34
18a	Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen	34
18b	Diagnoses naar soort SOA in anamnese, mannen	34
18c	Diagnoses naar soort SOA in anamnese, vrouwen	35
19	Aantal HIV-testen met uitslag naar geslacht en risicogroep	35

**DEEL C TRENDOVERZICHTEN SOA 1991-1998 37**

20	Aantal gediagnosticeerde SOA en aantal consulten, 1991-1998	37
20a	Aantal diagnoses en percentage per jaar, 1992-1998	37
21a	Aantal diagnoses en percentage per jaar, heteroseksuele mannen	38
21b	Aantal diagnoses en percentage per jaar, homo- en biseksuele mannen	38
22a	Aantal diagnoses en percentage per jaar, vrouwen, niet werkzaam in de prostitutie	39
22b	Aantal diagnoses en percentage per jaar, vrouwen, werkzaam in de prostitutie	39

**DEEL D GEGEVENS VOOR GGD'S AFZONDERLIJK 1997 41**

1.	GG en GD Amsterdam	41
2.	GG en GD Utrecht	49
3.	GGD Rotterdam e.o.	57
4.	GGD Arnhem	65
5.	GGD Regio Nijmegen	73
6.	GGD Den Haag	81
7.	GGD Midden Brabant	89
8.	GGD Groningen Stad en Ommelanden	97
9.	GGD Noord Kennemerland	105
10.	GGD Leiden e.o.	113
11.	DGD Zuidelijk Zuid-Limburg	121
12.	GGD Zuid Kennemerland	129

**DEEL E GEGEVENS VOOR GGD'S AFZONDERLIJK 1998 137**

1.	GG en GD Amsterdam	137
2.	GG en GD Utrecht	145
3.	GGD Rotterdam e.o.	153
4.	GGD Arnhem	161
5.	GGD Regio Nijmegen	169
6.	GGD Den Haag	177
7.	GGD Midden Brabant	185
8.	GGD Groningen Stad en Ommelanden	293
9.	GGD Noord Kennemerland	201
10.	GGD Leiden e.o.	209
11.	DGD Zuidelijk Zuid-Limburg	217
12.	GGD Zuid Kennemerland	225





## DEEL A. NATIONALE GEGEVENS 1997 CONSULTEN EN KENMERKEN BEZOEKERS

Tabel 1: Aantal consulten naar GGD en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek	HIV test	beide	totaal 1997	% incl. A'dam	% excl. A'dam	totaal 1996
GGD en GD Amsterdam	.	.	.	15625	61.24	.	1848
GG en GD Utrecht	539	281	700	1520	5.96	15.37	1654
GGD regio Nijmegen	604	196	3	803	3.15	8.12	735
GGD regio Arnhem	539	119	49	707	2.77	7.15	761
GGD Midden Brabant	465	167	.	632	2.48	6.39	603
GGD Groningen Stad en Ommelanden	508	1	107	616	2.42	6.23	516
DGD Zuidelijk Zuid Limburg	328	86	35	449	1.76	4.54	401
GGD Rotterdam e.o.	287	126	18	431	1.69	4.36	1496
GGD Noord Kennemerland	232	114	75	421	1.65	4.26	499
GGD Leiden e.o.	96	311	.	407	1.60	4.12	444
GGD Den Haag	300	40	2	342	1.34	3.46	636
GGD Zuid Kennemerland	86	194	10	290	1.14	2.93	380
GGD Stadsgewest Breda	141	113	19	273	1.07	2.76	242
GGD regio IJssel-Vecht	119	120	38	277	1.09	2.80	252
GGD Stadsgewest Den Bosch	111	72	25	208	0.82	2.10	.
GGD Oostelijk Zuid Limburg	78	108	18	204	0.80	2.06	168
GGD Eemland	22	137	.	159	0.62	1.61	146
GGD Midden IJssel	69	55	19	143	0.56	1.45	122
GGD Oost Veluwe	30	93	5	128	0.50	1.29	84
GGD Kop van Noord-Holland	64	21	23	108	0.42	1.09	83
GGD Noord Limburg	44	56	6	106	0.42	1.07	75
GGD Delfland	.	105	.	105	0.41	1.06	4
GGD Flevoland	44	44	15	103	0.40	1.04	238
GGD Westfriesland	42	50	6	98	0.38	0.99	106
GGD Gooi en Vechtstreek	26	64	2	92	0.36	0.93	161
GGD Zuid-Holland Zuid	.	98	.	98	0.38	0.99	89
GGD Zeeland	46	14	20	80	0.31	0.81	102
GGD West-Veluwe/Vallei	11	73	.	84	0.33	0.85	93
GGD Westelijk Noord Brabant	22	54	1	77	0.30	0.78	130
GGD regio Achterhoek	30	26	20	76	0.30	0.77	51
GGD Midden Holland	18	53	5	76	0.30	0.77	92
GGD Noord-Friesland	68	.	.	68	0.27	0.69	45
GGD West-Holland	.	64	.	64	0.25	0.65	85
GGD Amstelland-De Meerlanden	.	59	3	62	0.24	0.63	24
GGD regio Twente, Almelo	18	28	14	60	0.24	0.61	25
GGD De Friese Wouden	23	26	5	54	0.21	0.55	44
GGD Zaanstreek	15	32	4	51	0.20	0.52	25
GGD Westelijk Mijnstreek	8	26	9	43	0.17	0.43	91
GGD Rivierenland	15	16	10	41	0.16	0.41	24
GGD Waterland	11	23	8	42	0.16	0.42	43
GGD regio Twente, Hengelo	7	23	7	37	0.15	0.37	218
GGD Rijnstreek	.	34	.	34	0.13	0.34	32
GGD Zuidhollandse Eilanden	29	1	.	30	0.12	0.30	11
GGD Noordwest Veluwe	8	9	11	28	0.11	0.28	40
GGD regio Twente, Enschede	6	7	12	25	0.10	0.25	148
GGD Midden Limburg	2	22	1	25	0.10	0.25	57
GGD Zuid-West Friesland	21	.	.	21	0.08	0.21	11
GGD Midden Kennemerland	17	.	.	17	0.07	0.17	9
GGD Zuid-Oost Drenthe	17	.	.	17	0.07	0.17	27
GGD Noord & Midden Drenthe	11	.	.	11	0.04	0.11	5
GGD Zuidwest Drenthe	3	.	.	3	0.01	0.03	3
GGD Zuid-Oost Brabant	1	1	.	2	0.01	0.02	.
GGD Zuid-Oost Utrecht	.	.	.	.	.	.	10
GGD Brabant Noord-Oost	.	.	.	.	.	.	4
onbekend	11	11	3	25	0.10	0.25	3
Totaal excl. Amsterdam	.	.	.	9888	38.76	100.00	11378
<b>TOTAAL</b>	<b>5207</b>	<b>3373</b>	<b>1308</b>	<b>25513</b>	<b>100.00</b>	<b>.</b>	<b>13226</b>

Tabel 2: Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Man	2280	43.85	1836	54.66	589	45.03	4705	47.68	5521	48.52
Vrouw	2919	56.13	1517	45.16	717	54.82	5153	52.22	5834	51.27
Onbekend	1	0.02	6	0.18	2	0.15	9	0.09	23	0.20
<b>TOTAAL</b>	<b>5200</b>	<b>52.70</b>	<b>3359</b>	<b>34.04</b>	<b>1308</b>	<b>13.26</b>	<b>9867</b>	<b>100.00</b>	<b>11378</b>	<b>100.0</b>

Tabel 3: Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	418	8.03	378	11.21	151	11.54	947	9.58	1013	8.90
februari	362	6.95	339	10.05	120	9.17	821	8.30	948	8.33
maart	382	7.34	284	8.42	64	4.89	730	7.38	962	8.45
april	376	7.22	292	8.66	97	7.42	765	7.74	797	7.00
mei	365	7.01	309	9.16	73	5.58	747	7.55	873	7.67
juni	422	8.10	266	7.89	111	8.49	799	8.08	827	7.27
juli	500	9.60	321	9.52	111	8.49	932	9.43	965	8.48
augustus	493	9.47	247	7.32	95	7.26	835	8.44	990	8.70
september	538	10.33	207	6.14	123	9.40	868	8.78	1036	9.11
oktober	512	9.83	279	8.27	152	11.62	943	9.54	1171	10.29
november	447	8.58	209	6.20	115	8.79	771	7.80	925	8.13
december	389	7.47	241	7.14	95	7.26	725	7.33	839	7.64
onbekend	3	0.06	1	0.03	1	0.08	5	0.05	32	0.28
<b>TOTAAL</b>	<b>5207</b>	<b>100.00</b>	<b>3373</b>	<b>100.00</b>	<b>1308</b>	<b>100.00</b>	<b>9888</b>	<b>100.00</b>	<b>11378</b>	<b>100.0</b>

Tabel 4a: Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>										
SOA-onderzoek	2071	44.02	2698	52.36	1	11.11	4770	48.34	5113	44.94
HIV-test	1728	36.73	1454	28.22	6	66.67	3188	32.31	4787	42.07
beide	770	16.37	856	16.61	2	22.22	1628	16.50	1422	12.50
onbekend	136	2.89	145	2.81	.	.	281	2.85	56	0.49
<b>TOTAAL</b>	<b>4705</b>	<b>100.00</b>	<b>5153</b>	<b>100.00</b>	<b>9</b>	<b>100.00</b>	<b>9867</b>	<b>100.00</b>	<b>11378</b>	<b>100.0</b>

Tabel 4b: Reden voor SOA-onderzoek en HIV-test (meer redenen per client mogelijk)

	SOA onderzoek				HIV test			
	1997 aantal	%	1996 aantal	%	1997 aantal	%	1996 aantal	%
klachten	2860	32.5	3301	40.6	206	3.4	211	2.7
begin nieuwe relatie	749	8.5	409	5.0	1618	26.6	1802	22.7
kinderwens	64	0.7	46	0.6	123	2.0	141	1.8
eigen risicogedrag	2410	27.4	1923	23.6	2642	43.4	3362	42.4
risicogedrag partner	749	8.5	499	6.1	552	9.1	685	8.6
partner HIV positief	102	1.2	7	0.1	56	0.9	45	0.6
gewaarschuwd door partner	339	3.9	326	4.0	33	0.5	34	0.4
gewaarschuwd door SV *	48	0.5	64	0.8	1	0.0	4	0.1
gewaarschuwd door anders	126	1.4	55	0.7	53	0.9	93	1.2
periodieke controle	658	7.5	810	10.0	146	2.4	234	3.0
na seksueel geweld	245	2.8	123	1.5	113	1.9	140	1.8
extreme angst	128	1.5	87	1.1	234	3.8	289	3.6
prik accident	9	0.1	3	0.0	38	0.6	62	0.8
i.v.m. verzekering	2	0.0	.	.	23	0.4	26	0.3
onbekend	79	0.9	292	3.6	57	0.9	576	7.3
anders	228	2.6	191	2.3	197	3.2	225	2.8
<b>TOTAAL</b>	<b>8796</b>	<b>100.0</b>	<b>8136</b>	<b>100.0</b>	<b>6092</b>	<b>100.0</b>	<b>7929</b>	<b>100.0</b>

\*SV= Sociaal-verpleegkundige

Tabel 4c: Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

reden bezoek =>	SOA				totaal	
	onderzoek	HIV test	beide	onbekend	1997	1996
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	13	2	13	28	46
geen SOA onderzoek, HIV negatief	13	3040	233	59	3345	4794
SOA positief, geen HIV test	1624	42	53	131	1850	2419
SOA positief, HIV positief	2	.	.	2	4	5
SOA positief, HIV negatief	6	4	124	13	147	246
SOA negatief, geen HIV test	3096	63	142	56	3357	2851
SOA negatief, HIV positief	.	.	1	.	1	3
SOA negatief, HIV negatief	33	36	1079	8	1156	1014
<b>TOTAAL</b>	<b>4774</b>	<b>3198</b>	<b>1634</b>	<b>282</b>	<b>9888</b>	<b>11378</b>

Tabel 5: Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>										
<14	22	0.47	41	0.80	.	.	63	0.64	76	0.67
15-19	166	3.53	646	12.54	.	.	812	8.23	1383	12.16
20-24	859	18.26	1575	30.56	2	22.22	2436	24.69	2908	25.56
25-29	1055	22.42	1193	23.15	1	11.11	2249	22.79	2349	20.65
30-34	850	18.07	683	13.25	2	22.22	1535	15.56	1633	14.35
35-39	567	12.05	377	7.32	1	11.11	945	9.58	1043	9.17
40-44	372	7.91	237	4.60	.	.	609	6.17	683	6.00
45-54	474	10.07	250	4.85	1	11.11	725	7.35	761	6.69
>54	209	4.44	55	1.07	.	.	264	2.68	292	2.57
??	131	2.78	96	1.86	2	22.22	229	2.32	250	2.20
<b>TOTAAL</b>	<b>4705</b>	<b>100.00</b>	<b>5153</b>	<b>100.00</b>	<b>9</b>	<b>100.00</b>	<b>9867</b>	<b>100.00</b>	<b>11378</b>	<b>100.0</b>

Tabel 6: Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>										
Nederland	3723	79.13	4018	77.97	7	77.78	7748	78.52	9147	80.39
Turkije	81	1.72	30	0.58	.	.	111	1.12	149	1.31
Marokko	73	1.55	29	0.56	.	.	102	1.03	149	1.31
Sur./ Ant./ Aru.	128	2.72	93	1.80	1	11.11	222	2.25	476	4.18
overig	609	12.94	871	16.90	1	11.11	1481	15.01	1179	10.36
onbekend	91	1.93	112	2.17	.	.	203	2.06	278	2.44
<b>TOTAAL</b>	<b>4705</b>	<b>100.00</b>	<b>5153</b>	<b>100.00</b>	<b>9</b>	<b>100.00</b>	<b>9867</b>	<b>100.00</b>	<b>11378</b>	<b>100.0</b>

Tabel 7: Aantal consulten naar seksuele gerichtheid en uitgevoerd onderzoek, mannen

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>										
heteroseksueel	1705	74.78	1474	80.28	466	79.12	3645	77.47	4442	80.46
homoseksueel	281	12.32	192	10.46	67	11.38	540	11.48	687	12.44
biseksueel	84	3.68	54	2.94	31	5.26	169	3.59	194	3.51
onbekend	210	9.21	116	6.32	25	4.24	351	7.46	198	3.59
<b>TOTAAL</b>	<b>2280</b>	<b>100.0</b>	<b>1836</b>	<b>100.0</b>	<b>589</b>	<b>100.0</b>	<b>4705</b>	<b>100.0</b>	<b>5521</b>	<b>100.0</b>

Tabel 8a: Aantal consulten naar prostitutie en uitgevoerd onderzoek, mannen

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>										
prostitu�e	20	0.91	7	0.39	7	1.22	34	0.75	31	0.56
prostituuant	309	14.11	134	7.48	54	9.39	497	10.91	718	13.00
geen van beide	1701	77.67	1486	82.97	485	84.35	3672	80.60	4105	74.35
onbekend	160	7.31	164	9.16	29	5.04	353	7.75	667	12.08
<b>TOTAAL</b>	<b>2190</b>	<b>100.0</b>	<b>1791</b>	<b>100.0</b>	<b>575</b>	<b>100.0</b>	<b>4556</b>	<b>100.0</b>	<b>5521</b>	<b>100.0</b>

Tabel 8b: Aantal consulten naar prostitutie en uitgevoerd onderzoek, vrouwen

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>										
prostitu�e	817	28.97	43	2.91	142	20.08	1002	20.02	1213	20.79
prostituante	3	0.11	2	0.14	2	0.28	7	0.14	11	0.19
geen van beide	1883	66.77	1310	88.63	536	75.81	3729	74.51	4063	69.64
onbekend	117	4.15	123	8.32	27	3.82	267	5.33	547	9.38
<b>TOTAAL</b>	<b>2820</b>	<b>100.0</b>	<b>1478</b>	<b>100.0</b>	<b>707</b>	<b>100.0</b>	<b>5005</b>	<b>100.0</b>	<b>5834</b>	<b>100.0</b>

Tabel 9: Aantal consulten naar druggebruik en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DRUGGEBRUIK</b>										
ja, intraveneus	166	3.53	138	2.68	.	.	304	3.08	40	0.4
ja, niet intraveneus	210	4.46	184	3.57	.	.	394	3.99	210	1.8
ja, onbekend	48	1.02	80	1.55	.	.	128	1.30	198	1.7
Nee									9111	80.1
Onbekend	4281	90.99	4751	92.20	.	.	9041	91.63	1819	16.0
<b>TOTAAL</b>	<b>4705</b>	<b>100.00</b>	<b>5153</b>	<b>100.00</b>	<b>9</b>	<b>100.00</b>	<b>9866</b>	<b>100.00</b>	<b>11378</b>	<b>100.0</b>

Tabel 10: Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>										
ja, ooit een SOA	713	15.15	741	14.38	1	11.11	1455	14.75	1784	15.7
ja, ooit twee SOA	4	0.09	6	0.12	.	.	10	0.10	157	1.38
Nee	3237	68.80	3585	69.57	7	77.78	6829	69.21	8169	71.80
Onbekend	751	15.96	821	15.93	1	11.11	1573	15.94	1268	11.14
<b>TOTAAL</b>	<b>4705</b>	<b>100.00</b>	<b>5153</b>	<b>100.00</b>	<b>9</b>	<b>100.00</b>	<b>9867</b>	<b>100.00</b>	<b>11378</b>	<b>100.0</b>

**GESTELDE DIAGNOSES EN KENMERKEN VAN PATIENTEN**

Tabel 11: Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	mannen		vrouwen		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>										
Gonorrhoe (excl.PVG)	134	2.78	57	1.06			191	1.87	320	2.7
Gonorrhoe: PVG	4	0.08	2	0.04			6	0.06	7	0.1
Syfilis: niet gespecificeerd	15	0.31	10	0.19			25	0.25	6	0.1
" : primair	30	0.62	18	0.34			48	0.47	75	0.6
" : secundair	8	0.17	12	0.22			20	0.20	32	0.3
" : latens recens	20	0.42	21	0.39			41	0.40	54	0.5
" : latens tarda	7	0.15	4	0.07			11	0.11	16	0.1
Chlamydia infectie	296	6.14	382	7.11			678	6.65	791	6.7
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	33	0.68	31	0.58			64	0.63	77	0.6
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.			.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	6	0.12	11	0.20			17	0.17	14	0.1
" : primo: HSV type 2	10	0.21	5	0.09			15	0.15	29	0.2
" : recidief	10	0.21	7	0.13			17	0.17	16	0.1
Genitale wratten	155	3.22	143	2.66			298	2.92	396	3.3
Hepatitis B: acuut	7	0.15	2	0.04			9	0.09	22	0.2
Hepatitis B: chronisch	3	0.06	7	0.13			10	0.10	3	0.0
Niet Specifieke Urethritis	92	1.91	16	0.30			108	1.06	217	1.8
Bacteriele Vaginose	6	0.12	174	3.24			180	1.76	214	1.8
Trichomoniasis	4	0.08	46	0.86			50	0.49	85	0.7
Candidiasis	46	0.95	235	4.37			281	2.75	349	2.9
Schaamluis	18	0.37	4	0.07			22	0.22	30	0.3
Scabies	14	0.29	11	0.20			25	0.25	50	0.4
Ulcus molle	1	0.02	.	.			1	0.01	4	0.0
Granuloma inguinale	.	.	.	.			.	.	1	0.0
Overig/ niet gespecificeerd	24	0.50	36	0.67			60	0.59	104	0.9
PID	.	.	3	0.06			3	0.03	3	0.0
HIV +	17	0.35	16	0.30			33	0.32	54	0.5
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>960</i>	<i>19.92</i>	<i>1253</i>	<i>23.32</i>			<i>2213</i>	<i>21.70</i>	<i>2969</i>	<i>25.0</i>
HIV -	2408	49.97	2218	41.29	8	88.89	4634	45.43	6054	51.0
Nihil *	1451	30.11	1901	35.39	1	11.11	3353	32.87	2851	24.0
<b>TOTAAL</b>	<b>4819</b>	<b>100.0</b>	<b>5372</b>	<b>100.0</b>	<b>9</b>	<b>100.0</b>	<b>10200</b>	<b>100.0</b>	<b>11874</b>	<b>100.0</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 11a: Aandeel van verschillende diagnoses naar geslacht (jaarlijks totaal SOA=100%)

	<b>man</b>	<b>vrouw</b>	<b>totaal 1997</b>	<b>totaal 1996</b>
Chlamydia infectie	30.83	30.49	30.64	26.6
Genitale wratten	16.15	11.41	13.47	13.34
Candidiasis	4.79	18.75	12.70	11.75
Gonorrhoe (excl.PVG)	13.96	4.55	8.63	10.78
Bacteriele Vaginose	0.63	13.89	8.13	7.21
Syfilis: totaal	8.33	5.19	6.55	6.16
Herpes genitalis: primo + recidief	6.15	4.31	5.11	4.58
Niet Specifieke Urethritis	9.58	1.28	4.88	7.31
Overig/ niet gespecificeerd	2.50	2.87	2.71	3.50
Trichomoniasis	0.42	3.67	2.26	2.86
HIV +	1.77	1.28	1.49	1.82
Scabies	1.46	0.88	1.13	1.68
Schaamluis	1.88	0.32	0.99	1.01
Hepatitis B: chronisch	3.13	0.56	0.45	0.10
Hepatitis B: acuut	0.73	0.16	0.41	0.74
Gonorrhoe: PVG	0.42	0.16	0.27	0.24
PID	.	0.24	0.14	0.10
Ulcus molle	0.10	.	0.05	0.13
Granuloma inguinale	.	.	.	0.03
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	960	1253	2213	2969

Tabel 11b: Lokalisatie i.g.v. gonorrhoe (include. PVG), naar geslacht

	man		vrouw		totaal	
	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>						
urethraal/cervicaal	110	94.02	49	96.08	159	94.64
anaal/rectaal	2	1.71	1	1.96	3	1.79
mond/keel	4	3.42	1	1.96	5	2.98
oog	1	0.85	.	.	1	0.60
onbekend	.	.	.	.	.	.
<b>TOTAAL</b>	117	100.00	51	100.00	168	100.00

Tabel 11c: Lokalisatie i.g.v. chlamydia-infectie, naar geslacht

	man		vrouw		totaal	
	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>						
urethraal/cervicaal	240	97.56	305	98.39	545	98.02
anaal/rectaal	4	1.63	3	0.97	7	1.26
mond/keel	.	.	2	0.65	2	0.36
oog	2	0.81	.	.	2	0.36
onbekend	.	.	.	.	.	.
<b>TOTAAL</b>	246	100.00	310	100.00	556	100.00

Tabel 12: Aantal infecties in geval van gestelde diagnose, naar geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>AANTAL SOA</b>								
enkele infectie	805	89.94	992	87.63	1797	88.65	2497	91.83
dubbele infecties	83	9.27	129	11.40	212	10.46	195	7.17
drievoudige infecties	7	0.78	10	0.88	17	0.84	26	0.96
viervoudige infecties	.	.	1	0.09	1	0.05	1	0.04
<b>TOTAAL</b>	895	100.00	1132	100.00	2027	100.00	2719	100.00



Tabel 13a: Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorrhoe	1	0.72	6	4.35	20	14.49	30	21.74	29	21.01	20	14.49	10	7.25	13	9.42	7	5.07	2	1.45		138
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	2	5.26	6	15.79	8	21.05	5	13.16	7	18.42	7	18.42	3	7.89	.	.		38
Chlamydia	.	.	11	3.72	56	18.92	92	31.08	51	17.23	36	12.16	14	4.73	20	6.76	11	3.72	5	1.69		296
herpes genitalis	.	.	2	3.39	7	11.86	12	20.34	16	27.12	6	10.71	7	11.86	6	10.17	3	5.08	.	.		59
genitale wratten	2	1.29	3	1.94	29	18.71	39	25.16	34	21.94	11	7.10	11	7.10	22	14.19	3	1.94	1	0.65		155
overig	1	0.39	7	2.72	21	8.17	42	16.34	50	19.46	40	15.56	32	12.45	34	13.23	23	8.95	7	2.72		257
HIV+	.	.	1	5.88	.	.	3	17.65	3	17.65	5	29.41	2	11.76	3	17.65	.	.	.	.		17
Nihil *	18	0.47	137	3.60	732	19.21	848	22.26	675	17.72	450	11.81	296	7.77	373	9.79	163	4.28	118	3.10		3810
<b>TOTAAL</b>	<b>22</b>	<b>0.46</b>	<b>167</b>	<b>3.50</b>	<b>867</b>	<b>18.18</b>	<b>1072</b>	<b>22.47</b>	<b>866</b>	<b>18.16</b>	<b>573</b>	<b>12.01</b>	<b>379</b>	<b>7.95</b>	<b>478</b>	<b>10.02</b>	<b>213</b>	<b>4.47</b>	<b>133</b>	<b>2.79</b>		<b>4770</b>

Tabel 13b: Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorrhoe	.	.	7	11.86	13	22.03	15	25.42	9	15.25	6	10.17	4	6.78	2	3.39	.	.	3	5.08		59
Syf.: Pr. & S.	.	.	1	3.33	6	20.00	7	23.33	6	20.00	2	6.67	1	3.33	3	10.00	4	13.33	.	.		30
Chlamydia	1	0.26	72	18.85	138	36.13	96	25.13	32	8.38	17	4.45	10	2.62	7	1.83	1	0.26	8	2.09		382
herpes genitalis	.	.	6	11.11	14	25.93	11	20.37	10	18.52	2	3.70	5	9.26	3	5.56	3	5.56	.	.		54
genitale wratten	2	1.40	23	16.08	45	31.47	35	24.48	16	11.19	5	3.50	6	4.20	8	5.59	2	1.40	1	0.70		143
overig	2	0.35	89	15.64	164	28.82	132	23.20	85	14.94	38	6.68	31	5.45	17	2.99	3	0.53	8	1.41		569
HIV+	.	.	.	.	4	25.00	4	25.00	3	18.75	2	12.50	2	12.50	.	.	.	.	1	6.25		16
Nihil *	36	0.90	472	11.74	1228	30.54	924	22.98	534	13.28	309	7.68	185	4.60	213	5.30	42	1.04	78	1.94		4021
<b>TOTAAL</b>	<b>41</b>	<b>0.78</b>	<b>670</b>	<b>12.70</b>	<b>1612</b>	<b>30.57</b>	<b>1224</b>	<b>23.21</b>	<b>695</b>	<b>13.18</b>	<b>381</b>	<b>7.22</b>	<b>244</b>	<b>4.63</b>	<b>253</b>	<b>4.80</b>	<b>55</b>	<b>1.04</b>	<b>99</b>	<b>1.88</b>		<b>5274</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 14a: Diagnoses naar land van herkomst, mannen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	76	55.07	8	5.80	4	2.90	9	6.52	40	28.99	1	0.72	138
Syfilis: Prim. & Sec.	13	34.21	2	5.26	1	2.63	4	10.53	18	47.37	.	.	38
Chlamydia infectie	189	63.85	11	3.72	4	1.35	21	7.09	64	21.62	7	2.36	296
Herpes genitalis	29	49.15	.	.	1	1.69	5	8.47	22	37.29	2	3.39	59
Genitale wratten	96	61.94	3	1.94	4	2.58	4	2.58	45	29.03	3	1.94	155
Overig	164	63.81	11	4.28	6	2.33	14	5.45	60	23.35	2	0.78	257
HIV+	4	23.53	.	.	.	.	1	5.88	11	64.71	1	5.88	17
Nihil	3181	83.49	50	1.31	54	1.42	75	1.97	375	9.84	75	1.97	3810
<b>TOTAAL</b>	3752	78.66	85	1.78	74	1.55	133	2.79	635	13.31	91	1.91	4770

Tabel 14b: Diagnoses naar land van herkomst, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	31	52.54	.	.	.	.	5	8.47	23	38.98	.	.	59
Syfilis: Prim. & Sec.	6	20.00	.	.	2	6.67	1	3.33	19	63.33	2	6.67	30
Chlamydia infectie	274	71.73	2	0.52	3	0.79	10	2.62	85	22.25	8	2.09	382
Herpes genitalis	31	57.41	.	.	.	.	.	.	23	42.59	.	.	54
Genitale wratten	96	67.13	1	0.70	1	0.70	2	1.40	40	27.97	3	2.10	143
Overig	349	61.34	4	0.70	4	0.70	21	3.69	176	30.93	15	2.64	569
HIV+	3	18.75	1	6.25	.	.	.	.	12	75.00	.	.	16
Nihil	3294	81.92	24	0.60	20	0.50	60	1.49	535	13.31	88	2.19	4021
<b>TOTAAL</b>	4084	77.44	32	0.61	30	0.57	99	1.88	913	17.31	116	2.20	5274

Tabel 15: Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	62	44.93	37	26.81	5	3.62	34	24.64	138
Syfilis: Prim. & Sec.	18	47.37	2	5.26	.	.	18	47.37	38
Chlamydia infectie	218	73.65	33	11.15	3	1.01	42	14.19	296
Herpes genitalis	33	55.93	5	8.47	.	.	21	35.59	59
Genitale wratten	80	51.61	23	14.84	4	2.58	48	30.97	155
Overig	165	64.20	33	12.84	23	8.95	36	14.01	257
HIV+	2	11.76	3	17.65	2	11.76	10	58.82	17
Nihil	3098	81.31	416	10.92	139	3.65	157	4.12	3810
<b>TOTAAL</b>	<b>3676</b>	<b>77.06</b>	<b>552</b>	<b>11.57</b>	<b>176</b>	<b>3.69</b>	<b>366</b>	<b>7.67</b>	<b>4770</b>

Tabel 16a: Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	31	24.41	82	64.56	14	11.02	127
Syfilis: Prim. & Sec.	1	2.86	16	45.71	14	40.00	4	11.43	35
Chlamydia infectie	3	1.08	23	8.27	223	80.22	30	10.43	278
Herpes genitalis	.	.	5	9.62	45	86.54	2	3.85	52
Genitale wratten	3	2.16	14	10.07	116	83.45	6	4.32	139
Overig	2	0.83	44	18.18	178	73.56	18	7.44	242
HIV+	1	7.69	3	23.08	9	69.23	.	.	13
Nihil	24	0.64	374	10.03	3045	81.64	287	7.69	3730
<b>TOTAAL</b>	<b>34</b>	<b>0.74</b>	<b>510</b>	<b>11.05</b>	<b>3712</b>	<b>80.42</b>	<b>360</b>	<b>7.79</b>	<b>4616</b>

Tabel 16b: Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	27	49.09	.	.	20	36.36	8	14.55	55
Syfilis: Prim. & Sec.	10	38.46	.	.	14	53.85	2	7.69	26
Chlamydia infectie	72	20.00	.	.	262	72.78	26	7.22	360
Herpes genitalis	5	10.42	.	.	40	83.33	3	6.25	48
Genitale wratten	16	12.60	.	.	110	86.61	1	0.79	127
Overig	178	32.66	1	0.18	342	62.76	24	4.40	545
HIV+	3	23.08	.	.	10	76.92	.	.	13
Nihil	724	18.37	6	0.15	2997	76.08	213	5.40	3941
<b>TOTAAL</b>	<b>1035</b>	<b>20.23</b>	<b>7</b>	<b>0.14</b>	<b>3796</b>	<b>74.22</b>	<b>277</b>	<b>5.41</b>	<b>5115</b>

Tabel 17: Diagnoses naar druggebruik, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	<b>ja, intraveneus</b>		<b>ja, niet intraveneus</b>		<b>ja, onbekend wat</b>		<b>nee</b>		<b>onbekend</b>		<b>totaal</b>	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>												
Gonorrhoe	9	4.57	3	1.52	5	2.54	.	.	180	91.37	197	1.96
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	2	2.94	.	.	.	.	66	97.06	68	0.67
Chlamydia infectie	11	1.62	30	4.41	19	2.80	.	.	620	91.18	680	6.75
Herpes genitalis	3	2.65	.	.	.	.	.	.	110	97.35	113	1.12
Genitale wratten	3	1.01	9	3.02	2	0.68	.	.	284	95.30	298	2.96
Overig	43	5.19	32	3.86	11	1.32	.	.	742	89.61	828	8.22
HIV+	2	6.06	.	.	2	6.06	.	.	29	87.88	33	0.33
Nihil	247	3.14	326	4.15	115	1.16	.	.	7194	91.55	7858	78.00
<b>TOTAAL</b>	<b>318</b>	<b>3.16</b>	<b>402</b>	<b>3.99</b>	<b>126</b>	<b>1.29</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>9225</b>	<b>91.56</b>	<b>10075</b>	<b>100.0</b>

Tabel 18a: Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	<b>ja, ooit een SOA gehad</b>		<b>ja, ooit twee keer SOA gehad</b>		<b>nee</b>		<b>onbekend</b>		<b>totaal</b>
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	52	26.40	2	1.02	70	35.53	73	37.06	197
Syfilis: Prim. & Sec.	13	19.12	.	.	13	19.12	42	61.76	68
Chlamydia infectie	148	21.76	.	.	377	55.44	155	22.79	680
Herpes genitalis	18	15.93	.	.	53	46.90	42	37.17	113
Genitale wratten	49	16.44	2	0.67	153	51.34	94	31.54	298
Overig	156	18.84	3	0.36	457	55.19	212	25.60	828
HIV+	3	9.09	1	3.03	9	27.27	20	60.61	33
Nihil	1050	13.36	2	0.03	5799	73.80	1007	12.81	7858
<b>TOTAAL</b>	<b>1489</b>	<b>14.78</b>	<b>10</b>	<b>0.10</b>	<b>6931</b>	<b>68.79</b>	<b>1645</b>	<b>16.33</b>	<b>10075</b>

Tabel 18b: Diagnoses naar soort SOA in anamnese, mannen (percentages in horizontale richting)

	<b>gonorrhoe</b>		<b>syfilis</b>		<b>chlamydia</b>		<b>andere soa</b>		<b>nooit</b>		<b>onbekend</b>		<b>totaal</b>	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>														
Gonorrhoe	32	23.19	1	0.72	3	2.17	5	3.62	47	34.06	50	36.23	138	2.89
Syfilis: Prim. & Sec.	7	18.42	1	2.63	.	.	.	.	6	15.79	24	63.16	38	0.80
Chlamydia infectie	35	11.82	2	0.68	24	8.11	17	5.74	163	55.07	55	18.58	296	6.21
Herpes genitalis	4	6.78	3	5.08	.	.	4	6.77	27	45.76	21	35.59	59	1.24
Genitale wratten	8	5.16	.	.	7	4.52	10	6.46	75	48.39	55	35.48	155	3.25
Overig	24	9.34	10	3.89	15	5.84	19	7.40	126	49.03	73	24.51	257	5.39
HIV+	1	5.88	.	.	1	5.88	1	5.88	2	11.76	12	70.59	17	0.36
Nihil	158	4.15	23	0.60	136	3.57	176	4.62	2823	74.09	494	12.97	3810	79.87
<b>TOTAAL</b>	<b>269</b>	<b>5.64</b>	<b>40</b>	<b>0.84</b>	<b>186</b>	<b>3.90</b>	<b>232</b>	<b>4.87</b>	<b>3269</b>	<b>68.53</b>	<b>774</b>	<b>16.23</b>	<b>4770</b>	<b>100.0</b>

Tabel 18c: Diagnoses naar soort SOA in anamnese, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	gonorroe		syfilis		chlamydia		andere soa		nooit		onbekend		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>														
Gonorroe	5	8.47	1	1.69	4	6.78	3	5.08	23	38.98	23	38.98	59	1.12
Syfilis: Prim. & Sec.	2	6.67	2	6.67	1	3.33	.	.	7	23.33	18	60.00	30	0.57
Chlamydia infectie	10	2.62	3	0.79	41	10.73	15	3.93	214	56.02	99	25.91	382	7.24
Herpes genitalis	.	.	1	1.85	3	5.56	3	5.56	26	48.15	21	38.89	54	1.02
Genitale wratten	2	1.40	1	0.70	10	6.99	13	9.09	78	54.55	39	27.28	143	2.71
Overig	15	2.64	10	1.76	35	6.15	29	5.10	331	58.17	149	26.19	569	10.79
HIV+	1	6.25	.	.	.	.	.	.	7	43.75	8	50.00	16	0.30
Nihil	59	1.47	18	0.45	247	6.14	233	5.79	2959	73.59	505	12.56	4021	76.24
<b>TOTAAL</b>	<b>94</b>	<b>1.78</b>	<b>36</b>	<b>0.68</b>	<b>341</b>	<b>6.47</b>	<b>296</b>	<b>5.61</b>	<b>3645</b>	<b>69.11</b>	<b>862</b>	<b>16.34</b>	<b>5274</b>	<b>100.0</b>

Tabel 19: Aantal HIV-testen met uitslag naar geslacht en risicogroep

	hetero m		homo-bi m		prostitutee v		non-pr v		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>UITSLAG</b>										
HIV+	2	0.1	5	1.9	3	1.6	10	0.6	20	0.5
HIV-	1938	99.9	254	98.1	182	98.4	1833	99.4	4207	99.5
<b>TOTAAL</b>	<b>1940</b>	<b>100</b>	<b>259</b>	<b>100</b>	<b>185</b>	<b>100</b>	<b>1843</b>	<b>100</b>	<b>4227</b>	<b>100</b>



## Deel B NATIONALE GEGEVENS 1998 CONSULTEN EN KENMERKEN BEZOEKERS

Tabel 1: Aantal consulten naar GGD en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek	HIV test	beide	totaal 1998	% incl. A'dam	% excl. A'dam	totaal 1997
GGD en GD Amsterdam	.	.	.	15940	61.2	.	15625
GGD en GD Utrecht	441	252	799	1492	5.7	14.7	1520
GGD Rotterdam e.o.	808	23	4	835	3.2	8.2	431
GGD regio Arnhem	570	68	111	749	2.9	7.4	707
GGD regio Nijmegen	576	127	11	714	2.7	7.1	803
GGD Midden Brabant	534	153	.	687	2.6	6.8	632
GGD Groningen Stad en Ommelanden	454	3	86	543	2.1	5.4	616
DGD Zuidelijk Zuid Limburg	317	82	105	504	1.9	5.0	449
GGD Noord Kennemerland	255	96	130	481	1.8	4.8	421
GGD Oostelijk Zuid Limburg	167	111	122	400	1.5	4.0	204
GGD Den Haag	264	57	23	344	1.3	3.4	342
GGD Leiden e.o.	66	239	2	307	1.2	6.4	407
GGD Stadsgewest Breda	140	105	20	265	1.0	2.6	273
GGD Zuid Kennemerland	77	166	12	255	1.0	2.5	290
GGD Flevoland	95	82	27	204	0.8	2.0	103
GGD Midden IJssel	60	82	26	168	0.6	1.7	143
GGD Eemland	22	114	.	136	0.5	1.3	159
GGD regio Twente	65	47	18	130	0.5	1.3	123
GGD Zeeland	37	31	49	117	0.4	1.2	80
GGD Zuid-Holland Zuid	.	114	.	114	0.4	1.1	98
GGD Noord Limburg	52	46	6	104	0.4	1.0	106
GGD Kop van Noord-Holland	65	27	10	102	0.4	1.0	108
GGD Oost Veluwe	39	49	11	99	0.4	1.0	128
GGD Amstelland-De Meerlanden	14	77	8	99	0.4	1.0	62
GGD West-Holland	4	92	.	96	0.4	0.9	64
GGD Westfriesland	35	47	7	89	0.3	0.9	98
GGD regio IJssel-Vecht	38	34	14	86	0.3	0.8	277
GGD West-Veluwe/Vallei	20	63	3	86	0.3	0.8	84
GGD Westelijk Mijnstreek	39	30	14	83	0.3	0.8	43
GGD Noord-Friesland	75	1	1	77	0.3	0.8	68
GGD Midden Holland	23	38	15	76	0.3	0.8	76
GGD Westelijk Noord Brabant	22	53	.	75	0.3	0.7	77
GGD Gooi en Vechtstreek	8	58	1	67	0.3	0.7	92
GGD Delfland	.	63	.	63	0.2	0.6	105
GGD regio Achterhoek	25	21	14	60	0.2	0.6	76
GGD Rivierenland	22	18	7	47	0.2	0.5	41
GGD Midden Limburg	9	35	.	44	0.2	0.4	25
GGD Rijnstreek	.	33	5	38	0.1	0.4	34
GGD Noordwest Veluwe	11	4	15	30	0.1	0.3	28
GGD Noord & Midden Drenthe	24	.	4	28	0.1	0.3	11
GGD Zaanstreek	.	25	1	26	0.1	0.3	51
GGD Zuid-West Friesland	20	.	.	20	0.1	0.2	21
GGD Waterland	.	18	1	19	0.1	0.2	42
GGD Zuidhollandse Eilanden	17	1	.	18	0.1	0.2	30
GGD Midden Kennemerland	12	.	.	12	0.0	0.1	17
GGD Zuid-Oost Drenthe	11	.	.	11	0.0	0.1	17
GGD Zuid-Oost Utrecht	8	.	.	8	0.0	0.1	.
GGD Zuidwest Drenthe	6	.	.	6	0.0	0.1	3
GGD Stadsgewest Den Bosch	.	.	1	1	0.0	0.0	208
GGD De Friese Wouden	.	.	.	.	.	.	54
GGD Zuid-Oost Brabant	.	.	.	.	.	.	2
GGD Brabant Noord-Oost	.	.	.	.	.	.	.
onbekend	11	6	1	18	0.1	0.2	25
Totaal excl. Amsterdam	5558	2881	1684	10123	38.8	100.0	9888
TOTAAL	.	.	.	26063	100.0	.	25513

Tabel 2: Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	2548	46.03	1591	55.45	792	47.06	4931	48.88	4705	47.68
vrouw	2987	53.97	1274	44.41	891	52.94	5152	51.08	5153	52.22
onbekend	.	.	4	0.14	.	.	4	0.04	9	0.09
<b>TOTAAL</b>	<b>5535</b>	<b>100.00</b>	<b>2869</b>	<b>100.00</b>	<b>1683</b>	<b>100.00</b>	<b>10087</b>	<b>100.00</b>	<b>9867</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3: Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	389	7.00	312	10.83	123	7.30	824	8.14	947	9.58
februari	394	7.09	272	9.44	103	6.12	769	7.60	821	8.30
maart	432	7.77	286	9.93	151	8.97	869	8.58	730	7.38
april	374	6.73	238	8.26	111	6.59	723	7.14	765	7.74
mei	339	6.10	222	7.71	95	5.64	656	6.48	747	7.55
juni	501	9.01	227	7.88	141	8.37	869	8.58	799	8.08
juli	535	9.63	215	7.46	158	9.38	908	8.97	932	9.43
augustus	524	9.43	220	7.64	161	9.56	905	8.94	835	8.44
september	563	10.13	208	7.22	128	7.60	899	8.88	868	8.78
oktober	514	9.25	199	6.91	152	9.03	865	8.54	943	9.54
november	553	9.95	237	8.23	205	12.17	995	9.83	771	7.80
december	423	7.61	223	7.74	152	9.03	798	7.88	725	7.33
onbekend	17	0.31	22	0.76	4	0.24	43	0.42	5	0.05
<b>TOTAAL</b>	<b>5558</b>	<b>100.00</b>	<b>2881</b>	<b>100.00</b>	<b>1684</b>	<b>100.00</b>	<b>10123</b>	<b>100.00</b>	<b>9888</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4a: Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>										
SOA-onderzoek	2169	43.99	2568	49.84	.	.	4737	46.96	4770	48.34
HIV-test	1710	34.68	1411	27.39	4	100.00	3125	30.98	3188	32.31
beide	934	18.94	1052	20.42	.	.	1986	19.69	1628	16.50
onbekend	118	2.39	121	2.35	.	.	239	2.37	281	2.85
<b>TOTAAL</b>	<b>4931</b>	<b>100.00</b>	<b>5152</b>	<b>100.00</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>10087</b>	<b>100.00</b>	<b>9867</b>	<b>100.00</b>



Tabel 4b: Reden voor SOA-onderzoek en HIV-test (meer redenen per client mogelijk)

	SOA onderzoek				HIV test			
	1998 aantal	%	1997 aantal	%	1998 aantal	%	1997 aantal	%
klachten	2940	35.13	2860	32.5	231	3.93	206	3.4
begin nieuwe relatie	792	9.46	749	8.5	1486	25.29	1618	26.6
kinderwens	61	0.73	64	0.7	111	1.89	123	2.0
eigen risicogedrag	2524	30.16	2410	27.4	2666	45.36	2642	43.4
risicogedrag partner	512	6.12	749	8.5	486	8.27	552	9.1
partner HIV positief	10	0.12	102	1.2	48	0.82	56	0.9
gewaarschuwd door partner	314	3.75	339	3.9	47	0.80	33	0.5
gewaarschuwd door SV *	29	0.35	48	0.5	.	.	1	0.0
gewaarschuwd door anders	50	0.60	126	1.4	120	2.04	53	0.9
periodieke controle	617	7.37	658	7.5	177	3.01	146	2.4
na seksueel geweld	92	1.10	245	2.8	60	1.02	113	1.9
extreme angst	82	0.98	128	1.5	140	2.38	234	3.8
prik accident	2	0.02	9	0.1	33	0.56	38	0.6
i.v.m. verzekering	5	0.06	2	0.0	20	0.34	23	0.4
onbekend	49	0.59	79	0.9	44	0.75	57	0.9
anders	289	3.45	228	2.6	208	3.54	197	3.2
<b>TOTAAL</b>	<b>8368</b>	<b>100.0</b>	<b>8796</b>	<b>100.0</b>	<b>5877</b>	<b>100.0</b>	<b>6092</b>	<b>100.0</b>

\*SV= Sociaal-verpleegkundige

Tabel 4c: Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

reden bezoek =>	SOA				totaal	
	onderzoek	HIV test	beide	onbekend	1998	1997
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	4	9	11	5	29	28
geen SOA onderzoek, HIV negatief	13	2744	52	43	2852	3345
SOA positief, geen HIV test	1804	305	138	148	2395	1850
SOA positief, HIV positief	3	.	.	2	5	4
SOA positief, HIV negatief	5	3	168	.	176	147
SOA negatief, geen HIV test	2889	41	202	31	3163	3357
SOA negatief, HIV positief	2	.	1	1	4	1
SOA negatief, HIV negatief	37	36	1416	10	1499	1156
<b>TOTAAL</b>	<b>4757</b>	<b>3138</b>	<b>1988</b>	<b>240</b>	<b>10123</b>	<b>9888</b>

Tabel 5: Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>										
<14	20	0.41	40	0.78	.	.	60	0.59	63	0.64
15-19	188	3.81	599	11.63	1	25.00	788	7.81	812	8.23
20-24	855	17.34	1642	31.87	.	.	2497	24.75	2436	24.69
25-29	1120	22.71	1168	22.67	.	.	2288	22.68	2249	22.79
30-34	816	16.55	623	12.09	1	25.00	1440	14.28	1535	15.56
35-39	608	12.33	384	7.45	.	.	992	9.83	945	9.58
40-44	422	8.56	250	4.85	.	.	672	6.66	609	6.17
45-54	480	9.73	234	4.54	.	.	714	7.08	725	7.35
>54	217	4.40	54	1.05	.	.	271	2.69	264	2.68
??	205	4.16	158	3.07	2	50.00	365	6.62	229	2.32
<b>TOTAAL</b>	<b>4931</b>	<b>100.00</b>	<b>5152</b>	<b>100.00</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>10087</b>	<b>100.00</b>	<b>9867</b>	<b>100.00</b>

Tabel 6: Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>										
Nederland	3995	81.02	4054	78.69	2	50.00	8051	79.82	7748	78.52
Turkije	89	1.80	37	0.72	.	.	126	1.25	111	1.12
Marokko	86	1.74	28	0.54	.	.	114	1.13	102	1.03
Sur./ Ant./ Aru.	199	4.04	145	2.81	.	.	344	3.41	222	2.25
Overig	400	8.11	706	13.70	.	.	1106	10.96	1481	15.01
Onbekend	162	3.29	182	3.53	2	50.00	346	3.43	203	2.06
<b>TOTAAL</b>	<b>4931</b>	<b>100.00</b>	<b>5152</b>	<b>100.00</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>10087</b>	<b>100.00</b>	<b>9867</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7: Aantal consulten naar seksuele gerichtheid en uitgevoerd onderzoek, mannen

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>										
heteroseksueel	1982	77.79	1257	79.01	580	73.23	3819	77.45	3645	77.47
homoseksueel	367	14.40	214	13.45	113	14.27	694	14.07	540	11.48
biseksueel	118	4.63	47	2.95	41	5.18	206	4.18	169	3.59
onbekend	81	3.18	73	2.95	58	7.32	212	4.30	351	7.46
<b>TOTAAL</b>	<b>2548</b>	<b>100.00</b>	<b>1591</b>	<b>4.59</b>	<b>792</b>	<b>100.00</b>	<b>4931</b>	<b>100.00</b>	<b>4705</b>	<b>100.0</b>

Tabel 8a: Aantal consulten naar prostitutie en uitgevoerd onderzoek, mannen

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>										
prostitu�e	28	1.16	6	0.39	11	1.41	45	0.95	34	0.75
prostituuant	331	13.71	110	7.10	64	8.19	505	10.65	497	10.91
geen van beide	1897	78.58	1201	77.53	627	80.28	3725	78.52	3672	80.60
onbekend	158	6.55	232	14.98	79	10.12	469	9.89	353	7.75
<b>TOTAAL</b>	<b>2414</b>	<b>100.00</b>	<b>1549</b>	<b>100.00</b>	<b>781</b>	<b>100.00</b>	<b>4744</b>	<b>100.00</b>	<b>4556</b>	<b>100.0</b>

Tabel 8b: Aantal consulten naar prostitutie en uitgevoerd onderzoek, vrouwen

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>										
prostitu�e	747	26.19	34	2.72	192	21.72	973	19.51	1002	20.02
prostituante	2	0.07	1	0.08	3	0.34	6	0.12	7	0.14
geen van beide	2002	70.20	1063	85.04	643	72.74	3708	74.37	3729	74.51
onbekend	101	3.54	152	12.16	46	5.20	299	6.00	267	5.33
<b>TOTAAL</b>	<b>2852</b>	<b>100.00</b>	<b>1250</b>	<b>100.00</b>	<b>884</b>	<b>100.00</b>	<b>4986</b>	<b>100.00</b>	<b>5005</b>	<b>100.0</b>

Tabel 9: Aantal consulten naar druggebruik en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DRUGGEBRUIK</b>										
ja, intraveneus	5	0.10	10	0.19	.	.	15	0.15	304	3.08
ja, niet intraveneus	160	3.24	115	2.23	.	.	275	2.73	394	3.99
ja, onbekend	121	2.45	163	3.16	.	.	284	2.82	128	1.30
nee										
onbekend	4645	94.20	4864	94.41	4	100.00	9513	94.31	9041	91.63
<b>TOTAAL</b>	4931	100.00	5152	100.00	4	100.00	10087	100.00	9866	100.00

Tabel 10: Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>										
ja, ooit een SOA	846	17.16	821	15.94	1	25.00	1668	16.54	1455	14.75
ja, ooit twee SOA									10	0.10
nee	3400	68.95	3544	68.79	2	50.00	6946	68.86	6829	69.21
onbekend	685	13.89	787	15.28	1	25.00	1473	14.60	1573	15.94
<b>TOTAAL</b>	4931	100.00	5152	100.00	4	100.00	10087	100.00	9867	100.00

**GESTELDE DIAGNOSES EN KENMERKEN VAN PATIENTEN**

Tabel 11: Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	mannen		vrouwen		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>										
Gonorrhoe (excl.PVG)	137	2.7	58	1.1	.	.	195	1.9	191	1.87
Gonorrhoe: PVG	9	0.2	1	0.0	.	.	10	0.1	6	0.06
Syfilis: niet gespecificeerd	12	0.2	12	0.2	.	.	24	0.2	25	0.25
" : primair	27	0.5	14	0.3	.	.	41	0.4	48	0.47
" : secundair	8	0.2	8	0.1	.	.	16	0.2	20	0.20
" : latens recens	26	0.5	35	0.6	.	.	61	0.6	41	0.40
" : latens tarda	10	0.2	6	0.1	.	.	16	0.2	11	0.11
Chlamydia infectie	304	6.0	410	7.6	.	.	714	6.8	678	6.65
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	14	0.3	17	0.3	.	.	31	0.3	64	0.63
" : primo:HSV-type1&2	.	.	1	0.0	.	.	1	0.0	.	.
" : primo: HSV type 1	7	0.1	14	0.3	.	.	21	0.2	17	0.17
" : primo: HSV type 2	24	0.5	15	0.3	.	.	39	0.4	15	0.15
" : recidief	23	0.5	23	0.4	.	.	46	0.4	17	0.17
Genitale wratten	166	3.3	169	3.1	.	.	335	3.2	298	2.92
Hepatitis B: acuut	21	0.4	4	0.3	.	.	25	0.2	9	0.09
Hepatitis B: chronisch	10	0.2	4	0.3	.	.	14	0.1	10	0.10
Niet Specifieke Urethritis	78	1.5	13	0.2	.	.	91	0.9	108	1.06
Bacteriele Vaginose	9	0.2	234	4.3	.	.	243	2.3	180	1.76
Trichomoniasis	8	0.2	33	0.6	.	.	41	0.4	50	0.49
Candidiasis	45	0.9	235	4.3	.	.	280	2.7	281	2.75
Schaamluis	8	0.2	6	0.1	.	.	14	0.1	22	0.22
Scabies	38	0.7	13	0.2	.	.	51	0.5	25	0.25
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.01
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	247	4.9	249	4.6	.	.	496	4.7	60	0.59
PID	.	.	1	0.0	.	.	1	0.0	3	0.03
HIV +	35	0.7	3	0.1	.	.	38	0.4	33	0.32
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>1266</i>	<i>24.9</i>	<i>1578</i>	<i>29.1</i>	.	.	<i>2844</i>	<i>27.1</i>	<i>2213</i>	<i>21.70</i>
HIV -	2348	46.1	2162	39.9	4	100.0	4514	42.9	4634	45.43
Nihil *	1474	29.0	1678	31.0	.	.	3152	30.0	3353	32.87
<b>TOTAAL</b>	<b>5088</b>	<b>100.0</b>	<b>5418</b>	<b>100.0</b>	<b>4</b>	<b>100.0</b>	<b>10510</b>	<b>100.0</b>	<b>10200</b>	<b>100.0</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 11a: Aandeel van verschillende diagnoses naar geslacht  
 (jaarlijks totaal gediagnosticeerde SOA=100%)

	man	vrouw	totaal 1998	totaal 1997
Chlamydia infectie	24.0	26.0	25.1	30.6
Genitale wratten	13.1	10.7	11.8	13.4
Candidiasis	3.6	14.9	9.8	12.7
Gonorrhoe (excl.PVG)	10.8	3.7	6.9	8.6
Bacteriele Vaginose	0.7	14.8	8.5	8.1
Syfilis: totaal	6.6	4.8	5.5	6.5
Herpes genitalis: primo + recidief	5.4	3.8	4.9	5.1
Niet Specifieke Urethritis	6.2	0.8	3.2	4.8
Overig/ niet gespecificeerd	19.5	15.8	17.4	2.7
Trichomoniasis	0.6	2.1	1.4	2.2
HIV +	2.8	0.2	1.3	1.4
Scabies	3.0	0.8	1.8	1.1
Schaamluis	0.6	0.4	0.5	0.9
Hepatitis B: chronisch	0.8	0.3	0.5	0.4
Hepatitis B: acuut	1.7	0.3	0.9	0.4
Gonorrhoe: PVG	0.7	0.1	0.4	0.2
PID	0.0	0.1	0.0	0.1
Ulcus molle	0.0	0.0	0.0	0.0
Granuloma inguinale	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	1266	1578	2844	2213

Tabel 11b: Lokalisatie i.g.v. gonorrhoe (include. PVG), naar geslacht

	man		vrouw		totaal	
	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>						
urethraal/cervicaal	.	.	.	.	.	.
anaal/rectaal	.	.	.	.	.	.
mond/keel	.	.	.	.	.	.
oog	1	0.68	.	.	1	0.49
onbekend	145	99.32	59	100.00	204	99.51
<b>TOTAAL</b>	146	100.00	59	100.00	205	100.00

Tabel 11c: Lokalisatie i.g.v. chlamydia-infectie, naar geslacht

	man		vrouw		totaal	
	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>						
urethraal/cervicaal	.	.	.	.	.	.
anaal/rectaal	.	.	.	.	.	.
mond/keel	.	.	2	0.49	2	0.28
oog	.	.	.	.	.	.
onbekend	304	100.00	408	99.51	712	99.72
<b>TOTAAL</b>	304	100.00	410	100.00	714	100.00

Tabel 12: Aantal infecties in geval van gestelde diagnose, naar geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>AANTAL SOA</b>								
enkele infectie	1079	91.52	1258	88.72	2337	89.99	1797	88.65
dubbele infecties	90	7.63	139	9.80	229	8.82	212	10.46
drievoudige infecties	7	0.59	18	1.27	25	0.96	17	0.84
viervoudige infecties	3	0.25	3	0.21	6	0.23	1	0.05
<b>TOTAAL</b>	1179	100.00	1418	100.00	2597	100.00	2027	100.00

Tabel 13a: Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#
Gonorroë	.	.	9	6.2	13	8.9	26	17.8	28	19.2	23	15.8	13	8.9	14	9.6	8	5.5	12	8.2	126
Syf.: Pr. & S.	.	.	2	5.7	.	.	5	14.3	5	14.3	6	17.1	5	14.3	8	22.9	3	8.6	1	2.9	35
Chlamydia	1	0.3	16	5.3	56	18.4	93	30.6	52	17.1	33	10.9	20	6.6	19	6.3	11	3.6	3	1.0	304
herpes genitalis	.	.	5	7.4	12	17.6	10	14.7	10	14.7	14	20.6	4	5.9	8	11.8	4	5.9	1	1.5	68
genitale wratten	1	0.6	6	3.6	34	20.5	39	23.5	27	16.3	27	16.3	11	6.6	10	6.0	7	4.2	4	2.4	166
overig	2	0.4	21	4.1	74	14.5	116	22.7	79	15.4	48	9.4	52	10.2	66	12.9	22	4.3	32	6.3	512
HIV+	.	.	1	2.9	1	2.9	2	5.7	7	20.0	6	17.1	6	17.1	7	20.0	2	5.7	3	8.6	35
<i>Gediagn. Iinf</i>	4	0.3	60	4.7	190	15.0	291	23.0	208	16.4	157	12.4	111	8.8	132	10.4	57	4.5	56	4.4	1266
Nihil *	16	0.4	135	3.6	675	18.0	851	22.7	623	16.6	462	12.3	322	8.6	354	9.4	163	4.3	151	4.0	3752
TOTAAL	20	0.4	195	3.9	865	17.2	1142	22.8	831	16.6	619	12.3	433	8.6	486	9.7	220	4.4	207	4.1	5018

Tabel 13b: Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		Totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	1	1.7	13	22.0	21	35.6	11	18.6	3	5.1	1	1.7	2	3.4	.	.	.	.	7	11.9	59	
Syf.: Pr. & S.	.	.	2	9.1	5	22.7	4	18.2	3	13.6	4	18.2	2	9.1	1	4.5	1	4.5	.	.	22	
Chlamydia	2	0.5	66	16.1	80	43.9	90	22.0	34	8.3	17	4.1	7	1.7	4	1.0	2	0.5	8	2.0	410	
herpes genitalis	.	.	10	14.3	16	22.9	17	24.3	13	18.6	4	5.7	4	5.7	2	2.9	1	1.4	3	4.3	70	
genitale wratten	2	1.2	28	16.6	46	27.2	42	24.9	22	13.0	9	5.3	7	4.1	8	4.7	2	1.2	3	1.8	169	
overig	3	0.4	98	11.6	273	32.3	190	22.5	83	9.8	68	8.0	51	6.0	44	5.2	12	1.4	23	2.7	845	
HIV+	.	.	.	.	1	33.3	1	33.3	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
<i>Gediagn. Iinf</i>	9	0.6	217	13.8	542	34.3	355	22.5	159	10.1	103	6.5	73	4.6	59	3.7	18	1.1	44	2.8	1578	
Nihil *	33	0.9	412	11.0	1155	30.9	846	22.7	479	12.8	292	7.8	181	4.8	179	4.8	39	1.0	118	3.2	3734	
TOTAAL	41	0.8	629	11.8	1697	31.9	1201	22.6	638	12.0	395	7.4	254	4.8	238	4.5	57	1.1	162	3.0	5312	

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 14a: Diagnoses naar land van herkomst, mannen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorroë	92	63.0	6	4.1	8	5.5	22	15.1	11	7.5	7	4.8	146
Syfilis: Prim. & Sec.	17	48.6	2	5.7	.	8.6	7	20.0	5	14.3	1	2.9	35
Chlamydia infectie	215	70.7	12	3.9	10	3.3	36	11.8	21	6.9	10	3.3	304
Herpes genitalis	53	77.9	3	4.4	.	.	7	10.3	3	4.4	2	2.9	68
Genitale wratten	118	71.1	4	2.4	9	5.4	11	6.6	23	13.9	1	0.6	166
Overig	353	68.9	25	4.9	17	3.3	49	9.6	45	8.8	23	4.5	512
HIV	26	74.3	1	2.9	.	.	2	5.7	3	8.6	3	8.6	35
<i>Gediagn inf</i>	847	69.0	53	4.2	47	3.7	134	10.6	111	8.8	47	3.7	1266
Nihil	3173	84.6	40	1.1	42	1.1	81	2.2	298	7.9	118	3.1	3752
<b>TOTAAL</b>	4047	80.6	93	1.9	89	1.8	215	4.3	409	8.2	165	3.3	5018

Tabel 14b: Diagnoses naar land van herkomst, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorroë	41	69.5	2	3.4	1	1.7	3	5.1	9	15.3	3	5.1	59
Syfilis: Prim. & Sec.	10	45.5	.	.	1	4.5	2	9.1	6	27.3	3	13.6	22
Chlamydia infectie	289	70.5	7	1.7	4	1.0	28	6.8	59	14.4	23	5.6	410
Herpes genitalis	61	87.1	1	1.4	.	.	1	1.4	5	7.1	2	2.9	70
Genitale wratten	146	86.4	2	1.2	1	0.6	5	3.0	11	6.5	4	2.4	169
Overig	572	67.7	6	0.7	6	0.7	46	5.4	172	20.4	43	5.1	845
HIV+	1	33.3	.	.	.	.	.	.	2	66.7	.	.	3
<i>Gediagn. Inf.</i>	1120	71.0	18	1.1	13	0.8	85	5.4	264	16.7	78	4.9	1578
Nihil	3040	81.4	21	0.6	17	0.5	65	1.7	476	12.7	115	3.1	3734
<b>TOTAAL</b>	4160	78.3	39	0.7	30	0.6	150	2.8	740	13.9	193	3.6	5312



Tabel 15: Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	80	54.8	48	32.9	13	8.9	5	3.4	146
Syfilis: Prim. & Sec.	27	77.1	6	17.1	.	.	2	5.7	35
Chlamydia infectie	254	83.6	32	10.5	14	4.6	4	1.3	304
Herpes genitalis	60	88.2	7	10.3	1	1.5	.	.	68
Genitale wratten	121	72.9	35	21.1	6	3.6	4	2.4	166
Overig	394	77.0	72	14.1	21	4.1	25	4.9	512
HIV+	7	20.0	15	42.9	.	.	13	37.1	35
<i>Gediagn. Inf.</i>	943	74.5	215	17.0	55	4.3	53	4.2	1266
Nihil	2937	78.3	499	13.3	154	4.1	162	4.3	3752
<b>TOTAAL</b>	3880	77.3	714	14.2	209	4.2	215	4.3	5018

Tabel 16a: Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	2	1.6	26	21.0	86	69.4	10	8.1	124
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	15	48.4	15	48.4	1	3.2	31
Chlamydia infectie	1	0.3	27	9.2	246	83.4	21	7.1	295
Herpes genitalis	1	1.5	5	7.6	54	81.8	6	9.1	66
Genitale wratten	1	0.6	14	9.1	128	83.1	11	7.1	154
Overig	9	2.1	57	13.0	337	76.8	36	8.2	439
HIV+	.	.	.	.	17	56.7	13	43.3	30
<i>Gediagn. Inf.</i>	14	1.2	144	12.6	883	77.5	98	8.6	1139
Nihil	32	0.9	369	10.0	2906	78.9	376	10.2	3683
<b>TOTAAL</b>	46	1.0	513	10.6	3789	78.6	474	9.8	4822

Tabel 16b: Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	17	33.3	.	.	33	64.7	1	2.0	51
Syfilis: Prim. & Sec.	10	50.0	1	5.0	8	40.0	1	5.0	20
Chlamydia infectie	61	15.7	1	0.3	315	81.2	11	2.8	388
Herpes genitalis	4	6.1	1	1.5	55	83.3	6	9.1	66
Genitale wratten	20	12.7	1	0.6	131	83.4	5	3.2	157
Overig	250	32.3	1	0.1	502	64.8	22	2.8	775
HIV+	1	33.3	.	.	2	66.7	.	.	3
<i>Gediagn. Inf.</i>	363	24.9	5	0.3	1046	71.6	46	3.2	1460
Nihil	662	18.0	3	0.1	2756	74.9	257	7.0	3678
<b>TOTAAL</b>	1025	19.9	8	0.2	3802	74.0	303	5.9	5138

Tabel 17: Diagnoses naar druggebruik, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	ja, intraveneus		ja, niet intraveneus		ja, onbekend wat		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Gonorroë	.	.	3	1.4	6	2.9	.	.	200	95.7	209
Syfilis: Prim. & Sec.	1	1.8	2	3.5	.	.	.	.	54	94.7	57
Chlamydia infectie	1	0.1	15	2.1	13	1.8	.	.	687	95.9	716
Herpes genitalis	.	.	2	1.4	1	0.7	.	.	136	97.8	139
Genitale wratten	.	.	3	0.9	2	0.6	.	.	330	98.5	335
Overig	4	0.3	29	2.1	40	2.9	.	.	1290	94.6	1363
HIV+	.	.	1	2.6	11	28.9	.	.	26	68.4	38
Gediagn. Inf.	6	0.2	55	1.9	73	2.6	.	.	2723	95.3	2857
Nihil	10	0.1	223	3.0	223	3.0	.	.	7058	93.9	7514
<b>TOTAAL</b>	<b>16</b>	<b>0.2</b>	<b>278</b>	<b>2.7</b>	<b>296</b>	<b>2.9</b>			<b>9781</b>	<b>94.3</b>	<b>10371</b>

Tabel 18a: Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
Gonorroë	73	34.9	77	36.8	59	28.2	209
Syfilis: Prim. & Sec.	17	29.8	19	33.3	21	36.8	57
Chlamydia infectie	152	21.2	450	62.8	114	15.9	716
Herpes genitalis	39	28.1	81	58.3	19	13.7	139
Genitale wratten	94	28.1	180	53.7	61	18.2	335
Overig	276	20.2	644	47.2	443	32.5	1363
HIV+	9	23.7	13	34.2	16	42.1	38
Gediagn. Inf.	660	23.1	1464	51.2	733	25.7	2857
Nihil	1080	14.4	5625	74.9	809	10.8	7514
<b>TOTAAL</b>	<b>1740</b>	<b>16.8</b>	<b>7089</b>	<b>68.4</b>	<b>1542</b>	<b>14.9</b>	<b>10371</b>

Tabel 18b: Diagnoses naar soort SOA in anamnese, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	gonorroë		syfilis		chlamydia		andere soa		onbekend welke soa		nooit		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Gonorroë	25	13.5	.	.	14	7.6	5	2.7	50	27.0	51	27.6	40	21.6	185
Syfilis: Prim. & Sec.	6	12.8	5	10.6	2	4.3	1	2.1	12	25.5	10	21.3	11	23.4	47
Chlamydia infectie	27	7.3	2	0.5	24	6.5	14	3.8	76	20.6	176	47.7	50	13.6	369
Herpes genitalis	5	6.0	1	1.2	2	2.4	8	9.5	20	23.8	37	44.0	11	13.1	84
Genitale wratten	7	3.5	.	.	10	5.0	19	9.5	49	24.6	87	43.7	27	13.6	199
Overig	30	5.1	14	2.4	20	3.4	14	2.4	99	17.0	203	34.8	203	34.8	583
HIV+	2	5.0	1	2.5	.	.	3	7.5	7	17.5	13	32.5	14	35.0	40
Gediagn. Inf.	102	6.8	23	1.5	72	4.8	64	4.2	313	20.8	577	38.3	356	23.6	1507
Nihil	159	3.7	26	0.6	139	3.2	152	3.5	533	12.3	2912	67.1	421	9.7	4342
<b>TOTAAL</b>	<b>261</b>	<b>4.5</b>	<b>49</b>	<b>0.8</b>	<b>211</b>	<b>3.6</b>	<b>216</b>	<b>3.7</b>	<b>846</b>	<b>14.5</b>	<b>3489</b>	<b>59.7</b>	<b>777</b>	<b>13.3</b>	<b>5849</b>

Tabel 18c: Diagnoses naar soort SOA in anamnese, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	gonorroe		syfilis		chlamydia		andere soa		onbekend welke soa		nooit		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>															
Gonorroe	6	8.3	1	1.4	6	8.3	1	1.4	13	18.1	26	36.1	19	26.4	7
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	1	4.2	1	4.2	.	.	3	12.5	9	37.5	10	41.7	2
Chlamydia infectie	14	3.0	1	0.2	40	8.5	10	2.1	70	14.8	274	58.1	63	13.3	47
Herpes genitalis	2	2.4	1	1.2	1	1.2	12	14.1	17	20.0	44	51.8	8	9.4	8
Genitale wratten	3	1.5	.	.	20	10.1	11	5.6	36	18.2	94	47.5	34	17.2	19
Overig	18	1.8	13	1.3	80	8.1	42	4.2	164	16.5	437	44.0	239	24.1	99
HIV+	.	.	.	.	.	.	1	25.0	1	25.0	.	.	2	50.0	
<i>Gediagn. Inf.</i>	43	2.3	17	0.9	148	8.0	77	4.2	304	16.5	88.4	47.8	375	20.3	184
Nihil	61	1.4	16	0.4	267	6.1	165	3.8	540	12.3	2800	63.8	540	12.3	438
<b>TOTAAL</b>	104	1.7	33	0.5	415	6.7	242	3.9	844	13.5	3684	59.1	915	14.7	623

Tabel 19: Aantal HIV-testen met uitslag naar geslacht en risicogroep

	mannen				vrouwen				man/vrouw		totaal		
	heteroseksueel		homo- biseksueel		prostuee		non- prostitee		onbekend		N	%	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
<b>UITSLAG</b>													
HIV+	7	0.4	15	3.6	1	0.4	2	0.1	13	3.4	38	0.8	
HIV-	1830	99.6	400	96.4	225	99.6	1708	99.9	364	96.6	4527	99.2	
<b>TOTAAL</b>	1837	100	415	100	226	100	1710	100	377	100	4565	100	



## Deel C TRENDOVERZICHTEN SOA 1991-1998

*Voor gonorrhoe, syfilis en chlamydia zijn de cijfers inclusief Amsterdam*

Tabel 20: Aantal gediagnostiseerde SOA en aantal consulten, 1991-1998

Jaar	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Gonorrhoe (excl. PVG)	1569	1267	879	746	908	830	703	654
Gonorrhoe - PVG	186	97	129	83	9	7	67	54
Syfilis (prim.+sec.)	131	85	78	69	101	137	86	78
Syfilis (others)	174	145	142	76	162	162	174	193
Chlamydia trachomatis	1713	1705	1579	1453	1630	2164	2160	2294
Condylomata acuminata	375	268	288	350	435	396	298	335
non-specifieke urethritis	346	227	228	178	220	217	108	91
genitale herpes	171	131	138	123	174	136	113	138
Candidiasis	188	170	235	267	274	349	281	280
Garderella	60	92	147	127	189	214	180	243
Trichomoniasis	75	87	101	90	124	85	50	41
Scabies	25	28	27	59	66	50	25	51
Hepatitis B	34	43	37	47	50	25	19	39
Pediculosis pubis	59	43	42	42	49	30	22	14
Ulcus molle	8	4	4	2	1	4	1	0
overig	33	35	18	14	74	107	63	496
geen SOA vastgesteld	1656	1814	1649	2130	2334	2851	3353	3152
HIV-test -positief	20	27	39	39	55	54	33	38
HIV-test -negatief	2106	2617	3491	4392	5456	6054	4634	4514
Totaal aantal infecties	8929	8885	9251	10287	12311	13872	12370	12706
Totaal aantal consulten	8471	8559	8773	9784	11764	13226	12037	12319

Tabel 20a: Aantal diagnoses en percentage per jaar, 1992-1998

DIAGNOSE	1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Gonorrhoe	1364	15	1008	11	829	8	917	7	837	6	770	6	708	6
Syfilis: Prim. & Sec.	85	1	78	1	69	1	101	1	137	1	86	1	78	1
Chlamydia-infectie	1705	19	1579	17	1453	14	1630	13	2164	16	2160	18	2294	18
Herpes genitalis	131	1	138	1	123	1	174	1	136	1	113	1	138	1
Genitale wratten	268	3	288	3	350	3	435	4	396	3	298	2	335	3
Overig	874	10	981	11	902	9	1209	10	1158	8	823	7	1449	11
HIV+	27	0	39	0	39	0	55	0	54	0	33	0	38	0
HIV-	2617	29	3491	38	4392	43	5456	44	6054	44	4637	38	4514	36
Nihil	1814	20	1649	18	2130	21	2334	19	2851	21	3353	27	3152	25
TOTAAL	8885		9251		10287		12311		13787		12273		12706	

Tabel 21a: Aantal diagnoses en percentage per jaar, heteroseksuele mannen, 1992-1998

	1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>DIAGNOSE</b>														
Gonorroë	741	18	548	13	407	9	374	8	304	6	207	5	233	5
Syfilis: Prim. & Sec.	39	1	36	1	38	1	42	1	66	1	30	1	36	1
Chlamydia-infectie	761	19	721	17	628	14	713	15	893	17	872	19	884	19
Herpes genitalis	83	2	70	2	58	1	88	2	70	1	33	1	60	1
Genitale wratten	123	3	135	3	164	4	169	3	181	3	80	2	121	3
Overig	370	9	375	9	295	7	395	8	354	7	165	4	394	8
HIV+	7	0	8	0	12	0	9	0	10	0	2	0	7	0
HIV-	1137	28	1595	37	1886	43	2207	45	2494	46	1938	43	1250	27
Nihil	829	20	775	18	925	21	869	18	993	19	1160	26	1687	36
<b>TOTAAL</b>	<b>4090</b>		<b>4263</b>		<b>4413</b>		<b>4866</b>		<b>5365</b>		<b>4487</b>		<b>4672</b>	

Tabel 21b: Aantal diagnoses en percentage per jaar, homo- en biseksuele mannen, 1992-1998

	1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>DIAGNOSE</b>														
Gonorroë	313	32	197	23	209	23	313	23	326	25	303	26	329	27
Syfilis: Prim. & Sec.	9	1	16	2	8	1	11	1	19	1	7	1	13	1
Chlamydia-infectie	109	11	82	10	76	8	137	10	155	12	217	18	273	22
Herpes genitalis	4	0	7	1	6	1	11	1	5	0	5	0	8	1
Genitale wratten	32	3	34	4	34	4	70	5	46	4	27	2	41	3
Overig	74	8	64	8	58	6	105	8	55	4	56	5	93	8
HIV+	13	1	14	2	12	1	27	2	28	2	5	0	15	1
HIV-	268	27	301	36	343	37	467	34	476	37	259	22	246	20
Nihil	154	16	132	16	178	19	226	17	185	14	296	25	253	21
<b>TOTAAL</b>	<b>976</b>		<b>847</b>		<b>924</b>		<b>1367</b>		<b>1295</b>		<b>1175</b>		<b>1216</b>	

Tabel 22a: Aantal diagnoses en percentage per jaar, vrouwen, niet werkzaam in de prostitutie, 1992-1998

	1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>DIAGNOSE</b>														
Gonorroë	178	6	159	5	133	4	122	3	130	3	100	2	81	2
Syfilis: Prim. & Sec.	23	1	11	0	10	0	10	0	19	0	14	0	11	0
Chlamydia-infectie	607	21	617	19	569	15	551	14	862	18	802	18	910	20
Herpes genitalis	38	1	53	2	49	1	66	2	53	1	40	1	55	1
Genitale wratten	99	3	112	3	125	3	163	4	124	3	110	2	131	3
Overig	297	10	364	11	340	9	378	9	432	9	342	8	502	11
HIV+	4	0	11	0	9	0	12	0	8	0	10	0	2	0
HIV-	1074	37	1444	44	1884	50	2047	51	2310	47	1833	42	1061	24
Nihil	545	19	526	16	681	18	647	16	935	19	1164	26	1695	38
<b>TOTAAL</b>	<b>2865</b>		<b>3297</b>		<b>3800</b>		<b>3996</b>		<b>4873</b>		<b>4415</b>		<b>4448</b>	

Tabel 22b: Aantal diagnoses en percentage per jaar, vrouwen, werkzaam in de prostitutie, 1992-1998

	1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>DIAGNOSE</b>														
Gonorroë	85	12	80	12	60	7	80	6	51	4	52	4	31	3
Syfilis: Prim. & Sec.	6	1	11	2	11	1	36	2	25	2	11	1	12	1
Chlamydia-infectie	153	22	116	18	110	13	182	13	202	14	178	15	169	14
Herpes genitalis	5	1	4	1	4	0	4	0	3	0	5	0	4	0
Genitale wratten	12	2	5	1	11	1	25	2	30	2	16	1	20	2
Overig	107	16	158	24	174	21	274	19	250	17	178	7	250	21
HIV+	1	0	1	0	1	0	5	0	1	0	3	0	1	0
HIV-	83	12	99	15	183	22	311	22	306	21	182	16	33	3
Nihil	230	34	184	28	277	33	529	37	570	40	542	46	629	53
<b>TOTAAL</b>	<b>682</b>		<b>658</b>		<b>831</b>		<b>1446</b>		<b>1438</b>		<b>1167</b>		<b>1176</b>	





## DEEL D GEGEVENS VOOR GGD'S AFZONDERLIJK 1997

### 1. GG en GD Amsterdam

Vergelijking met 1996 is hier niet mogelijk omdat van 1996 alleen positieve uitslagen van chlamydia, gonorrhoe en syfilis bekend zijn.

Tabel 1.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
man							8300	53.2
vrouw							7310	46.8
onbekend							0	.
<b>TOTAAL</b>							15610	100.0

Tabel 1.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
januari							1213	7.8
februari							1136	7.3
maart							1157	7.4
april							1276	8.2
mei							1186	7.6
juni							1312	8.4
juli							1577	10.1
augustus							1423	9.1
september							1532	9.8
oktober							1400	9.0
november							1207	7.7
december							1191	7.6
onbekend							0	.
<b>TOTAAL</b>							15610	100.0

Tabel 1.5:  
Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>						
<14	1	0.0	10	0.1	11	0.1
15-19	192	2.3	649	8.9	841	5.4
20-24	1176	14.2	2019	27.6	3195	20.5
25-29	1992	24.0	1978	27.1	3970	25.4
30-34	1841	22.2	1170	16.0	3011	19.3
35-39	1230	14.8	717	9.8	1947	12.5
40-44	774	9.3	400	5.5	1174	7.5
45-54	803	9.7	325	4.4	1128	7.2
>54	291	3.5	42	0.6	333	2.1
??	0	.	0	.	0	.
<b>TOTAAL</b>	8300	100.0	7310	100.0	15610	100.0

Tabel 1.6:  
Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>						
Nederland	4761	57.4	4458	61.0	9219	59.1
Turkije	409	4.9	33	0.5	442	2.8
Marokko	390	4.7	117	1.6	507	3.2
Sur./ Ant./ Aru.	975	11.7	833	11.4	1808	11.6
overig	1765	21.3	1869	25.6	3634	23.3
onbekend	.	.	.	.	.	.
<b>TOTAAL</b>	8300	100.0	7310	100.0	15610	100.0

Tabel 1.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	<b>totaal 1997</b>	
	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>		
heteroseksueel	6078	73.2
homoseksueel	1915	23.1
biseksueel	283	3.4
onbekend	24	0.3
<b>TOTAAL</b>	<b>8300</b>	<b>100.0</b>

Tabel 1.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	<b>mannen</b>		<b>vrouwen</b>		<b>totaal 1997</b>	
	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>						
prostitue(e)	258	3.1	1747	23.9	2005	12.8
prostituant(e)	1203	14.5	.	.	1203	7.7
geen van beide	6791	81.8	5558	76.0	12349	79.1
onbekend	48	0.6	5	0.1	53	0.3
<b>TOTAAL</b>	<b>8300</b>	<b>100.0</b>	<b>7310</b>	<b>100.0</b>	<b>15610</b>	<b>100.0</b>

Tabel 1.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	<b>man</b>		<b>vrouw</b>		<b>totaal 1997</b>	
	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>						
ja, ooit lues of gonorroe	2012	24.2	881	12.1	2893	18.5
ja, ooit twee lues of gonorroe	110	1.3	14	0.2	124	0.8
nee	1869	22.5	2042	27.9	3911	25.1
onbekend	4309	51.9	4373	59.8	8682	55.6
<b>TOTAAL</b>	<b>8300</b>	<b>100.0</b>	<b>7310</b>	<b>100.0</b>	<b>15610</b>	<b>100.0</b>

Tabel 1.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	mannen		Vrouwen		totaal 1997		totaal 1996**	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>								
Gonorroë (excl.PVG)	354	3.7	97	1.1	451	2.4	510	25.4
Gonorroë: PVG	53	0.5	8	0.1	61	0.3	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	5	0.1	6	0.1	11	0.1	.	.
" : primair	11	0.1	1	0.0	12	0.1	10	0.5
" : secundair	6	0.1	0	.	6	0.0	20	1.0
" : latens recens	13	0.1	6	0.1	19	0.1	22	1.1
" : latens tarda	42	0.4	25	0.3	67	0.4	64	3.2
Chlamydia infectie	836	8.7	646	7.2	1482	8.0	1373	68.4
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	115	1.2	114	1.3	229	1.2	1	0.0
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : recidief	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	250	2.6	179	2.0	429	2.3	2	0.1
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	2993	31.0	1	0.0	2994	16.9	.	.
Bacteriele Vaginose	0	.	625	7.0	625	3.4	.	.
Trichomoniasis	1	0.0	259	2.9	260	1.4	1	0.0
Candidiasis	0	.	1361	15.2	1361	7.3	4	0.2
Schaamluis	56	0.6	15	0.2	71	0.4	.	.
Scabies	36	0.4	7	0.1	43	0.2	.	.
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	1713	17.8	2784	31.1	4497	24.1	.	.
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	20	0.2	3	0.0	23	0.1	.	.
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>6504</i>	<i>67.5</i>	<i>6134</i>	<i>68.4</i>	<i>12738</i>	<i>68.5</i>	<i>2007</i>	<i>100.0</i>
HIV -	1111	11.5	1123	12.5	2234	12.0	.	.
Nihil *	2025	21.0	1706	19.0	3731	20.1	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>9640</b>	<b>100.0</b>	<b>8963</b>	<b>100.0</b>	<b>18603</b>	<b>100.0</b>	<b>2007</b>	<b>100.0</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

\*\*Voor 1996 zijn alleen gegevens beschikbaar over **positieve** uitslagen voor chlamydia, gonorroë en syfilis. In geval van andere infecties kwamen deze voor in combinatie met CT, GO of Syf.

Tabel 1.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		totaal
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#
Gonorroë	.	.	10	2.5	59	14.5	96	23.6	109	26.8	71	17.4	28	6.9	31	7.6	3	0.7	407
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	1	5.9	3	17.6	7	41.2	2	11.8	2	11.8	1	5.9	1	5.9	17
Chlamydia	.	.	29	3.5	162	19.4	264	31.6	183	21.9	94	11.2	46	5.5	49	5.9	9	1.1	836
herpes genitalis	.	.	1	0.9	9	7.8	26	22.6	26	22.6	18	15.7	13	11.3	16	13.9	6	5.2	115
genitale wratten	.	.	7	2.8	43	17.2	82	32.8	58	23.2	25	10.0	15	6.0	17	6.8	3	1.2	250
Overig	.	.	53	1.9	368	12.9	670	23.4	631	22.1	463	16.2	256	8.9	300	10.5	120	4.2	2861
HIV+	.	.	.	.	2	10.5	5	26.3	6	31.6	2	10.5	1	5.3	1	5.3	2	10.5	19
Nihil *	1	0.0	78	2.5	475	15.1	740	23.6	699	14.3	450	14.3	280	8.9	307	9.8	106	3.4	3136
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>	<b>0.0</b>	<b>178</b>	<b>2.3</b>	<b>1119</b>	<b>14.6</b>	<b>1886</b>	<b>24.7</b>	<b>1719</b>	<b>22.5</b>	<b>1125</b>	<b>14.7</b>	<b>641</b>	<b>8.4</b>	<b>722</b>	<b>9.4</b>	<b>250</b>	<b>3.3</b>	<b>7641</b>

Tabel 1.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		totaal
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#
Gonorroë	.	.	25	23.8	30	28.6	27	25.7	9	8.6	4	3.8	6	5.7	4	3.8	.	.	105
Syf.: Pr. & S.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia	3	0.5	117	18.1	251	38.9	174	26.9	62	9.6	24	3.7	9	1.4	6	0.9	.	.	646
herpes genitalis	.	.	9	7.9	37	32.5	37	32.5	17	14.9	5	4.4	3	2.6	6	5.3	.	.	114
genitale wratten	.	.	21	11.7	75	41.9	52	29.1	14	7.8	6	3.4	3	1.7	6	3.4	2	1.1	179
Overig	4	0.1	299	7.9	1073	28.3	1061	28.0	615	16.2	374	9.9	194	5.1	144	3.8	22	0.6	3786
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	2
Nihil *	7	0.2	225	8.0	741	26.2	753	26.6	461	16.3	289	10.2	177	6.3	157	5.5	19	0.7	2829
<b>TOTAAL</b>	<b>14</b>	<b>0.2</b>	<b>697</b>	<b>9.1</b>	<b>2207</b>	<b>28.8</b>	<b>2104</b>	<b>27.5</b>	<b>1178</b>	<b>15.3</b>	<b>702</b>	<b>9.2</b>	<b>393</b>	<b>5.1</b>	<b>324</b>	<b>4.2</b>	<b>43</b>	<b>0.6</b>	<b>7662</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 1.14 t/m 1.18a.

Tabel 1.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	280	54.7	5	1.0	21	4.1	76	14.8	130	25.4	.	.	512
Syfilis: Prim. & Sec.	6	33.3	.	.	1	5.6	4	22.2	7	38.9	.	.	18
Chlamydia infectie	836	56.4	40	2.7	51	3.4	271	18.3	284	19.2	.	.	1482
Herpes genitalis	142	62.0	2	0.9	2	0.9	24	10.5	59	25.8	.	.	229
Genitale wratten	279	65.0	7	1.6	16	3.7	45	10.5	82	19.1	.	.	429
Overig	4278	64.4	94	1.4	152	2.3	669	10.1	1454	21.9	.	.	6647
HIV+											23	23	23
Nihil	3562	59.7	185	3.1	183	3.1	571	9.6	1464	24.5	.	.	5965
<b>TOTAAL</b>	9383	61.3	333	2.2	426	2.8	1660	10.8	3480	22.7	23	0.2	15305

Tabel 1.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	145	35.6	243	59.7	18	4.4	1	0.2	407
Syfilis: Prim. & Sec.	12	70.6	4	23.5	1	5.9	.	.	17
Chlamydia infectie	654	78.2	162	19.4	19	2.3	1	0.1	836
Herpes genitalis	86	74.8	25	21.7	4	3.5	.	.	115
Genitale wratten	138	55.2	100	40.0	12	4.8	.	.	250
Overig	1935	67.6	810	28.3	107	3.7	9	0.3	2861
HIV+	7	35.0	10	50.0	2	10.0	1	5.0	20
Nihil	2369	75.5	656	20.9	105	3.3	6	0.2	3136
<b>TOTAAL</b>	<b>5346</b>	<b>100.0</b>	<b>2010</b>	<b>100.0</b>	<b>268</b>	<b>100.0</b>	<b>18</b>	<b>100.0</b>	<b>7642</b>

Tabel 1.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	14	3.4	30	7.4	358	88.0	5	1.2	407
Syfilis: Prim. & Sec.	1	5.9	4	23.5	12	70.6	.	.	17
Chlamydia infectie	18	2.2	80	9.6	734	87.8	4	0.5	836
Herpes genitalis	1	0.9	13	11.3	100	87.0	1	0.9	115
Genitale wratten	11	4.4	24	9.6	213	85.2	2	0.8	250
Overig	67	2.3	335	11.7	2445	85.5	14	0.5	2861
HIV+	1	5.0	.	.	19	95.0	.	.	20
Nihil	138	4.4	498	15.9	2481	79.1	19	0.6	3136
<b>TOTAAL</b>	<b>251</b>	<b>3.2</b>	<b>984</b>	<b>12.8</b>	<b>6362</b>	<b>83.3</b>	<b>45</b>	<b>0.6</b>	<b>7642</b>

Tabel 1.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		geen van beide		totaal
	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>					
Gonorrhoe	25	23.8	80	76.2	105
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	106	16.4	540	83.6	646
Herpes genitalis	11	9.6	103	90.4	114
Genitale wratten	42	23.5	137	76.5	179
Overig	706	18.6	3079	81.3	3786
HIV+	.	.	3	100.0	3
Nihil	817	28.9	2009	71.0	2829
<b>TOTAAL</b>	<b>1708</b>	<b>22.3</b>	<b>5951</b>	<b>77.7</b>	<b>7659</b>

Tabel 1.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		ja, ooit twee keer SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	91	17.8	193	37.7	10	2.0	218	42.6	512
Syfilis: Prim. & Sec.	3	16.7	5	27.8	0	.	10	55.6	18
Chlamydia infectie	351	23.7	277	18.7	12	0.8	842	56.8	1482
Herpes genitalis	58	25.3	32	14.0	3	1.3	136	59.4	229
Genitale wratten	115	26.8	69	16.1	4	0.9	241	56.2	429
Overig	1654	24.9	1026	15.4	44	0.7	3923	59.0	6647
HIV+	3	14.3	9	42.9	0	.	11	47.8	23
Nihil	1380	23.1	1032	17.3	42	0.7	3511	58.9	5965
<b>TOTAAL</b>	<b>3655</b>	<b>25.6</b>	<b>2643</b>	<b>18.5</b>	<b>115</b>	<b>0.8</b>	<b>7892</b>	<b>55.2</b>	<b>14305</b>



## **2: GG en GD Utrecht**

Tabel 2.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	297	55.10	145	51.60	363	51.86	805	52.96	872	52.72
vrouw	241	44.71	131	46.62	335	47.86	707	46.51	777	46.98
onbekend	1	0.19	5	1.78	2	0.29	8	0.53	5	0.30
<b>TOTAAL</b>	<b>539</b>	<b>100.00</b>	<b>281</b>	<b>100.00</b>	<b>700</b>	<b>100.00</b>	<b>1520</b>	<b>100.00</b>	<b>1654</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	49	9.09	27	9.61	87	12.43	163	10.72	136	8.22
februari	53	9.83	25	8.90	79	11.29	157	10.33	126	7.62
maart	38	7.05	30	10.68	34	4.86	102	6.71	121	7.32
april	32	5.94	28	9.96	40	5.71	100	6.58	106	6.41
mei	48	8.91	25	8.90	37	5.29	110	7.24	124	7.50
juni	37	6.86	24	8.54	47	6.71	108	7.11	103	6.23
juli	64	11.87	23	8.19	56	8.00	143	9.41	169	10.22
augustus	48	8.91	26	9.25	49	7.00	123	8.09	180	10.88
september	63	11.69	21	7.47	67	9.57	151	9.93	167	10.10
oktober	47	8.72	22	7.83	91	13.00	160	10.53	155	9.37
november	30	5.57	10	3.56	61	8.71	101	6.64	136	8.22
december	30	5.57	20	7.12	52	7.43	102	6.71	131	7.92
<b>TOTAAL</b>	<b>539</b>	<b>100.00</b>	<b>281</b>	<b>100.00</b>	<b>700</b>	<b>100.00</b>	<b>1520</b>	<b>100.00</b>	<b>1654</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>										
SOA-onderzoek	292	36.27	236	33.38	1	12.50	529	34.80	596	36.03
HIV-test	147	51.76	132	18.67	5	62.50	284	18.68	464	28.05
beide	366	45.47	339	47.95	2	25.00	707	46.51	594	35.91
<b>TOTAAL</b>	<b>805</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>	<b>8</b>	<b>100.00</b>	<b>1520</b>	<b>100.00</b>	<b>1654</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	totaal 1997	totaal 1996
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>					
geen SOA onderzoek, geen HIV test	.	.	.	.	.
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	.	.	6
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	281	.	281	456
SOA positief, geen HIV test	109	.	10	119	209
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	1
SOA positief, HIV negatief	.	.	55	55	41
SOA negatief, geen HIV test	416	.	4	420	400
SOA negatief, HIV positief	.	.	1	1	1
SOA negatief, HIV negatief	4	3	637	644	540
<b>TOTAAL</b>	<b>529</b>	<b>284</b>	<b>707</b>	<b>1520</b>	<b>1654</b>

Tabel 2.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>										
<14	4	0.50	4	0.57	.	.	8	0.53	4	0.24
15-19	18	2.24	67	9.48	.	.	85	5.59	178	10.76
20-24	168	20.87	256	36.21	2	25.00	426	28.03	478	28.90
25-29	214	26.58	173	24.47	1	12.50	388	25.53	346	20.92
30-34	162	20.12	86	12.16	2	25.00	250	16.45	241	14.57
35-39	76	9.44	46	6.51	1	12.50	123	8.09	148	8.95
40-44	64	7.95	28	3.96	.	.	92	6.05	105	6.35
45-54	75	9.32	34	4.81	.	.	109	7.17	97	5.86
>54	21	2.61	11	1.56	.	.	32	2.11	39	2.36
??	3	0.37	2	0.28	2	25.00	7	0.46	18	1.09
<b>TOTAAL</b>	<b>805</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>	<b>8</b>	<b>100.00</b>	<b>1520</b>	<b>100.00</b>	<b>1654</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>										
Nederland	676	83.98	642	90.81	7	87.50	1325	87.17	1466	88.63
Turkije	12	1.49	3	0.42	.	.	15	0.99	4	0.24
Marokko	25	3.11	4	0.57	.	.	29	1.91	24	1.45
Sur./ Ant./ Aru.	15	1.86	11	1.56	1	12.50	27	1.78	22	1.33
overig	65	8.07	43	6.08	.	.	108	7.11	100	6.05
onbekend	12	1.49	4	0.57	.	.	16	1.05	38	2.30
<b>TOTAAL</b>	<b>805</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>	<b>8</b>	<b>100.00</b>	<b>1520</b>	<b>100.00</b>	<b>1654</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.7:

Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	625	77.64	672	77.06
homoseksueel	128	15.90	147	16.86
biseksueel	37	4.60	22	2.52
onbekend	15	1.86	31	3.56
<b>TOTAAL</b>	<b>805</b>	<b>100.00</b>	<b>872</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.8:

Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>										
prostitutie(e)	6	0.75	25	3.54	.	.	31	2.04	39	2.36
prostituant(e)	71	8.82	.	.	.	.	71	4.67	90	5.44
geen van beide	681	84.59	645	94.16	8	100.00	1354	89.08	1242	75.09
onbekend	47	5.84	17	2.40	.	.	64	4.21	283	17.11
<b>TOTAAL</b>	<b>805</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>	<b>8</b>	<b>100.00</b>	<b>1520</b>	<b>100.00</b>	<b>1654</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.10:

Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>										
ja, ooit een SOA	118	14.66	76	10.75	1	12.50	195	12.83	276	16.69
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
nee	646	80.25	615	86.99	7	87.50	1268	83.42	1264	76.42
onbekend	41	5.09	16	2.26	.	.	57	3.75	114	6.89
<b>TOTAAL</b>	<b>805</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>	<b>8</b>	<b>100.00</b>	<b>1520</b>	<b>100.00</b>	<b>1654</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

DIAGNOSE	mannen		vrouwen		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Gonorrhoe (excl.PVG)	13	1.6	.	.			13	0.8	17	1.0
Gonorrhoe: PVG									1	0.1
Syfilis: niet gespecificeerd	4	0.5	1	0.1			5	0.3	.	.
" : primair									2	0.1
" : secundair									1	0.1
" : latens recens	4	0.5	1	0.1			5	0.3	4	0.2
" : latens tarda									3	0.2
Chlamydia infectie	44	5.3	43	5.8			87	5.5	91	5.3
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	1	0.1			1	0.1	3	0.2
" : primo:HSV-type1&2									.	.
" : primo: HSV type 1	2	0.2	3	0.4			5	0.3	5	0.3
" : primo: HSV type 2	2	0.2	1	0.1			3	0.2	8	0.5
" : recidief	3	0.4	.	.			3	0.2	2	0.1
Genitale wratten	20	2.4	21	2.9			41	2.6	45	2.6
Hepatitis B: acuut	2	0.2	.	.			2	0.1	1	0.1
Hepatitis B: chronisch									1	0.1
Niet Specifieke Urethritis	4	0.5	2	0.3			6	0.4	36	2.1
Bacteriele Vaginose	.	.	2	0.3			2	0.1	6	0.3
Trichomoniasis	1	0.1	2	0.3			3	0.2	2	0.1
Candidiasis	.	.	2	0.3			2	0.1	27	1.6
Schaamluis									2	0.1
Scabies	2	0.2	.	.			2	0.1	5	0.3
Ulcus molle									.	.
Granuloma inguinale									.	.
Overig/ niet gespecificeerd	2	0.2	1	0.1			3	0.2	15	0.9
PID									.	.
HIV +	.	.	1	0.1			1	0.1	8	0.5
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	103	12.3	86	11.0			184	11.6	285	16.6
HIV -	508	60.6	465	63.0	7	87.5	980	61.9	1037	60.2
Nihil *	227	27.1	192	26.0	1	12.5	420	26.5	400	23.2
<b>TOTAAL</b>	<b>838</b>	<b>52.9</b>	<b>738</b>	<b>46.6</b>	<b>8</b>	<b>0.5</b>	<b>1584</b>	<b>100</b>	<b>1722</b>	<b>100.0</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 2.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal #	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorrhoe	.	.	.	.	3	23.08	3	23.08	2	15.38	1	7.69	.	.	3	23.08	1	7.69	.	.	.	13
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	.	.	13	29.55	15	34.09	8	18.18	3	6.82	1	2.27	2	4.55	2	4.55	.	.	.	44
herpes genitalis	.	.	1	14.3	3	42.86	2	28.57	1	14.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
genitale wratten	1	5.00	.	.	4	20.00	8	40.00	3	15.00	1	5.00	1	5.00	2	10.00	.	.	.	.	.	20
overig	.	.	.	.	.	.	2	10.53	8	42.11	1	5.26	3	15.79	4	21.05	1	5.26	.	.	.	19
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	3	0.42	17	2.39	147	20.70	186	26.20	142	20.00	70	9.86	60	8.45	65	9.15	17	2.39	3	0.42	.	710
<b>TOTAAL</b>	4	0.49	18	2.21	170	20.91	216	26.57	164	20.17	76	9.35	65	8.00	76	9.35	21	2.58	3	0.37	.	813

Tabel 2.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal #		
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%			
<b>DIAGNOSE</b>																							
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	3	6.98	18	41.86	14	32.56	3	6.98	4	9.30	1	2.33	.	.	.	.	.	.	.	43	
herpes genitalis	.	.	.	.	1	20.00	2	40.00	2	40.00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
genitale wratten	1	4.76	2	9.52	8	38.10	6	28.57	1	4.76	2	9.52	.	.	1	4.76	.	.	.	.	.	21	
overig	.	.	1	9.09	3	27.27	3	27.27	1	9.09	.	.	3	27.27	.	.	.	.	.	.	.	11	
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
Nihil *	3	0.48	61	9.73	225	35.89	148	23.60	79	12.60	40	6.38	25	3.99	33	5.26	11	1.75	2	0.32	.	627	
<b>TOTAAL</b>	4	0.56	67	9.46	256	36.16	173	24.44	86	12.15	46	6.50	29	4.10	34	4.80	11	1.55	2	0.28	.	708	

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 2.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	7	53.85	2	15.38	2	15.38	1	7.69	1	7.69	.	.	13
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	72	82.76	1	1.15	3	3.45	4	4.60	6	6.90	1	1.15	87
Herpes genitalis	11	91.67	.	.	1	8.33	.	.	.	.	.	.	12
Genitale wratten	35	85.37	1	2.44	2	4.88	.	.	3	7.32	.	.	41
Overig	21	70.00	.	.	1	3.33	.	.	8	26.67	.	.	30
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	1181	87.81	12	0.89	21	1.56	23	1.71	93	6.91	15	1.12	1345
<b>TOTAAL</b>	1327	86.79	16	1.05	30	1.96	28	1.83	112	7.33	16	1.05	1529

Tabel 2.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	7	53.85	6	46.15	.	.	.	.	13
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	38	86.36	5	11.36	1	2.27	.	.	44
Herpes genitalis	6	85.71	.	.	.	.	1	14.29	7
Genitale wratten	12	60.00	5	25.00	.	.	3	15.00	20
Overig	15	78.95	4	21.05	.	.	.	.	19
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	554	78.03	109	15.35	36	5.07	11	1.55	710
<b>TOTAAL</b>	632	77.74	129	15.87	37	4.55	15	1.85	813

Tabel 2.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituuant		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	3	23.08	8	61.54	2	15.38	13
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	3	6.98	36	83.72	4	9.31	43
Herpes genitalis	.	.	1	16.67	4	66.67	1	16.67	6
Genitale wratten	.	.	1	5.88	16	94.12	.	.	17
Overig	.	.	1	5.26	17	89.47	1	5.26	19
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	6	0.86	63	9.03	605	86.67	24	3.44	698
<b>TOTAAL</b>	6	0.75	72	9.05	686	86.19	32	4.02	796

Tabel 2.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	2	4.65	.	.	4.1	95.35	.	.	43
Herpes genitalis	.	.	.	.	4	80.00	1	20.00	5
Genitale wratten	2	9.52	.	.	19	90.48	.	.	21
Overig	.	.	.	.	11	100.00	.	.	11
HIV+	.	.	.	.	1	100.00	.	.	1
Nihil	21	3.40	.	.	590	95.47	7	1.13	618
<b>TOTAAL</b>	25	3.58	.	.	666	95.28	8	1.15	699

Tabel 2.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		ja, ooit twee keer SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	5	38.46	.	.	8	61.54	.	.	13
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	7	8.05	.	.	79	90.80	1	1.75	87
Herpes genitalis	1	8.33	.	.	10	83.33	1	8.33	12
Genitale wratten	7	17.07	.	.	28	68.29	6	14.63	41
Overig	1	3.33	.	.	28	93.33	1	3.33	30
HIV+	.	.	.	.	1	100.00	.	.	1
Nihil	174	12.94	.	.	1123	83.49	48	3.57	1345
<b>TOTAAL</b>	195	12.75	.	.	1277	83.52	57	3.73	1529



### **3: GGD Rotterdam e.o.**

Tabel 3.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	144	50.17	57	45.24	12	66.67	213	49.42	829	55.41
vrouw	143	49.83	68	53.97	6	33.33	217	50.35	667	44.59
onbekend	.	.	1	0.79	.	.	1	0.23	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>287</b>	<b>100.00</b>	<b>126</b>	<b>100.00</b>	<b>18</b>	<b>100.00</b>	<b>431</b>	<b>100.00</b>	<b>1496</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	10	3.48	12	9.52	2	11.11	24	5.57	191	12.77
februari	14	4.88	1	0.79	2	11.11	17	3.94	158	10.56
maart	12	4.18	1	0.79	.	.	13	3.02	191	12.77
april	15	5.23	1	0.79	.	.	16	3.71	103	6.89
mei	24	8.36	24	19.05	3	16.67	51	11.83	103	6.89
juni	24	8.36	17	13.49	.	.	41	9.51	79	5.28
juli	43	14.98	22	17.46	6	33.33	71	16.47	112	7.49
augustus	35	12.20	6	4.76	.	.	41	9.51	141	9.43
september	17	5.92	7	5.56	.	.	24	5.57	80	5.35
oktober	33	11.50	16	12.70	1	5.56	50	11.60	144	9.63
november	29	10.10	13	10.32	1	5.56	43	9.98	101	6.75
december	31	10.80	6	4.76	3	16.67	40	9.28	93	6.22
<b>TOTAAL</b>	<b>287</b>	<b>100.00</b>	<b>126</b>	<b>100.00</b>	<b>18</b>	<b>100.00</b>	<b>431</b>	<b>100.00</b>	<b>1496</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>										
SOA-onderzoek	92	43.19	86	39.63	.	.	178	41.30	437	29.21
HIV-test	43	20.19	61	28.11	1	100.00	105	24.36	814	54.41
beide	9	4.23	3	1.38	.	.	12	2.78	205	13.70
onbekend	69	32.39	67	30.88	.	.	136	31.55	40	2.67
<b>TOTAAL</b>	<b>213</b>	<b>100.00</b>	<b>217</b>	<b>100.00</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>431</b>	<b>100.00</b>	<b>1496</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1997	totaal 1996
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, geen HIV test	.	.	.	.	.	.
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	2	.	13	15	12
geen SOA onderzoek, HIV negatief	2	98	4	7	111	813
SOA positief, geen HIV test	175	3	2	107	287	459
SOA positief, HIV positief	1	.	.	2	3	1
SOA positief, HIV negatief	.	2	6	7	15	118
SOA negatief, geen HIV test	.	.	.	.	.	46
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	1
SOA negatief, HIV negatief	.	.	.	.	.	46
<b>TOTAAL</b>	<b>178</b>	<b>105</b>	<b>12</b>	<b>136</b>	<b>431</b>	<b>1496</b>

Tabel 3.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>										
<14	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.13
15-19	10	4.69	25	11.52	.	.	35	8.12	154	10.29
20-24	24	11.27	64	29.49	.	.	88	20.42	384	25.67
25-29	52	24.41	50	23.04	.	.	102	23.67	276	18.45
30-34	40	18.78	34	15.67	.	.	74	17.17	258	17.25
35-39	36	16.90	16	7.37	.	.	52	12.06	150	10.03
40-44	12	5.63	13	5.99	.	.	25	5.80	108	7.22
45-54	25	11.74	8	3.69	.	.	34	7.89	119	7.95
>54	14	6.57	7	3.23	.	.	21	4.87	40	2.67
??	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0.33
<b>TOTAAL</b>	<b>213</b>	<b>100.00</b>	<b>217</b>	<b>100.00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>431</b>	<b>100.00</b>	<b>1496</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>										
Nederland	.	.	.	.	.	.	.	.	949	63.44
Turkije	.	.	.	.	.	.	.	.	54	3.61
Marokko	.	.	.	.	.	.	.	.	49	3.28
Sur./ Ant./ Aru.	.	.	.	.	.	.	.	.	218	14.57
overig	211	99.06	216	99.54	1	100.00	428	99.30	210	14.04
onbekend	2	0.94	1	0.46	.	.	3	0.70	16	1.07
<b>TOTAAL</b>	<b>213</b>	<b>100.00</b>	<b>217</b>	<b>100.00</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>431</b>	<b>100.00</b>	<b>1496</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	.	.	713	86.01
homoseksueel	.	.	88	10.62
biseksueel	.	.	27	3.26
onbekend	213	100.00	1	0.12
<b>TOTAAL</b>	213	100.00	829	100.00

Tabel 3.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>										
prostitutie(e)	6	2.82	20	9.22	.	.	26	6.03	122	8.16
prostituant(e)	25	11.74	.	.	.	.	25	5.80	108	7.22
geen van beide	132	61.97	143	65.90	1	100.00	276	64.04	1243	83.09
onbekend	50	23.48	54	24.88	.	.	104	24.13	23	1.54
<b>TOTAAL</b>	213	100.00	149	100.00	1	100.00	305	100.00	1496	100.00

Tabel 3.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>										
ja, ooit een SOA	34	15.96	18	8.29	.	.	52	12.06	388	25.94
ja, ooit twee SOA	4	1.88	6	2.76	.	.	10	2.32	.	.
nee	.	.	.	.	.	.	.	.	995	66.51
onbekend	175	82.16	193	88.94	1	100.00	369	85.61	113	7.55
<b>TOTAAL</b>	213	100.00	217	100.00	1	100.00	431	100.00	1496	100.00

Tabel 3.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

DIAGNOSE	mannen		vrouwen		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Gonorrhoe (excl.PVG)	30	12.6	13	5.4	.	.	43	9.0	83	4.9
Gonorrhoe: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primair	13	5.5	5	2.1	.	.	18	3.8	34	2.0
" : secundair	3	1.3	5	2.1	.	.	8	1.7	13	0.8
" : latens recens	11	4.6	12	5.0	.	.	23	4.8	34	2.0
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	35	14.7	48	19.9	.	.	83	17.3	138	8.2
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	19	8.0	20	8.3	.	.	39	8.1	38	2.3
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : recidief	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	40	16.8	32	13.3	.	.	72	15.0	162	9.6
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0.9
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	10	4.2	.	.	.	.	10	2.1	43	2.5
Bacteriele Vaginose	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0.4
Trichomoniasis	3	1.3	26	10.8	.	.	29	6.0	50	3.0
Candidiasis	.	.	5	2.1	.	.	5	1.0	13	0.8
Schaamluis	4	1.7	.	.	.	.	4	0.8	9	0.5
Scabies	1	0.4	1	0.4	.	.	2	0.4	2	0.1
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.1
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0.4
PID	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	10	4.2	8	3.3	.	.	18	3.8	14	0.8
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	179	75.2	175	72.6	.	.	354	73.8	664	39.4
HIV -	59	24.8	66	27.4	1	100	126	26.3	977	57.9
Nihil *	.	.	.	.	.	.	.	.	46	2.7
<b>TOTAAL</b>	<b>238</b>	<b>100</b>	<b>241</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>480</b>	<b>100</b>	<b>1687</b>	<b>100</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 3.13a:

Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	4	13.3	4	13.3	11	36.7	4	13.3	4	13.3	1	8.3	.	.	2	6.7	.	.	.	30
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	2	12.5	4	25.0	3	18.8	1	6.3	3	18.8	3	18.8	3	18.8	3	18.8
Chlamydia	.	.	.	.	5	14.3	10	28.6	5	14.3	6	17.1	2	5.7	3	8.6	4	11.4	4	11.4	4	11.4
herpes genitalis	.	.	1	5.3	.	.	4	21.1	4	21.1	3	15.8	2	10.5	2	10.5	3	17.6	3	17.6	3	17.6
genitale wratten	.	.	2	5.0	7	17.5	11	27.5	11	27.5	3	7.5	.	.	4	10.0	2	11.8	2	11.8	2	11.8
overig	.	.	2	6.9	2	6.9	3	10.3	8	27.6	3	10.3	2	6.9	8	27.6	1	5.9	1	5.9	1	5.9
HIV+	.	.	1	10.0	.	.	3	30.0	1	10.0	3	30.0	.	.	2	20.0	.	.	.	.	.	10
Nihil *	.	.	1	2.1	6	12.5	13	27.1	6	12.5	12	25.0	4	8.3	4	8.3	2	11.8	2	11.8	2	11.8
<b>TOTAAL</b>	.	.	11	4.9	24	10.6	57	25.1	43	18.9	37	16.3	12	5.3	26	11.5	17	7.5	17	7.5	17	7.5

Tabel 3.13b:

Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	2	15.4	2	15.4	3	23.1	2	15.4	2	15.4	1	7.7	1	7.7	.	.	.	.	.	13
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	1	10.0	2	20.0	1	10.0	.	.	2	20.0	4	40.0	4	40.0	4	40.0
Chlamydia	.	.	8	16.7	20	41.7	11	22.9	5	10.4	2	4.2	2	4.2	.	.	.	.	.	.	.	48
herpes genitalis	.	.	2	10.0	4	20.0	5	25.0	4	20.0	1	5.0	1	5.0	2	10.0	1	5.0	1	5.0	1	5.0
genitale wratten	.	.	3	9.4	12	37.5	9	28.1	6	18.8	1	3.1	.	.	.	.	1	3.1	1	3.1	1	3.1
overig	.	.	4	9.1	10	22.7	8	18.2	9	20.5	5	11.4	5	11.4	3	6.8	.	.	.	.	.	44
HIV+	.	.	.	.	2	25.0	2	25.0	2	25.0	2	25.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
Nihil *	.	.	10	16.1	20	32.3	18	29.0	4	6.5	3	4.8	5	8.1	1	1.6	1	1.6	1	1.6	1	1.6
<b>TOTAAL</b>	.	.	29	12.2	70	29.5	57	24.1	34	14.4	17	7.2	14	5.9	9	3.8	7	3.0	7	3.0	7	3.0

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 3.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	.	.	43	100.0	.	.	43
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	100.0	.	.	26
Chlamydia infectie	.	.	.	.	.	.	.	.	82	98.8	1	1.2	83
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	39	100.0	.	.	39
Genitale wratten	.	.	.	.	.	.	.	.	71	98.6	1	1.4	72
Overig	.	.	.	.	.	.	.	.	73	100.0	.	.	73
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	17	94.4	1	5.6	18
Nihil	.	.	.	.	.	.	.	.	111	100.0	.	.	111
<b>TOTAAL</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	462	99.4	3	0.6	465

Tabel 3.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	30	100	30
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	16	100	16
Chlamydia infectie	.	.	.	.	.	.	35	100	35
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	19	100	19
Genitale wratten	.	.	.	.	.	.	40	100	40
Overig	.	.	.	.	.	.	29	100	29
HIV+	.	.	.	.	.	.	10	100	10
Nihil	.	.	.	.	.	.	48	100	48
<b>TOTAAL</b>	.	.	.	.	.	.	227	100	227

Tabel 3.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitu�e		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	4	17.4	19	82.6	.	.	23
Syfilis: Prim. & Sec.	1	7.1	8	57.1	5	35.7	.	.	14
Chlamydia infectie	2	7.7	.	.	23	88.5	1	3.9	26
Herpes genitalis	.	.	1	7.1	13	92.9	.	.	14
Genitale wratten	1	3.5	3	10.3	24	82.8	1	3.5	29
Overig	.	.	7	31.8	14	63.6	1	4.6	22
HIV+	1	14.3	2	28.6	3	42.9	1	14.3	7
Nihil	1	2.3	2	4.7	38	88.4	2	4.7	43
<b>TOTAAL</b>	6	3.4	27	15.2	139	78.1	6	3.4	178

Tabel 3.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitu�e		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	4	36.4	.	.	7	63.6	.	.	11
Syfilis: Prim. & Sec.	2	33.3	.	.	4	66.7	.	.	6
Chlamydia infectie	7	21.2	.	.	26	78.8	.	.	33
Herpes genitalis	3	21.4	.	.	11	78.6	.	.	14
Genitale wratten	3	13.6	.	.	18	81.8	1	4.6	22
Overig	1	3.3	.	.	28	93.3	1	3.3	30
HIV+	2	33.3	.	.	3	50.0	1	16.7	6
Nihil	2	3.5	.	.	54	94.7	1	1.8	57
<b>TOTAAL</b>	24	13.4	.	.	151	84.4	4	2.2	179

Tabel 3.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		ja, ooit twee keer SOA gehad		N	nee		onbekend		totaal N
	N	%	N	%		N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>										
Gonorrhoe	6	14.0	2	4.7	.	.	35	81.4	43	
Syfilis: Prim. & Sec.	4	15.4	.	.	.	.	22	84.6	26	
Chlamydia infectie	19	22.9	.	.	.	.	64	77.1	83	
Herpes genitalis	5	9.43	.	.	.	.	34	87.2	39	
Genitale wratten	5	6.9	2	2.8	.	.	65	90.3	72	
Overig	5	6.9	3	4.1	.	.	65	89.0	73	
HIV+	1	5.6	1	5.6	.	.	16	88.9	18	
Nihil	8	7.21	2	1.8	.	.	101	91.0	111	
<b>TOTAAL</b>	53	11.4	10	2.15	.	.	402	86.5	465	



#### **4: GGD Arnhem**

Tabel 4.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	106	19.67	71	59.66	12	24.49	189	26.73	214	28.12
vrouw	433	80.33	48	40.34	37	75.51	518	73.27	547	71.88
onbekend	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>539</b>	<b>100.00</b>	<b>119</b>	<b>100.00</b>	<b>49</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>	<b>761</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	51	9.46	6	5.04	6	12.24	63	8.91	60	7.88
februari	47	8.72	18	15.13	3	6.12	68	9.62	45	5.91
maart	41	7.61	8	6.72	3	6.12	52	7.36	61	8.02
april	36	6.68	11	9.24	4	8.16	51	7.21	56	7.36
mei	42	7.79	7	5.88	3	6.12	52	7.36	62	8.15
juni	46	8.53	9	7.56	4	8.16	59	8.35	69	9.07
juli	39	7.24	15	12.61	7	14.29	61	8.63	62	8.15
augustus	53	9.83	9	7.56	3	6.12	65	9.19	54	7.10
september	46	8.53	9	7.56	6	12.24	61	8.63	62	8.15
oktober	53	9.83	6	5.04	2	4.08	61	8.63	86	11.30
november	50	9.28	12	10.08	4	8.16	66	9.34	69	9.07
december	35	6.49	9	7.56	4	8.16	48	6.79	75	9.86
<b>TOTAAL</b>	<b>539</b>	<b>100.00</b>	<b>119</b>	<b>100.00</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>	<b>761</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>										
SOA-onderzoek	106	56.08	433	83.59	.	.	539	76.24	564	74.11
HIV-test	71	37.57	49	9.46	.	.	120	16.97	161	21.16
beide	12	6.35	36	6.95	.	.	48	6.79	36	4.73
<b>TOTAAL</b>	<b>189</b>	<b>100.00</b>	<b>518</b>	<b>100.00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>	<b>761</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1997	totaal 1996
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	1	.	.	1	.
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	118	.	.	118	161
SOA positief, geen HIV test	128	.	.	.	128	137
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	1	5	.	6	5
SOA negatief, geen HIV test	411	.	.	.	411	429
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	.	.	43	.	43	29
<b>TOTAAL</b>	<b>539</b>	<b>120</b>	<b>48</b>	<b>.</b>	<b>707</b>	<b>761</b>

Tabel 4.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	1	0.53	.	.	1	0.14	5	0.66
15-19	7	3.70	54	10.42	61	8.63	124	16.29
20-24	29	15.34	161	31.08	190	26.87	215	28.25
25-29	41	21.69	132	25.48	173	24.47	162	21.29
30-34	33	17.46	85	16.41	118	16.69	107	14.06
35-39	16	8.47	28	5.41	44	6.22	64	8.41
40-44	18	9.52	26	5.02	44	6.22	32	4.20
45-54	29	15.34	27	5.21	56	7.92	30	3.94
>54	15	7.94	4	0.77	19	2.69	18	2.37
??	.	.	1	0.19	1	0.14	4	0.53
<b>TOTAAL</b>	<b>189</b>	<b>100.00</b>	<b>518</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>	<b>761</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	150	79.37	367	70.85	517	73.13	579	76.08
Turkije	1	0.53	1	0.19	2	0.28	3	0.39
Marokko	3	1.59	9	1.74	12	1.70	13	1.71
Sur./ Ant./ Aru.	10	5.29	19	3.67	29	4.10	22	2.89
overig	17	8.99	110	21.24	127	17.96	130	17.08
onbekend	8	4.23	12	2.32	20	2.83	14	1.84
<b>TOTAAL</b>	<b>189</b>	<b>100.00</b>	<b>518</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>	<b>761</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	151	79.89	175	81.78
homoseksueel	28	14.81	24	11.21
biseksueel	6	3.17	13	6.07
onbekend	4	2.12	2	0.93
<b>TOTAAL</b>	<b>189</b>	<b>100.00</b>	<b>214</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitue(e)	1	0.53	341	65.83	342	48.37	358	47.04
prostituant(e)	18	9.52	.	.	18	2.55	17	2.23
geen van beide	158	83.60	169	32.62	327	46.25	365	47.96
onbekend	12	6.35	8	1.54	20	2.83	21	2.76
<b>TOTAAL</b>	<b>189</b>	<b>100.00</b>	<b>518</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>	<b>761</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	29	15.34	150	28.96	179	25.32	129	16.95
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	37	4.86
nee	126	66.67	338	65.25	464	65.63	493	64.78
onbekend	34	17.99	30	5.79	64	9.05	102	13.40
<b>TOTAAL</b>	<b>189</b>	<b>100.00</b>	<b>518</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>	<b>761</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

DIAGNOSE	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Gonorroë (excl.PVG)	6	3.1	9	1.7	15	2.1	15	1.9
Gonorroë: PVG	.	.	1	0.2	1	0.1	3	0.4
Syfilis: niet gespecificeerd	1	0.5	1	0.2	2	0.3	2	0.3
" : primair	1	0.5	1	0.2	2	0.3	2	0.3
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	8	4.2	35	6.5	43	5.9	57	7.3
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	.	.	.	.	2	0.3
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : recidief	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	10	5.2	7	1.3	17	2.3	12	1.5
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	1	0.5	3	0.6	4	0.6	.	.
Bacteriele Vaginose	.	.	43	8.0	43	5.9	37	4.7
Trichomoniasis	.	.	.	.	.	.	.	.
Candidiasis	2	1.0	12	2.2	14	1.9	19	2.4
Schaamluis	.	.	.	.	.	.	.	.
Scabies	.	.	.	.	.	.	1	0.1
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	.	.	11	2.0	11	1.5	7	0.9
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	.	.	1	0.2	1	0.1	.	.
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	29	15.0	124	23.0	153	20.9	157	20.1
HIV -	83	43.0	84	15.6	167	22.9	195	25.0
Nihil *	81	42.0	330	61.3	411	56.2	429	54.9
<b>TOTAAL</b>	<b>193</b>	<b>100</b>	<b>538</b>	<b>100</b>	<b>731</b>	<b>100</b>	<b>781</b>	<b>100</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 4.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	.	.	2	33.3	1	16.7	1	16.7	1	16.7	.	.	.	.	1	16.7	.	.	.	6
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia	.	.	1	12.5	.	.	3	37.5	1	12.5	2	25.0	.	.	1	12.5	.	.	.	.	.	8
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
genitale wratten	1	10.0	.	.	4	40.0	1	10.0	1	10.0	1	10.0	1	10.0	1	10.0	.	.	.	.	.	10
overig	.	.	.	.	1	25.0	.	.	1	25.0	.	.	1	25.0	1	25.0	.	.	.	.	.	4
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	.	.	6	3.7	23	14.2	37	22.8	29	17.9	12	7.4	15	9.3	26	16.1	14	8.6	.	.	.	162
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>	<b>0.5</b>	<b>7</b>	<b>3.7</b>	<b>30</b>	<b>15.7</b>	<b>42</b>	<b>22.0</b>	<b>33</b>	<b>17.3</b>	<b>16</b>	<b>8.4</b>	<b>18</b>	<b>9.4</b>	<b>29</b>	<b>15.2</b>	<b>15</b>	<b>7.9</b>	.	.	.	<b>191</b>

Tabel 4.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	1	10.0	5	50.0	2	20.0	2	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia	.	.	6	17.1	15	42.9	10	28.6	1	2.9	1	2.9	2	5.7	.	.	.	.	.	.	.	35
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
genitale wratten	.	.	.	.	.	.	3	42.9	.	.	.	.	2	28.6	1	14.3	.	.	1	14.3	.	7
overig	.	.	10	14.3	25	35.7	12	17.1	14	20.0	2	2.9	3	4.3	4	5.7	.	.	.	.	.	70
HIV+	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	.	.	41	10.0	120	29.3	106	25.9	72	17.6	25	6.1	20	4.9	22	5.4	4	1.0	.	.	.	410
<b>TOTAAL</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>58</b>	<b>10.9</b>	<b>166</b>	<b>31.1</b>	<b>134</b>	<b>25.1</b>	<b>89</b>	<b>16.7</b>	<b>28</b>	<b>5.2</b>	<b>27</b>	<b>5.1</b>	<b>27</b>	<b>5.1</b>	<b>4</b>	<b>0.8</b>	<b>1</b>	<b>0.2</b>	<b>.</b>	<b>534</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 4.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	12	75.0	.	.	.	.	1	6.3	3	18.8	.	.	16
Syfilis: Prim. & Sec.	2	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Chlamydia infectie	29	67.4	1	2.3	.	.	4	9.3	8	18.6	1	2.3	43
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	16	94.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5.9	17
Overig	42	56.8	1	1.4	2	2.7	2	2.7	24	32.4	3	4.1	74
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	428	74.8	1	0.2	10	1.8	22	3.9	95	16.6	16	2.8	572
<b>TOTAAL</b>	529	73.0	3	0.4	12	1.7	29	4.0	131	18.1	21	2.9	725

Tabel 4.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	3	50.0	3	50.00	.	.	.	.	6
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	5	62.5	3	37.5	.	.	.	.	8
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	5	50.0	4	40.0	.	.	1	10.0	10
Overig	1	25.0	3	75.0	.	.	.	.	4
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	138	85.2	15	9.3	6	3.7	3	1.9	162
<b>TOTAAL</b>	152	79.6	29	15.2	6	3.1	4	2.1	191

Tabel 4.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	2	33.3	4	66.7	.	.	6
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	.	.	.	.	8	100.0	.	.	8
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	1	10.0	.	.	7	70.0	2	20.0	10
Overig	.	.	1	25.0	3	75.0	.	.	4
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	.	.	15	9.3	137	84.6	10	6.2	162
<b>TOTAAL</b>	1	0.5	18	9.4	160	83.8	12	6.3	191

Tabel 4.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	9	90.0	.	.	1	10.0	.	.	10
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	22	62.9	.	.	12	34.3	1	2.9	35
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	2	28.6	.	.	5	71.4	.	.	7
Overig	54	77.1	.	.	14	20.0	2	2.9	70
HIV+	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Nihil	261	63.7	.	.	143	34.9	6	1.5	410
<b>TOTAAL</b>	350	65.5	.	.	175	32.8	9	1.7	534

Tabel 4.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		ja, ooit twee keer SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	6	37.50	.	.	9	56.25	1	6.25	16
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	2	100.00	.	.	2
Chlamydia infectie	15	34.88	.	.	23	53.49	5	11.63	43
Herpes genitalis			.	.					
Genitale wratten	5	29.41	.	.	11	64.71	1	5.88	17
Overig	19	25.68	.	.	50	67.57	5	6.76	74
HIV+	.	.	.	.	1	100.00	.	.	1
Nihil	135	23.60	.	.	382	66.78	55	9.62	572
<b>TOTAAL</b>	180	24.83	.	.	478	65.93	67	9.24	725



## **5: GGD regio Nijmegen**

Tabel 5.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	218	36.15	88	44.90	1	33.33	307	38.28	308	41.90
vrouw	385	63.85	108	55.10	2	66.67	495	61.72	427	58.10
<b>TOTAAL</b>	<b>603</b>	<b>100.00</b>	<b>196</b>	<b>100.00</b>	<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>802</b>	<b>100.00</b>	<b>735</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	47	7.78	15	7.65	1	33.33	63	7.85	42	5.71
februari	45	7.45	15	7.65	.	.	60	7.47	54	7.35
maart	39	6.46	20	10.20	.	.	59	7.35	49	6.67
april	50	8.28	12	6.12	.	.	62	7.72	51	6.94
mei	51	8.44	27	13.78	1	33.33	79	9.84	65	8.84
juni	55	9.11	18	9.18	.	.	73	9.09	64	8.71
juli	61	10.10	15	7.65	.	.	76	9.46	46	6.26
augustus	35	5.79	17	8.67	.	.	52	6.48	71	9.66
september	52	8.61	12	6.12	.	.	64	7.97	68	9.25
oktober	57	9.44	18	9.18	.	.	75	9.34	89	12.11
november	60	9.93	18	9.18	1	33.33	79	9.84	74	10.07
december	52	8.61	9	4.59	.	.	61	7.60	59	8.03
onbekend	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0.41
<b>TOTAAL</b>	<b>604</b>	<b>100.00</b>	<b>196</b>	<b>100.00</b>	<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>803</b>	<b>100.00</b>	<b>735</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>								
SOA-onderzoek	217	70.68	380	76.77	597	74.44	474	64.49
HIV-test	88	28.66	109	22.02	197	24.56	257	34.97
beide	2	0.65	2	0.40	4	0.50	4	0.54
onbekend	.	.	4	0.81	4	0.50	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>307</b>	<b>100.00</b>	<b>495</b>	<b>100.00</b>	<b>802</b>	<b>100.00</b>	<b>735</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1997	totaal 1996
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	3	.	.	3	2
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	191	2	.	193	250
SOA positief, geen HIV test	184	2	.	1	187	197
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	1	.	.	1	1
SOA negatief, geen HIV test	413	.	1	3	417	285
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	1	.	1	.	2	.
<b>TOTAAL</b>	<b>598</b>	<b>197</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>803</b>	<b>735</b>

Tabel 5.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	3	0.98	5	1.01	8	1.00	3	0.41
15-19	14	4.56	37	7.46	51	6.34	66	8.98
20-24	44	14.33	173	34.88	217	26.99	243	33.06
25-29	84	27.36	125	25.20	209	26.00	160	21.77
30-34	46	14.98	69	13.91	116	14.43	97	13.20
35-39	46	14.98	37	7.47	83	10.35	62	8.44
40-44	23	7.49	28	5.66	51	6.36	27	3.67
45-54	30	9.77	20	4.04	50	6.23	54	7.35
>54	15	4.89	1	0.20	16	2.00	16	2.18
??	2	0.65	1	0.20	3	0.37	7	0.95
<b>TOTAAL</b>	<b>307</b>	<b>100.00</b>	<b>495</b>	<b>100.00</b>	<b>802</b>	<b>100.00</b>	<b>735</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	259	84.36	359	72.53	618	77.06	594	80.82
Turkije	6	1.95	3	0.61	9	1.12	4	0.54
Marokko	2	0.65	4	0.81	6	0.75	4	0.54
Sur./ Ant./ Aru.	6	1.95	6	1.21	12	1.50	11	1.50
overig	34	11.07	122	24.65	156	19.45	114	15.51
onbekend	.	.	1	0.20	1	0.12	8	1.09
<b>TOTAAL</b>	<b>307</b>	<b>100.00</b>	<b>495</b>	<b>100.00</b>	<b>802</b>	<b>100.00</b>	<b>735</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	251	81.76	257	83.44
homoseksueel	40	13.03	39	12.66
biseksueel	14	4.56	11	3.57
onbekend	2	0.65	2	0.25
<b>TOTAAL</b>	<b>307</b>	<b>100.00</b>	<b>495</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitut(e)	3	0.98	170	34.34	173	21.57	138	18.78
prostituant(e)	42	13.68	1	0.20	43	5.36	36	4.90
geen van beide	259	84.36	323	65.25	582	72.57	558	75.92
onbekend	3	0.98	1	0.20	4	0.50	3	0.41
<b>TOTAAL</b>	<b>307</b>	<b>100.00</b>	<b>495</b>	<b>100.00</b>	<b>802</b>	<b>100.00</b>	<b>735</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	55	17.92	71	14.34	126	15.71	103	14.01
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	4	0.54
nee	236	76.87	410	82.83	646	80.55	617	83.95
onbekend	16	5.21	14	2.83	30	3.74	11	1.50
<b>TOTAAL</b>	<b>307</b>	<b>100.00</b>	<b>495</b>	<b>100.00</b>	<b>802</b>	<b>100.00</b>	<b>735</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

DIAGNOSE	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Gonorroë (excl.PVG)	2	0.7	1	0.2	3	0.4	14	1.8
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.	1	0.1
Syfilis: niet gespecificeerd	1	0.3	4	0.8	5	0.6	.	.
" : primair	.	.	.	.	.	.	3	0.4
" : secundair	.	.	2	0.4	2	0.2	3	0.4
" : latens recens	1	0.3	2	0.4	3	0.4	1	0.1
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	22	7.1	29	5.7	51	6.2	60	7.8
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	3	0.6	3	0.4	4	0.5
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	1	0.3	1	0.2	2	0.2	1	0.1
" : primo: HSV type 2	1	0.3	1	0.2	2	0.2	2	0.3
" : recidief	.	.	1	0.2	1	0.1	3	0.4
Genitale wratten	10	3.2	5	1.0	15	1.8	11	1.4
Hepatitis B: acuut	1	0.3	1	0.2	2	0.2	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	1	0.2	1	0.1	.	.
Niet Specifieke Urethritis	7	2.3	4	0.8	11	1.3	3	0.4
Bacteriele Vaginose	.	.	38	7.4	38	4.6	43	5.6
Trichomoniasis	.	.	.	.	.	.	7	0.9
Candidiasis	5	1.6	50	9.8	55	6.7	65	8.5
Schaamluis	3	1.0	1	0.2	4	0.5	1	0.1
Scabies	.	.	1	0.2	1	0.1	.	.
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	4	1.3	1	0.2	5	0.6	8	1.0
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	1	0.3	2	0.4	3	0.4	2	0.3
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	59	19.1	148	29.0	207	25.2	232	30.2
HIV -	88	28.5	108	21.1	196	23.9	251	32.7
Nihil *	162	52.4	255	49.9	417	50.9	285	37.1
<b>TOTAAL</b>	<b>309</b>	<b>100</b>	<b>511</b>	<b>100</b>	<b>820</b>	<b>100</b>	<b>768</b>	<b>100</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 5.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	2
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	2	9.1	1	4.6	11	50.0	3	13.6	2	9.1	1	4.6	.	.	1	4.6	1	4.6	1	22
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
genitale wratten	.	.	.	.	1	10.0	3	30.0	.	.	1	10.0	4	40.0	1	10.0	.	.	.	.	.	10
overig	.	.	.	.	1	4.6	3	13.6	4	18.2	4	18.2	4	18.2	2	9.1	4	18.2	.	.	.	22
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	3	1.2	12	4.8	41	16.4	66	26.4	38	15.2	39	15.6	14	5.6	27	10.8	9	3.6	1	0.4	1	250
<b>TOTAAL</b>	3	1.0	14	4.5	44	14.2	84	27.2	46	14.9	47	15.2	24	7.8	30	9.7	15	4.9	2	0.7	2	309

Tabel 5.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Chlamydia	.	.	3	10.3	16	55.2	8	27.6	1	3.5	.	.	1	3.5	.	.	.	.	.	.	.	29
herpes genitalis	.	.	.	.	3	50.0	1	16.7	.	.	1	16.7	1	16.7	.	.	.	.	.	.	.	6
genitale wratten	.	.	1	20.0	2	40.0	.	.	1	20.0	.	.	.	.	.	.	1	20.0	.	.	.	5
overig	1	1.0	9	8.7	34	33.0	27	26.2	19	18.5	8	7.8	2	1.9	3	2.9	.	.	.	.	103	
HIV+	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	2
Nihil *	4	1.1	24	6.6	124	34.3	92	25.4	48	13.3	28	7.7	23	6.4	18	5.0	.	.	1	0.3	1	362
<b>TOTAAL</b>	5	1.0	37	7.3	179	35.1	131	25.7	69	13.5	38	7.5	28	5.5	21	4.1	1	0.2	1	0.2	1	510

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 5.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	3	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	1	50.0	.	.	2
Chlamydia infectie	38	74.5	2	3.9	.	.	.	.	11	21.6	.	.	51
Herpes genitalis	7	87.5	.	.	.	.	.	.	1	12.5	.	.	8
Genitale wratten	15	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
Overig	83	65.9	.	.	.	.	4	3.2	39	31.0	.	.	126
HIV+	1	33.3	.	.	.	.	.	.	2	66.7	.	.	3
Nihil	479	78.3	7	1.1	5	0.8	9	1.5	111	18.1	1	0.2	612
<b>TOTAAL</b>	626	76.3	9	1.1	6	0.7	13	1.6	165	20.1	1	0.1	820

Tabel 5.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	1	50.0	.	.	1	50.0	.	.	2
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	19	86.4	2	9.1	.	.	1	4.6	22
Herpes genitalis	2	100.0	.	.	.	.	.	.	2
Genitale wratten	6	60.0	3	30.0	1	10.0	.	.	10
Overig	16	72.7	3	13.6	3	13.6	.	.	22
HIV+	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Nihil	207	82.8	32	12.8	10	4.0	1	0.4	250
<b>TOTAAL</b>	252	81.6	40	12.9	15	4.9	2	0.7	309

Tabel 5.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitu�e		prostituant		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	1	4.6	19	86.4	2	9.1	22
Herpes genitalis	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Genitale wratten	.	.	1	10.0	9	90.0	.	.	10
Overig	.	.	5	22.7	17	77.3	.	.	22
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	3	1.2	35	14.0	211	84.4	1	0.4	250
<b>TOTAAL</b>	3	1.0	42	13.6	261	84.5	3	1.0	309

Tabel 5.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitu�e		prostituant		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	1	100.0	1
Syfilis: Prim. & Sec.	1	50.0	.	.	1	50.0	.	.	2
Chlamydia infectie	13	44.8	.	.	15	51.7	1	3.5	29
Herpes genitalis	1	16.7	.	.	5	83.3	.	.	6
Genitale wratten	2	40.0	.	.	3	60.0	.	.	5
Overig	45	43.7	.	.	58	56.3	.	.	103
HIV+	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Nihil	115	31.8	1	0.3	247	68.2	.	.	362
<b>TOTAAL</b>	177	34.7	1	0.2	331	64.9	2	0.4	510

Tabel 5.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		ja, ooit twee keer SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	1	33.33	.	.	1	33.33	1	33.33	3
Syfilis: Prim. & Sec.	1	50.00	.	.	1	50.00	.	.	2
Chlamydia infectie	13	25.49	.	.	32	62.75	6	11.76	51
Herpes genitalis	.	.	.	.	7	87.50	1	12.50	8
Genitale wratten	1	6.67	.	.	13	86.67	1	6.67	15
Overig	28	22.22	.	.	96	76.19	2	1.59	126
HIV+	.	.	.	.	2	66.67	1	33.33	3
Nihil	86	14.05	.	.	507	82.84	19	3.10	612
<b>TOTAAL</b>	130	15.85	.	.	659	80.37	31	3.78	820



## 6: GGD Den Haag

Tabel 6.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	181	60.33	31	77.50	1	50.00	213	62.28	360	56.60
vrouw	119	39.67	9	22.50	1	50.00	129	37.72	276	43.40
<b>TOTAAL</b>	<b>300</b>	<b>100.00</b>	<b>40</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>100.00</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>	<b>636</b>	<b>100.00</b>

Tabel 6.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	20	6.67	7	17.50	.	.	27	7.89	46	7.23
februari	14	4.67	2	5.00	1	50.00	17	4.97	43	6.76
maart	18	6.00	2	5.00	1	50.00	21	6.14	40	6.29
april	25	8.33	9	22.50	.	.	34	9.94	38	5.97
mei	20	6.67	4	10.00	.	.	24	7.02	60	9.43
juni	14	4.67	1	2.50	.	.	15	4.39	70	11.01
juli	30	10.00	6	15.00	.	.	36	10.53	48	7.55
augustus	42	14.00	.	.	.	.	42	12.28	52	8.18
september	29	9.67	.	.	.	.	29	8.48	97	15.25
oktober	33	11.00	1	2.50	.	.	34	9.94	64	10.06
november	29	9.67	4	10.00	.	.	33	9.65	55	8.65
december	26	8.67	4	10.00	.	.	30	8.77	21	3.30
onbekend	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.31
<b>TOTAAL</b>	<b>300</b>	<b>100.00</b>	<b>40</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>100.00</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>	<b>636</b>	<b>100.00</b>

Tabel 6.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>								
SOA-onderzoek	145	68.08	91	70.54	236	69.01	485	76.26
HIV-test	38	17.84	14	10.85	52	15.20	126	19.81
beide	28	13.15	22	17.05	50	14.62	25	3.93
onbekend	2	0.94	2	1.55	4	1.17	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>213</b>	<b>100.00</b>	<b>129</b>	<b>100.00</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>	<b>636</b>	<b>100.00</b>

Tabel 6.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1997	totaal 1996
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	.	.	.	5
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	40	.	.	40	118
SOA positief, geen HIV test	210	1	9	4	224	462
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	1
SOA positief, HIV negatief	.	.	.	.	.	4
SOA negatief, geen HIV test	26	9	41	.	76	37
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	.	2	.	.	2	9
<b>TOTAAL</b>	<b>236</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>342</b>	<b>636</b>

Tabel 6.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	.	.	1	0.78	1	0.29	3	0.47
15-19	5	2.35	12	9.30	17	4.97	64	10.06
20-24	35	16.43	40	31.01	75	21.93	130	20.44
25-29	49	23.00	23	17.83	72	21.05	144	22.64
30-34	46	21.60	16	12.40	62	18.13	115	18.08
35-39	33	15.49	17	13.18	50	14.62	55	8.65
40-44	24	11.27	7	5.43	31	9.06	38	5.97
45-54	13	6.10	7	5.43	20	5.85	40	6.29
>54	3	1.41	3	2.33	6	1.75	17	2.67
??	5	2.35	3	2.33	8	2.34	30	4.72
<b>TOTAAL</b>	<b>213</b>	<b>100.00</b>	<b>129</b>	<b>100.00</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>	<b>636</b>	<b>100.00</b>

Tabel 6.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	141	66.20	90	69.77	231	67.54	374	58.81
Turkije	26	12.21	2	1.55	28	8.19	45	7.08
Marokko	6	2.82	3	2.33	9	2.63	17	2.67
Sur./ Ant./ Aru.	22	10.33	10	7.75	32	9.36	98	15.41
overig	15	7.04	22	17.05	37	10.82	91	14.31
onbekend	3	1.41	2	1.55	5	1.46	11	1.73
<b>TOTAAL</b>	<b>213</b>	<b>100.00</b>	<b>129</b>	<b>100.00</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>	<b>636</b>	<b>100.00</b>

Tabel 6.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	176	82.63	300	83.33
homoseksueel	34	15.96	48	13.33
biseksueel	3	1.41	7	1.94
onbekend	.	.	5	1.39
<b>TOTAAL</b>	213	100.00	360	100.00

Tabel 6.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitutie(e)	1	0.48	14	11.57	15	4.57	62	9.75
prostituante(e)	46	22.22	.	.	46	14.02	105	16.51
geen van beide	158	76.33	106	87.61	264	80.48	421	66.19
onbekend	2	0.97	1	0.83	3	0.91	48	7.55
<b>TOTAAL</b>	207	100.00	121	100.00	328	100.00	636	100.00

Tabel 6.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	41	19.25	17	13.18	58	16.96	129	20.28
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	34	5.35
nee	146	68.54	97	75.19	243	71.05	414	65.09
onbekend	26	12.21	15	11.63	41	11.99	59	9.28
<b>TOTAAL</b>	213	100.00	129	100.00	342	100.00	636	100.00

Tabel 6.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>								
Gonorroë (excl.PVG)	28	12.2	7	4.9	35	9.4	77	11.4
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	3	1.3	1	0.7	4	1.1	.	.
" : primair	6	2.6	3	2.1	9	2.4	13	1.9
" : secundair	1	0.4	1	0.7	2	0.5	5	0.7
" : latens recens	1	0.4	2	1.4	3	0.8	2	0.3
" : latens tarda	.	.	1	0.7	1	0.3	3	0.4
Chlamydia infectie	37	16.1	32	22.5	69	18.6	153	22.6
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	7	3.0	1	0.7	8	2.2	10	1.5
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	1	0.1
" : primo: HSV type 2	1	0.4	.	.	1	0.3	9	1.3
" : recidief	3	1.3	1	0.7	4	1.1	4	0.6
Genitale wratten	14	6.1	12	8.5	26	7.0	40	5.9
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	1	0.7	1	0.3	.	.
Niet Specifieke Urethritis	37	16.1	4	2.8	41	11.0	82	12.1
Bacteriele Vaginose	3	1.3	5	3.5	8	2.2	31	4.6
Trichomoniasis	.	.	1	0.7	1	0.3	2	0.3
Candidiasis	5	2.2	16	11.3	21	5.7	43	6.4
Schaamluis	3	1.3	1	0.7	4	1.1	8	1.2
Scabies	4	1.7	3	2.1	7	1.9	11	1.6
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	2	0.3
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	2	0.9	3	2.1	5	1.3	6	0.9
PID	.	.	.	.	.	.	1	0.1
HIV +	.	.	.	.	.	.	6	0.9
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	155	67.4	95	66.9	250	67.2	509	75.1
HIV -	32	13.9	10	7.0	42	11.3	131	19.4
Nihil *	43	18.7	37	26.1	80	21.5	37	5.5
<b>TOTAAL</b>	230	100	142	100	372	100	677	100

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 6.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#
Gonorroë	.	.	.	.	3	10.7	7	25.0	7	25.0	4	14.3	5	17.9	.	.	.	.	2	7.1	28
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	2	28.6	2	28.6	1	14.3	.	.	2	28.6	.	.	.	.	.	.	7
Chlamydia	.	.	.	.	3	8.1	11	29.7	5	13.5	7	18.9	3	8.1	4	30.8	1	2.7	3	8.1	37
herpes genitalis	.	.	.	.	2	18.2	2	18.2	3	27.3	2	18.2	1	9.1	1	9.1	.	.	.	.	11
genitale wratten	.	.	1	7.1	3	21.4	3	21.4	4	28.6	2	14.3	1	7.4	.	.	.	.	.	.	14
overig	.	.	1	1.7	5	8.6	12	20.7	11	19.0	12	20.7	7	12.1	6	10.3	2	3.5	2	3.5	58
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	.	.	3	4.0	20	26.7	18	24.0	16	21.3	8	10.7	7	9.3	2	9.3	1	1.3	.	.	75
<b>TOTAAL</b>	.	.	5	2.2	38	16.5	55	23.9	47	20.4	35	15.2	26	11.3	13	5.7	4	1.7	7	3.0	230

Tabel 6.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#
Gonorroë	.	.	.	.	1	14.3	.	.	1	14.3	1	14.3	1	14.3	1	14.3	.	.	2	28.6	7
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	2	50.0	.	.	1	25.0	.	.	1	25.0	.	.	.	.	.	.	4
Chlamydia	.	.	1	3.1	11	34.4	7	21.9	5	15.6	3	9.4	2	6.3	1	3.1	.	.	2	6.3	32
herpes genitalis	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
genitale wratten	.	.	4	33.3	4	33.3	2	16.7	1	8.3	.	.	1	8.3	.	.	.	.	.	.	12
overig	.	.	4	10.5	16	42.1	6	15.8	4	10.5	5	13.2	1	2.6	.	.	1	2.6	1	2.6	38
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	1	2.1	3	6.4	9	19.2	11	23.4	5	10.6	9	19.2	1	2.1	6	12.8	2	4.3	.	.	47
<b>TOTAAL</b>	1	0.7	13	9.2	44	31.0	26	18.3	17	12.0	18	12.7	7	4.9	8	5.6	3	2.1	5	3.5	142

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 6.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	20	57.1	6	17.7	1	2.9	6	17.1	2	5.7	.	.	35
Syfilis: Prim. & Sec.	2	18.2	2	18.2	2	18.2	3	27.3	2	18.2	.	.	11
Chlamydia infectie	45	65.2	6	8.7	1	1.5	7	10.1	9	13.0	1	1.5	69
Herpes genitalis	11	84.6	.	.	.	.	1	7.7	1	7.7	.	.	13
Genitale wratten	15	57.7	3	11.5	.	.	5	19.2	1	3.9	2	7.7	26
Overig	57	59.4	12	12.5	4	4.2	7	7.3	15	15.6	1	1.0	96
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	96	78.7	5	4.1	1	0.8	6	4.9	12	9.8	2	1.6	122
<b>TOTAAL</b>	246	66.1	34	9.1	9	2.4	35	9.4	42	11.3	6	1.61	372

Tabel 6.15:  
Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	
<b>DIAGNOSE</b>								
Gonorrhoe	17	60.7	10	35.7	1	3.6	28	
Syfilis: Prim. & Sec.	6	85.7	1	14.3	.	.	7	
Chlamydia infectie	28	75.7	8	21.6	1	2.7	37	
Herpes genitalis	10	90.9	1	9.1	.	.	11	
Genitale wratten	12	85.7	2	14.3	.	.	14	
Overig	49	84.5	7	12.1	2	3.5	58	
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	
Nihil	67	89.3	8	10.7	.	.	75	
<b>TOTAAL</b>	189	82.2	37	16.1	4	1.7	230	

Tabel 6.16a:  
Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitu�e		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	
<b>DIAGNOSE</b>										
Gonorrhoe	.	.	9	34.6	17	65.4	.	.	26	
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	2	33.3	4	66.7	.	.	6	
Chlamydia infectie	1	2.7	11	29.7	25	67.6	.	.	37	
Herpes genitalis	.	.	.	.	11	100	.	.	11	
Genitale wratten	.	.	3	21.4	11	78.6	.	.	14	
Overig	.	.	17	30.4	39	69.6	.	.	56	
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Nihil	.	.	7	9.5	65	87.8	2	2.7	74	
<b>TOTAAL</b>	1	0.5	49	21.9	172	76.8	2	0.9	224	

Tabel 6.16b:  
Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitu�e		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	
<b>DIAGNOSE</b>										
Gonorrhoe	1	16.7	.	.	5	83.3	.	.	6	
Syfilis: Prim. & Sec.	2	50.0	.	.	2	50.0	.	.	4	
Chlamydia infectie	4	13.3	.	.	26	87.7	.	.	30	
Herpes genitalis	.	.	.	.	2	100	.	.	2	
Genitale wratten	.	.	.	.	11	100	.	.	11	
Overig	5	14.3	.	.	30	85.7	.	.	35	
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Nihil	4	9.1	.	.	38	88.6	2	4.6	44	
<b>TOTAAL</b>	16	12.0	.	.	114	86.4	2	4.6	132	

Tabel 6.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		ja, ooit twee keer SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	10	28.6	.	.	17	48.6	8	22.9	35
Syfilis: Prim. & Sec.	4	36.4	.	.	3	27.3	4	36.4	11
Chlamydia infectie	18	26.5	.	.	45	66.2	5	7.4	68
Herpes genitalis	3	23.1	.	.	10	76.9	.	.	68
Genitale wratten	5	20.0	.	.	18	72.0	2	8.0	25
Overig	19	20.0	.	.	57	60.0	19	20.0	95
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	5	4.2	.	.	106	89.8	7	5.9	118
<b>TOTAAL</b>	64	17.5	.	.	256	70.1	45	12.3	365



## **7: GGD Midden Brabant**

Tabel 7.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	245	52.69	96	57.83	.	.	341	54.04	268	44.44
vrouw	220	47.31	70	42.17	.	.	290	45.96	335	55.56
<b>TOTAAL</b>	<b>465</b>	<b>100.00</b>	<b>166</b>	<b>100.00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>631</b>	<b>100.00</b>	<b>603</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	48	10.32	16	9.58	.	.	64	10.13	48	7.96
februari	29	6.24	19	11.38	.	.	48	7.59	46	7.63
maart	31	6.67	15	8.98	.	.	46	7.28	54	8.96
april	25	5.38	16	9.58	.	.	41	6.49	38	6.30
mei	32	6.88	10	5.99	.	.	42	6.65	40	6.63
juni	34	7.31	11	6.59	.	.	45	7.12	41	6.80
juli	52	11.18	15	8.98	.	.	67	10.60	69	11.44
augustus	33	7.10	12	7.19	.	.	45	7.12	37	6.14
september	50	10.75	12	7.19	.	.	62	9.81	67	11.11
oktober	49	10.54	13	7.78	.	.	62	9.81	78	12.94
november	38	8.17	12	7.19	.	.	50	7.91	51	8.46
december	44	9.46	16	9.58	.	.	60	9.49	34	5.64
<b>TOTAAL</b>	<b>465</b>	<b>100.00</b>	<b>167</b>	<b>100.00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>632</b>	<b>100.00</b>	<b>603</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>								
SOA-onderzoek	245	71.85	219	75.52	464	73.53	429	71.14
HIV-test	96	28.15	70	24.14	166	26.31	174	28.86
beide	.	.	.	.	.	.	.	.
onbekend	.	.	1	0.34	1	0.16	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>	<b>290</b>	<b>100.00</b>	<b>631</b>	<b>100.00</b>	<b>603</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1997	totaal 1996
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	.	.	.	.
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	167	.	.	167	171
SOA positief, geen HIV test	132	.	.	1	133	155
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, geen HIV test	332	.	.	.	332	275
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	.	.	.	.	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>464</b>	<b>167</b>	<b>.</b>	<b>1</b>	<b>632</b>	<b>603</b>

Tabel 7.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	1	0.29	4	1.38	5	0.79	4	0.66
15-19	16	4.69	44	15.17	60	9.51	106	17.58
20-24	67	19.65	78	26.90	145	22.98	174	28.86
25-29	80	23.46	69	23.79	149	23.61	123	20.40
30-34	62	18.18	54	18.62	116	18.38	71	11.77
35-39	51	14.96	18	6.21	69	10.94	36	5.97
40-44	20	5.87	7	2.41	27	4.28	38	6.30
45-54	29	8.50	14	4.83	43	6.81	31	5.14
>54	15	4.40	2	0.69	17	2.69	15	2.49
??	.	.	.	.	.	.	5	0.83
<b>TOTAAL</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>	<b>290</b>	<b>100.00</b>	<b>631</b>	<b>100.00</b>	<b>603</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	261	76.54	248	85.52	509	80.67	463	76.78
Turkije	8	2.35	1	0.34	9	1.43	10	1.66
Marokko	10	2.93	.	.	10	1.58	2	0.33
Sur./ Ant./ Aru.	18	5.28	8	2.76	26	4.12	41	6.80
overig	42	12.32	32	11.03	74	11.73	87	14.43
onbekend	2	0.59	1	0.34	3	0.48	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>	<b>290</b>	<b>100.00</b>	<b>631</b>	<b>100.00</b>	<b>603</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	305	89.44	225	83.96
homoseksueel	19	5.57	33	12.31
biseksueel	16	4.69	10	3.73
onbekend	1	0.29	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>	<b>268</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitut(e)	1	0.29	22	7.61	23	3.66	29	4.81
prostituante(e)	32	9.41	.	.	32	5.09	37	6.14
geen van beide	306	90.00	267	92.39	573	91.10	536	88.89
onbekend	1	0.29	.	.	1	0.16	1	0.17
<b>TOTAAL</b>	<b>340</b>	<b>100.00</b>	<b>289</b>	<b>100.00</b>	<b>629</b>	<b>100.00</b>	<b>603</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	87	25.51	50	17.24	137	21.71	114	18.91
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	11	1.82
nee	252	73.90	235	81.03	487	77.18	476	78.94
onbekend	2	0.59	5	1.72	7	1.11	2	0.33
<b>TOTAAL</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>	<b>290</b>	<b>100.00</b>	<b>631</b>	<b>100.00</b>	<b>603</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>								
Gonorroë (excl.PVG)	3	0.9	2	0.7	5	0.8	8	1.3
Gonorroë: PVG	2	0.6	.	.	2	0.3	1	0.2
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primair	2	0.6	3	1.0	5	0.8	1	0.2
" : secundair	1	0.3	.	.	1	0.2	.	.
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	29	8.5	21	7.1	50	7.9	75	12.2
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	2	0.7	2	0.3	2	0.3
" : primo: HSV type 2	1	0.3	1	0.3	2	0.3	2	0.3
" : recidief	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	8	2.34	3	1.0	11	1.7	6	1.0
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	13	3.8	.	.	13	2.0	14	2.3
Bacteriele Vaginose	.	.	18	6.1	18	2.8	17	2.8
Trichomoniasis	.	.	5	1.7	5	0.8	7	1.1
Candidiasis	9	2.6	15	5.1	24	3.8	25	4.1
Schaamluis	1	0.3	.	.	1	0.2	.	.
Scabies	.	.	.	.	.	.	.	.
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	4	0.7
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	69	20.1	70	23.7	139	21.8	167	27.2
HIV -	96	28.1	70	23.7	166	26.1	171	27.9
Nihil *	177	51.8	155	52.5	332	52.1	275	44.9
<b>TOTAAL</b>	<b>342</b>	<b>100.0</b>	<b>295</b>	<b>100.0</b>	<b>637</b>	<b>100.0</b>	<b>613</b>	<b>100.0</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 7.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	2	40.0	.	.	.	.	1	20.0	.	.	1	20.0	1	20.0	.	.	.	.	.	5
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	33.3	1	33.3	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	3
Chlamydia	.	.	1	3.5	7	24.1	13	44.8	4	13.8	2	6.9	.	.	2	6.9	.	.	.	.	.	29
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
genitale wratten	.	.	.	.	3	37.5	3	37.5	2	25.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
overig	.	.	.	.	3	13.0	6	26.1	3	13.0	3	13.1	1	4.4	3	13.1	4	17.4	.	.	.	23
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	1	0.4	13	4.8	54	19.8	58	21.3	52	19.1	44	16.1	17	6.2	23	8.4	11	4.3	.	.	.	273
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>	<b>0.3</b>	<b>16</b>	<b>4.7</b>	<b>67</b>	<b>19.6</b>	<b>80</b>	<b>23.4</b>	<b>63</b>	<b>18.4</b>	<b>51</b>	<b>14.9</b>	<b>20</b>	<b>5.9</b>	<b>29</b>	<b>8.5</b>	<b>15</b>	<b>4.4</b>	.	.	.	<b>342</b>

Tabel 7.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Syf.: Pr. & S.	.	.	1	33.3	.	.	.	.	1	33.3	.	.	.	.	1	33.3	.	.	.	.	.	3
Chlamydia	.	.	5	23.8	8	38.1	6	28.6	2	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	1	33.3	2	66.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
genitale wratten	.	.	2	66.7	.	.	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
overig	.	.	7	18.4	10	26.3	7	18.4	7	18.4	3	7.9	2	5.3	2	5.3	.	.	.	.	.	38
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	4	1.8	31	13.8	60	26.7	55	24.4	41	18.2	16	7.1	5	2.2	11	4.9	2	0.9	.	.	.	225
<b>TOTAAL</b>	<b>4</b>	<b>1.4</b>	<b>46</b>	<b>15.6</b>	<b>78</b>	<b>26.4</b>	<b>70</b>	<b>23.7</b>	<b>55</b>	<b>18.6</b>	<b>19</b>	<b>6.4</b>	<b>7</b>	<b>2.4</b>	<b>14</b>	<b>4.8</b>	<b>2</b>	<b>0.7</b>	.	.	.	<b>295</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 7.14:

## Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	4	57.1	.	.	.	.	.	.	3	42.9	.	.	7
Syfilis: Prim. & Sec.	4	66.7	.	.	.	.	2	33.3	.	.	.	.	6
Chlamydia infectie	39	78.0	2	4.0	1	2.0	2	4.0	6	12.0	.	.	50
Herpes genitalis	3	75.0	.	.	.	.	1	25.0	.	.	.	.	4
Genitale wratten	8	72.7	1	9.09	2	18.2	.	.	.	.	.	.	11
Overig	48	78.7	1	1.6	.	.	5	8.2	6	9.8	1	1.6	61
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	409	82.0	6	1.2	7	1.4	16	3.2	59	11.8	2	0.4	499
<b>TOTAAL</b>	515	80.7	10	1.6	10	1.6	26	4.1	74	11.6	3	0.5	638

Tabel 7.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	3	60.0	5	40.0	.	.	.	.	5
Syfilis: Prim. & Sec.	3	100.0	.	.	.	.	.	.	3
Chlamydia infectie	27	93.1	1	3.5	.	.	1	3.5	29
Herpes genitalis	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Genitale wratten	8	100.0	.	.	.	.	.	.	8
Overig	16	69.6	4	17.4	3	13.0	.	.	23
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	247	90.5	13	4.8	13	4.8	.	.	273
<b>TOTAAL</b>	305	89.2	20	5.9	16	4.7	1	0.3	342

Tabel 7.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	.	.	5	100.0	.	.	5
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	1	33.3	2	66.7	.	.	3
Chlamydia infectie	.	.	2	6.9	27	93.1	.	.	29
Herpes genitalis	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Genitale wratten	.	.	.	.	8	100.0	.	.	8
Overig	.	.	.	.	23	100.0	.	.	23
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	1	0.4	29	10.7	241	88.7	1	0.4	272
<b>TOTAAL</b>	1	0.3	32	9.38	307	90.0	1	0.3	341

Tabel 7.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	2	100.0	.	.	.	.	.	.	2
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	3	100.0	.	.	3
Chlamydia infectie	.	.	.	.	21	100.0	.	.	21
Herpes genitalis	.	.	.	.	3	100.0	.	.	3
Genitale wratten	.	.	.	.	3	100.0	.	.	3
Overig	5	13.2	.	.	33	86.8	.	.	38
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	15	6.7	.	.	209	93.3	.	.	224
<b>TOTAAL</b>	22	7.5	.	.	272	92.5	.	.	294

Tabel 7.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		ja, ooit twee keer SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	2	28.6	.	.	5	71.4	.	.	7
Syfilis: Prim. & Sec.	2	33.3	.	.	2	33.3	2	33.3	6
Chlamydia infectie	14	28.0	.	.	36	72.0	.	.	50
Herpes genitalis	.	.	.	.	4	100.0	.	.	4
Genitale wratten	2	18.2	.	.	9	81.8	.	.	11
Overig	10	16.39	.	.	50	82.0	1	1.6	61
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	108	21.6	.	.	387	77.6	4	0.8	499
<b>TOTAAL</b>	138	21.6	.	.	493	77.3	7	1.1	638



**8: GGD Groningen Stad en Ommelanden**

Tabel 8.2:

Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	252	49.70	1	100.00	46	42.99	299	48.62	253	49.03
vrouw	255	50.30	.	.	61	57.01	316	51.38	263	50.97
<b>TOTAAL</b>	<b>507</b>	<b>100.00</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>107</b>	<b>100.00</b>	<b>615</b>	<b>100.00</b>	<b>516</b>	<b>100.00</b>

1 missing

Tabel 8.3:

Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>MAAND</b>										
januari	45	8.86	.	.	7	6.54	52	8.44	47	9.11
februari	36	7.09	.	.	6	5.61	42	6.82	50	9.69
maart	51	10.04	.	.	4	3.74	55	8.93	43	8.33
april	36	7.09	.	.	11	10.28	47	7.63	36	6.98
mei	21	4.13	.	.	5	4.67	26	4.22	27	5.23
juni	39	7.68	.	.	13	12.15	52	8.44	34	6.59
juli	46	9.06	.	.	12	11.21	58	9.42	36	6.98
augustus	46	9.06	.	.	9	8.41	55	8.93	56	10.85
september	65	12.80	.	.	11	10.28	76	12.34	39	7.56
oktober	52	10.24	1	100.00	9	8.41	62	10.06	51	9.88
november	44	8.66	.	.	9	8.41	53	8.60	53	10.27
december	26	5.12	.	.	11	10.28	37	6.01	44	8.53
onbekend	1	0.20	.	.	.	.	1	0.16	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>508</b>	<b>100.00</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>107</b>	<b>100.00</b>	<b>616</b>	<b>100.00</b>	<b>516</b>	<b>100.00</b>

Tabel 8.4a:

Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>								
SOA-onderzoek	237	79.26	239	75.63	476	77.40	427	82.75
HIV-test	3	1.00	.	.	3	0.49	4	0.78
beide	55	18.39	74	23.42	129	20.98	85	16.47
onbekend	4	1.34	3	0.95	7	1.14	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>299</b>	<b>100.00</b>	<b>316</b>	<b>100.00</b>	<b>615</b>	<b>100.00</b>	<b>516</b>	<b>100.00</b>

Tabel 8.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1997	totaal 1996
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	.	.	.	.
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	1	.	.	1	2
SOA positief, geen HIV test	188	.	10	2	200	191
SOA positief, HIV positief	1	.	.	.	1	.
SOA positief, HIV negatief	.	.	10	.	10	10
SOA negatief, geen HIV test	284	1	18	5	308	250
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	4	1	91	.	96	63
<b>TOTAAL</b>	<b>477</b>	<b>3</b>	<b>129</b>	<b>7</b>	<b>616</b>	<b>516</b>

Tabel 8.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	.	.	1	0.32	1	0.16	2	0.39
15-19	9	3.01	43	13.61	52	8.46	69	13.37
20-24	55	18.39	118	37.34	173	28.13	129	25.00
25-29	54	18.06	69	21.84	123	20.00	103	19.96
30-34	57	19.06	30	9.49	87	14.15	61	11.82
35-39	32	10.70	21	6.65	53	8.62	52	10.08
40-44	33	11.04	10	3.16	43	6.99	39	7.56
45-54	43	14.38	15	4.75	58	9.43	39	7.56
>54	15	5.02	4	1.27	19	3.09	14	2.71
??	1	0.33	5	1.58	6	0.98	8	1.55
<b>TOTAAL</b>	<b>299</b>	<b>100.00</b>	<b>316</b>	<b>100.00</b>	<b>615</b>	<b>100.00</b>	<b>516</b>	<b>100.00</b>

Tabel 8.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	229	76.59	268	84.81	497	80.81	436	84.50
Turkije	5	1.67	1	0.32	6	0.98	2	0.39
Marokko	2	0.67	1	0.32	3	0.49	3	0.58
Sur./ Ant./ Aru.	15	5.02	10	3.16	25	4.07	19	3.68
overig	42	14.05	31	9.81	73	11.87	51	9.88
onbekend	6	2.01	5	1.58	11	1.79	5	0.97
<b>TOTAAL</b>	<b>299</b>	<b>100.00</b>	<b>316</b>	<b>100.00</b>	<b>615</b>	<b>100.00</b>	<b>516</b>	<b>100.00</b>

Tabel 8.7:

Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	244	81.61	201	79.45
homoseksueel	33	11.04	34	13.44
biseksueel	9	3.01	5	1.98
onbekend	13	4.35	13	5.14
<b>TOTAAL</b>	<b>299</b>	<b>100.00</b>	<b>253</b>	<b>100.00</b>

1 missing

Tabel 8.8:

Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitutie(e)	2	0.69	53	16.93	55	9.11	63	12.21
prostituant(e)	36	12.37	1	0.32	37	6.13	33	6.40
geen van beide	225	77.32	244	77.96	469	77.64	398	77.13
onbekend	28	9.62	15	4.79	43	7.12	22	4.26
<b>TOTAAL</b>	<b>291</b>	<b>100.00</b>	<b>313</b>	<b>100.00</b>	<b>604</b>	<b>100.00</b>	<b>516</b>	<b>100.00</b>

Tabel 8.10:

Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	85	28.43	78	24.68	163	26.50	99	19.19
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	19	3.68
nee	160	53.51	190	60.13	350	56.91	344	66.67
onbekend	54	18.06	48	15.19	102	16.59	54	10.47
<b>TOTAAL</b>	<b>299</b>	<b>100.00</b>	<b>316</b>	<b>100.00</b>	<b>615</b>	<b>100.00</b>	<b>516</b>	<b>100.00</b>

Tabel 8.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

DIAGNOSE	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Gonorroë (excl.PVG)	13	4.2	8	2.4	21	3.3	20	3.7
Gonorroë: PVG	1	0.3	.	.	1	0.2	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	5	1.6	.	.	5	0.8	.	.
" : primair	2	0.7	1	0.3	3	0.5	1	0.2
" : secundair	1	0.3	1	0.3	2	0.3	1	0.2
" : latens recens	2	0.7	.	.	2	0.3	6	1.1
" : latens tarda	3	1.0	1	0.3	4	0.6	6	1.1
Chlamydia infectie	37	11.9	54	16.0	91	14.0	57	10.5
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	2	0.7	1	0.3	3	0.5	3	0.6
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	1	0.3	1	0.3	2	0.3	2	0.4
" : primo: HSV type 2	5	1.6	.	.	5	0.8	2	0.4
" : recidief	1	0.3	2	0.6	3	0.5	.	.
Genitale wratten	16	5.2	18	5.3	34	5.3	37	6.8
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	8	2.6	.	.	8	1.2	16	3.0
Bacteriele Vaginose	.	.	16	4.7	16	2.5	22	4.1
Trichomoniasis	.	.	3	0.9	3	0.5	2	0.4
Candidiasis	7	2.3	13	3.9	20	3.1	23	4.3
Schaamluis	1	0.3	.	.	1	0.2	1	0.2
Scabies	1	0.3	3	0.9	4	0.6	12	2.2
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	1	0.3	1	0.3	2	0.3	4	0.7
PID	.	.	2	0.6	2	0.3	1	0.2
HIV +	1	0.3	.	.	1	0.2	.	.
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	108	34.8	125	37.0	233	36.0	216	39.9
HIV -	46	14.8	61	18.1	107	16.5	75	13.9
Nihil *	156	50.3	152	45.0	308	47.5	250	46.2
<b>TOTAAL</b>	<b>310</b>	<b>100.0</b>	<b>338</b>	<b>100.0</b>	<b>648</b>	<b>100.0</b>	<b>541</b>	<b>100.0</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 8.13a:

Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	.	.	2	14.3	3	21.4	3	21.4	2	14.3	2	14.3	2	14.3	.	.	.	.	.	14
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	1	33.3	1	33.3	.	.	.	.	1	33.3	.	.	.	.	.	3
Chlamydia	.	.	1	2.7	10	27.0	7	18.9	6	16.2	4	10.8	3	8.1	6	16.2	.	.	.	.	.	37
herpes genitalis	.	.	.	.	1	11.1	1	11.1	1	11.1	.	.	4	44.4	2	22.2	.	.	.	.	.	9
genitale wratten	.	.	.	.	2	12.5	3	18.8	5	31.3	.	.	1	6.3	5	31.3	.	.	.	.	.	16
overig	.	.	.	.	2	7.1	2	7.1	10	35.7	4	14.3	3	10.7	3	10.7	3	10.7	1	3.6	.	28
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	.	.	8	4.0	39	19.5	38	19.2	35	17.5	22	11.0	20	10.0	25	12.5	13	6.5	.	.	.	200
<b>TOTAAL</b>	.	.	9	2.9	56	18.2	55	17.9	61	19.8	33	10.7	33	10.7	44	14.3	16	5.2	1	0.3	.	308

Tabel 8.13b:

Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	1	12.5	.	.	5	62.5	2	25.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	2	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Chlamydia	1	1.9	8	14.8	13	24.1	16	29.6	6	11.1	2	3.7	.	.	3	5.6	1	1.9	4	7.4	.	54
herpes genitalis	.	.	.	.	1	25.0	.	.	1	25.0	.	.	1	25.0	.	.	1	25.0	.	.	.	4
genitale wratten	.	.	4	22.2	5	27.8	2	11.1	2	11.1	1	5.6	2	11.1	2	11.1	.	.	.	.	.	18
overig	.	.	6	15.4	13	33.3	7	18.0	4	10.3	2	5.1	4	10.3	1	2.6	.	.	2	5.1	.	39
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	.	.	26	12.7	88	42.9	42	20.5	18	8.8	16	7.8	4	2.0	9	4.4	2	1.0	.	.	.	205
<b>TOTAAL</b>	1	0.3	45	13.6	122	37.0	72	21.8	33	10.0	21	6.4	11	3.3	15	4.6	4	1.2	6	1.8	.	330

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 8.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	15	68.2	.	.	1	4.6	2	9.1	3	13.6	1	4.6	22
Syfilis: Prim. & Sec.	1	20.0	.	.	.	.	.	.	3	60.0	1	20.0	5
Chlamydia infectie	70	76.1	1	1.1	1	1.1	5	5.4	10	10.9	5	5.4	92
Herpes genitalis	10	76.9	.	.	.	.	3	23.1	.	.	.	.	13
Genitale wratten	30	88.2	.	.	1	2.9	1	2.9	2	5.9	.	.	34
Overig	47	70.2	2	3.0	.	.	4	6.0	14	20.9	.	.	67
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	338	83.5	3	0.7	1	0.3	13	3.2	46	11.4	4	1.0	405
<b>TOTAAL</b>	511	80.0	6	0.9	4	0.6	28	4.4	79	12.4	11	1.7	639

Tabel 8.15:

Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	9	64.3	4	28.6	.	.	1	7.1	14
Syfilis: Prim. & Sec.	3	100.0	.	.	.	.	.	.	3
Chlamydia infectie	30	81.1	2	5.4	1	2.7	4	10.8	37
Herpes genitalis	8	88.9	1	11.1	.	.	.	.	9
Genitale wratten	11	68.8	2	12.5	1	6.3	2	12.5	16
Overig	21	75.0	3	10.7	2	7.1	2	7.1	28
HIV+	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Nihil	168	84.0	22	11.0	5	2.5	5	2.5	200
<b>TOTAAL</b>	251	81.5	34	11.0	9	2.9	14	4.6	308

Tabel 8.16a:

Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituuant		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	3	23.1	8	61.5	2	15.4	13
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	1	33.3	1	33.3	1	33.3	3
Chlamydia infectie	.	.	1	2.9	26	74.3	8	22.9	35
Herpes genitalis	.	.	2	25.0	6	75.0	.	.	8
Genitale wratten	.	.	1	6.7	13	86.7	1	6.7	15
Overig	.	.	3	11.1	17	63.0	7	25.9	27
HIV+	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
Nihil	2	1.0	26	13.1	159	80.3	11	5.6	198
<b>TOTAAL</b>	2	0.7	38	12.7	230	76.7	30	10.0	300

Tabel 8.16b:

Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	5	62.5	.	.	.	.	3	37.5	8
Syfilis: Prim. & Sec.	1	50.0	.	.	1	50.0	.	.	2
Chlamydia infectie	8	14.8	.	.	35	64.8	11	20.4	54
Herpes genitalis	.	.	.	.	4	100.0	.	.	4
Genitale wratten	2	11.1	.	.	16	88.9	.	.	18
Overig	4	10.3	.	.	33	84.6	2	5.0	39
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	37	18.3	1	0.5	163	80.7	1	0.5	202
<b>TOTAAL</b>	57	17.4	1	0.3	252	77.1	16	4.9	327

Tabel 8.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		ja, ooit twee keer SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	12	54.55	.	.	1	4.55	9	40.91	22
Syfilis: Prim. & Sec.	2	40.00	.	.	1	20.00	2	40.00	5
Chlamydia infectie	21	22.83	.	.	39	42.39	32	34.78	92
Herpes genitalis	5	38.46	.	.	6	46.15	2	15.38	13
Genitale wratten	9	26.47	.	.	20	58.82	5	14.71	34
Overig	24	35.82	.	.	33	49.25	10	14.93	67
HIV+	.	.	.	.	1	100.00	.	.	1
Nihil	98	24.20	.	.	258	63.70	49	12.10	405
<b>TOTAAL</b>	<b>171</b>	<b>26.76</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>359</b>	<b>56.18</b>	<b>109</b>	<b>17.06</b>	<b>639</b>



**9: GGD Noord Kennemerland**

Tabel 9.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	56	24.14	68	59.65	12	16.00	136	32.30	143	28.66
vrouw	176	75.86	46	40.35	63	84.00	285	67.70	356	71.34
<b>TOTAAL</b>	<b>232</b>	<b>100.00</b>	<b>114</b>	<b>100.00</b>	<b>75</b>	<b>100.00</b>	<b>421</b>	<b>100.00</b>	<b>499</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	11	4.74	22	19.30	6	8.00	39	9.26	45	9.02
februari	7	3.02	9	7.89	.	.	16	3.80	34	6.81
maart	.	.	.	.	.	.	.	.	37	7.41
april	23	9.91	10	8.77	5	6.67	38	9.03	37	7.41
mei	23	9.91	10	8.77	2	2.67	35	8.31	44	8.82
juni	23	9.91	12	10.53	11	14.67	46	10.93	39	7.82
juli	17	7.33	13	11.40	3	4.00	33	7.84	44	8.82
augustus	30	12.93	12	10.53	9	12.00	51	12.11	33	6.61
september	32	13.79	6	5.26	17	22.67	55	13.06	42	8.42
oktober	24	10.34	12	10.53	9	12.00	45	10.69	51	10.22
november	24	10.34	3	2.63	10	13.33	37	8.79	52	10.42
december	18	7.76	5	4.39	3	4.00	26	6.18	40	8.02
onbekend	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.20
<b>TOTAAL</b>	<b>232</b>	<b>100.00</b>	<b>114</b>	<b>100.00</b>	<b>75</b>	<b>100.00</b>	<b>421</b>	<b>100.00</b>	<b>499</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>								
SOA-onderzoek	55	40.44	169	59.30	224	53.21	227	45.49
HIV-test	67	49.26	46	16.14	113	26.84	146	29.26
beide	13	9.56	65	22.81	78	18.53	126	25.25
onbekend	1	0.74	5	1.75	6	1.43	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>136</b>	<b>100.00</b>	<b>285</b>	<b>100.00</b>	<b>421</b>	<b>100.00</b>	<b>499</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1997	totaal 1996
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	1	.	.	1	1
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	112	1	.	113	142
SOA positief, geen HIV test	75	.	2	.	77	75
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	.	21	.	21	32
SOA negatief, geen HIV test	148	.	3	4	155	157
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	1	.	51	2	54	92
<b>TOTAAL</b>	<b>224</b>	<b>113</b>	<b>78</b>	<b>6</b>	<b>421</b>	<b>499</b>

Tabel 9.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	.	.	3	1.05	3	0.71	2	0.40
15-19	4	2.94	40	14.04	44	10.45	66	13.23
20-24	23	16.91	80	28.07	103	24.47	143	28.66
25-29	30	22.06	79	27.72	109	25.89	106	21.24
30-34	27	19.85	30	10.53	57	13.54	52	10.42
35-39	21	15.44	25	8.77	46	10.93	59	11.82
40-44	11	8.09	9	3.16	20	4.75	22	4.41
45-54	15	11.03	18	6.32	33	7.84	40	8.02
>54	5	3.68	1	0.35	6	1.43	8	1.60
??	.	.	.	.	.	.	1	0.20
<b>TOTAAL</b>	<b>136</b>	<b>100.00</b>	<b>285</b>	<b>100.00</b>	<b>421</b>	<b>100.00</b>	<b>499</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	128	94.12	161	56.49	289	68.65	326	65.33
Turkije	1	0.74	.	.	1	0.24	1	0.20
Marokko	1	0.74	1	0.35	2	0.48	1	0.20
Sur./ Ant./ Aru.	.	.	.	.	.	.	.	.
overig	4	2.94	112	39.30	116	27.55	158	31.66
onbekend	2	1.47	11	3.86	13	3.09	13	2.61
<b>TOTAAL</b>	<b>136</b>	<b>100.00</b>	<b>285</b>	<b>100.00</b>	<b>421</b>	<b>100.00</b>	<b>499</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	120	88.24	110	76.92
homoseksueel	10	7.35	12	8.39
biseksueel	1	0.74	3	2.10
onbekend	5	3.68	18	12.59
<b>TOTAAL</b>	<b>136</b>	<b>100.00</b>	<b>143</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitut(e)	.	.	143	51.44	143	34.54	189	37.88
prostituant(e)	25	18.38	2	0.72	27	6.52	12	2.40
geen van beide	106	77.95	128	46.04	234	56.52	187	37.47
onbekend	5	3.68	5	1.80	10	2.41	111	22.24
<b>TOTAAL</b>	<b>136</b>	<b>100.00</b>	<b>278</b>	<b>100.00</b>	<b>414</b>	<b>100.00</b>	<b>499</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	16	11.76	20	7.02	36	8.55	40	8.02
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	2	0.40
nee	75	55.15	100	35.09	175	41.57	195	39.08
onbekend	45	33.09	165	57.89	210	49.88	262	52.51
<b>TOTAAL</b>	<b>136</b>	<b>100.00</b>	<b>285</b>	<b>100.00</b>	<b>421</b>	<b>100.00</b>	<b>499</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>								
Gonorroë (excl.PVG)	3	2.2	4	1.3	7	1.6	.	.
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	5	3.7	17	5.5	22	4.9	18	3.4
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	1	0.3	1	0.2	.	.
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : recidief	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	3	2.2	5	1.6	8	1.8	6	1.1
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	1	0.3	1	0.2	.	.
Niet Specifieke Urethritis	1	0.7	.	.	1	0.2	1	0.2
Bacteriele Vaginose	.	.	3	1.0	3	0.7	4	0.7
Trichomoniasis	.	.	.	.	.	.	1	0.2
Candidiasis	2	1.5	55	17.7	57	12.8	75	14.0
Schaamluis	2	1.5	.	.	2	0.5	1	0.2
Scabies	.	.	.	.	.	.	1	0.2
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	.	.	1	0.3	1	0.2	3	0.6
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	1	0.7	.	.	1	0.2	1	0.2
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	17	12.3	89	28.4	106	23.5	111	20.8
HIV -	79	57.7	109	35.2	188	42.1	266	49.8
Nihil *	41	29.9	114	36.8	155	34.7	157	29.4
<b>TOTAAL</b>	137	100	310	100	447	100	534	100

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 9.13a:  
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorroë	.	.	.	.	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	.	2	66.7	.	.	.	.	.	3
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	1	20.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0	.	.	.	.	.	.	1	20.0	.	.	.	5
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
genitale wratten	.	.	.	.	1	33.3	.	.	.	.	.	.	1	33.3	1	33.3	.	.	.	.	.	3
overig	.	.	.	.	1	20.0	.	.	1	20.0	2	40.0	.	.	1	20.0	.	.	.	.	.	5
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	.	.	3	2.5	20	16.7	29	24.2	24	20.0	19	15.8	10	8.3	11	9.2	4	3.3	.	.	.	120
<b>TOTAAL</b>	.	.	4	2.9	24	17.5	30	21.9	27	19.7	21	15.3	11	8.0	15	11.0	5	3.7	.	.	.	137

Tabel 9.13b:  
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorroë	.	.	1	25.0	2	50.0	.	.	.	.	1	25.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	4	22.2	11	61.1	1	5.6	.	.	.	.	.	.	2	11.1	.	.	.	.	.	18
herpes genitalis	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
genitale wratten	.	.	1	20.0	3	60.0	1	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
overig	1	1.6	10	16.4	16	26.2	22	36.1	8	13.1	3	4.9	.	.	1	1.6	.	.	.	.	61	
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	2	1.0	25	12.3	53	26.0	56	27.5	22	10.8	21	10.3	9	4.4	15	7.4	1	0.5	.	.	204	
<b>TOTAAL</b>	3	1.0	41	14.0	86	29.4	80	27.3	30	10.2	25	8.5	9	3.1	18	6.1	1	0.3	.	.	.	293

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 9.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	4	57.1	.	.	.	.	.	.	3	42.9	.	.	7
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	17	73.9	.	.	1	4.4	.	.	5	21.7	.	.	23
Herpes genitalis	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Genitale wratten	5	62.5	.	.	.	.	.	.	3	37.5	.	.	8
Overig	29	43.9	.	.	.	.	.	.	35	53.0	2	3.0	66
HIV+	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil	237	73.2	1	0.3	1	0.3	.	.	74	22.8	11	3.4	324
<b>TOTAAL</b>	294	68.4	1	0.2	2	0.5	.	.	120	27.9	13	3.0	430

Tabel 9.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	3	100.0	.	.	.	.	.	.	3
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	4	80.0	1	20.0	.	.	.	.	5
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	2	66.7	1	33.3	.	.	.	.	3
Overig	5	100.0	.	.	.	.	.	.	5
HIV+	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
Nihil	107	89.2	7	5.8	1	0.8	5	4.2	120
<b>TOTAAL</b>	<b>121</b>	<b>88.3</b>	<b>10</b>	<b>7.3</b>	<b>1</b>	<b>0.7</b>	<b>5</b>	<b>3.7</b>	<b>137</b>

Tabel 9.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	2	66.7	1	33.3	.	.	3
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	.	.	4	80.0	1	20.0	5
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	.	.	.	.	3	100.0	.	.	3
Overig	.	.	4	80.0	1	20.0	.	.	5
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	.	.	19	15.8	97	80.8	4	3.3	120
<b>TOTAAL</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>25</b>	<b>18.3</b>	<b>107</b>	<b>78.1</b>	<b>5</b>	<b>3.7</b>	<b>137</b>

Tabel 9.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitutée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	3	100.0	.	.	.	.	.	.	3
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	5	33.3	.	.	10	66.7	.	.	15
Herpes genitalis	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Genitale wratten	2	40.0	.	.	3	60.0	.	.	5
Overig	38	62.3	1	1.6	21	34.4	1	1.6	61
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	99	49.5	1	0.5	96	48.0	4	2.0	200
<b>TOTAAL</b>	<b>147</b>	<b>51.6</b>	<b>2</b>	<b>0.7</b>	<b>131</b>	<b>46.0</b>	<b>5</b>	<b>1.8</b>	<b>285</b>

Tabel 9.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		ja, ooit twee keer SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	2	28.6	.	.	3	42.9	2	28.6	7
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	5	22.7	.	.	8	36.4	9	40.9	22
Herpes genitalis	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Genitale wratten	2	25.0	.	.	3	37.5	3	37.5	8
Overig	1	1.5	.	.	25	38.5	39	60.0	65
HIV+	.	.	.	.	.	.	1	100.0	1
Nihil	26	8.1	.	.	137	42.6	159	49.4	322
<b>TOTAAL</b>	36	8.5	.	.	177	41.6	213	50.0	426



## **10: GGD Leiden e.o.**

Tabel 10.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	55	57.29	164	52.90	.	.	219	53.94	230	51.80
vrouw	41	42.71	146	47.10	.	.	187	46.06	214	48.20
<b>TOTAAL</b>	<b>96</b>	<b>100.00</b>	<b>310</b>	<b>100.00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>406</b>	<b>100.00</b>	<b>444</b>	<b>100.00</b>

1 missing

Tabel 10.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	3	3.13	33	10.61	36	8.85	61	13.74
februari	6	6.25	23	7.40	29	7.13	48	10.81
maart	17	17.71	29	9.32	46	11.30	42	9.46
april	13	13.54	24	7.72	37	9.09	22	4.95
mei	7	7.29	30	9.65	37	9.09	37	8.33
juni	3	3.13	22	7.07	25	6.14	37	8.33
juli	14	14.58	39	12.54	53	13.02	34	7.66
augustus	6	6.25	21	6.75	27	6.63	27	6.08
september	8	8.33	14	4.50	22	5.41	32	7.21
oktober	4	4.17	30	9.65	34	8.35	38	8.56
november	7	7.29	23	7.40	30	7.37	38	8.56
december	8	8.33	23	7.40	31	7.62	28	6.31
<b>TOTAAL</b>	<b>96</b>	<b>100.00</b>	<b>311</b>	<b>100.00</b>	<b>407</b>	<b>100.00</b>	<b>444</b>	<b>100.00</b>

Tabel 10.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

BEZOEK I.V.M.	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA-onderzoek	53	24.20	40	21.39	93	22.91	79	17.79
HIV-test	155	70.78	142	75.94	297	73.15	362	81.53
beide	3	1.37	2	1.07	5	1.23	3	0.68
onbekend	8	3.65	3	1.60	11	2.71	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>219</b>	<b>100.00</b>	<b>187</b>	<b>100.00</b>	<b>406</b>	<b>100.00</b>	<b>444</b>	<b>100.00</b>

Tabel 10.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1997	totaal 1996
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	2	.	.	2	1
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	295	2	12	309	364
SOA positief, geen HIV test	19	.	2	.	21	23
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, geen HIV test	74	.	1	.	75	56
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	.	.	.	.	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>93</b>	<b>297</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>407</b>	<b>444</b>

Tabel 10.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	1	0.46	1	0.53	2	0.49	1	0.23
15-19	3	1.37	9	4.81	12	2.96	35	7.88
20-24	66	30.14	71	37.97	137	33.74	159	35.81
25-29	57	26.03	52	27.81	109	26.85	116	26.13
30-34	30	13.70	19	10.16	49	12.07	63	14.19
35-39	22	10.05	11	5.88	33	8.13	35	7.88
40-44	13	5.94	11	5.88	24	5.91	9	2.03
45-54	22	10.05	8	4.28	30	7.39	20	4.50
>54	4	1.83	4	2.14	8	1.97	6	1.35
??	1	0.46	1	0.53	2	0.49	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>219</b>	<b>100.00</b>	<b>187</b>	<b>100.00</b>	<b>406</b>	<b>100.00</b>	<b>444</b>	<b>100.00</b>

Tabel 10.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	174	79.45	156	83.42	330	81.28	383	86.26
Turkije	2	0.91	.	.	2	0.49	.	.
Marokko	5	2.28	.	.	5	1.23	3	0.68
Sur./ Ant./ Aru.	7	3.20	5	2.67	12	2.96	15	3.38
overig	31	14.16	26	13.90	57	14.04	40	9.01
onbekend	.	.	.	.	.	.	3	0.68
<b>TOTAAL</b>	<b>219</b>	<b>100.00</b>	<b>187</b>	<b>100.00</b>	<b>406</b>	<b>100.00</b>	<b>444</b>	<b>100.00</b>

Tabel 10.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	192	87.67	189	82.17
homoseksueel	17	7.76	24	10.43
biseksueel	9	4.11	8	3.48
onbekend	1	0.46	9	3.91
<b>TOTAAL</b>	<b>219</b>	<b>100.00</b>	<b>230</b>	<b>100.00</b>

Tabel 10.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitutie(e)	.	.	4	2.19	4	1.00	14	3.15
prostituant(e)	16	7.34	1	0.55	17	4.24	7	1.58
geen van beide	197	90.37	173	94.54	370	92.27	383	86.26
onbekend	5	2.29	5	2.73	10	2.49	40	9.01
<b>TOTAAL</b>	<b>218</b>	<b>100.00</b>	<b>183</b>	<b>100.00</b>	<b>401</b>	<b>100.00</b>	<b>444</b>	<b>100.00</b>

Tabel 10.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	42	19.18	46	24.60	88	21.67	69	15.54
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	5	1.13
nee	172	78.54	139	74.33	311	76.60	340	76.58
onbekend	5	2.28	2	1.07	7	1.72	30	6.76
<b>TOTAAL</b>	<b>219</b>	<b>100.00</b>	<b>187</b>	<b>100.00</b>	<b>406</b>	<b>100.00</b>	<b>444</b>	<b>100.00</b>

Tabel 10.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>								
Gonorrhoe (excl.PVG)	.	.	.	.	.	.	.	.
Gonorrhoe: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens recens	1	0.45	.	.	1	0.2	.	.
" : latens tarda	1	0.45	.	.	1	0.2	.	.
Chlamydia infectie	4	1.8	2	1.1	6	1.5	17	3.8
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	1	0.2
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : recidief	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	.	.	.	.	.	.	1	0.2
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	.	.	.	.	.	.	.	.
Bacteriele Vaginose	2	0.9	7	3.7	9	2.2	6	1.3
Trichomoniasis	.	.	.	.	.	.	1	0.2
Candidiasis	.	.	7	3.7	7	1.71	3	0.7
Schaamluis	.	.	.	.	.	.	.	.
Scabies	.	.	.	.	.	.	.	.
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	1	0.5	1	0.5	2	0.5	1	0.2
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	9	4.1	17	9.0	26	6.4	30	6.7
HIV -	163	74.1	145	76.7	308	75.3	364	80.9
Nihil *	48	21.8	27	14.3	75	18.3	56	12.4
<b>TOTAAL</b>	<b>220</b>	<b>100.0</b>	<b>189</b>	<b>100.0</b>	<b>409</b>	<b>100.0</b>	<b>450</b>	<b>100.0</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 10.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	.	.	2	50.0	1	25.0	.	.	.	.	.	.	1	25.0	.	.	.	.	.	4
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
genitale wratten	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
overig	.	.	.	.	.	.	2	50.0	.	.	.	.	2	50.0	.	.	.	.	.	.	.	4
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	1	0.5	3	1.4	64	30.3	54	25.6	30	14.2	22	10.4	11	5.2	21	10.0	4	1.9	1	0.5	211	
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>	<b>0.5</b>	<b>3</b>	<b>1.4</b>	<b>66</b>	<b>30.0</b>	<b>57</b>	<b>25.9</b>	<b>30</b>	<b>13.6</b>	<b>22</b>	<b>10.0</b>	<b>14</b>	<b>6.4</b>	<b>22</b>	<b>10.0</b>	<b>4</b>	<b>1.8</b>	<b>1</b>	<b>0.5</b>	<b>220</b>	

Tabel 10.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
genitale wratten	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
overig	.	.	1	7.1	1	7.1	7	50.0	2	10.5	.	.	1	7.1	1	7.1	1	7.1	.	.	.	14
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	1	0.6	8	4.7	69	40.1	46	26.7	17	9.8	11	6.4	9	5.2	7	4.1	3	1.7	1	0.6	172	
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>	<b>0.5</b>	<b>10</b>	<b>5.3</b>	<b>71</b>	<b>37.6</b>	<b>53</b>	<b>28.0</b>	<b>19</b>	<b>10.1</b>	<b>11</b>	<b>5.8</b>	<b>11</b>	<b>5.8</b>	<b>8</b>	<b>4.2</b>	<b>4</b>	<b>2.1</b>	<b>1</b>	<b>0.5</b>	<b>189</b>	

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 10.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	6	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig	16	88.9	.	.	.	.	.	.	2	11.1	.	.	2
HIV+	1	50.0	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	2
Nihil	311	81.0	2	0.5	5	1.3	11	2.9	55	14.3	.	.	384
<b>TOTAAL</b>	334	81.5	2	0.5	5	1.2	12	2.9	57	13.9	.	.	410

Tabel 10.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	4	100.0	.	.	.	.	.	.	4
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig	2	50.0	2	50.0	.	.	.	.	4
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	186	88.2	16	7.6	8	3.8	1	0.5	211
<b>TOTAAL</b>	<b>192</b>	<b>87.3</b>	<b>18</b>	<b>8.2</b>	<b>9</b>	<b>4.1</b>	<b>1</b>	<b>0.5</b>	<b>220</b>

Tabel 10.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituant		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	.	.	4	100.0	.	.	4
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig	.	.	1	25.0	3	75.0	.	.	4
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	.	.	15	7.1	189	90.0	6	2.9	210
<b>TOTAAL</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>16</b>	<b>7.3</b>	<b>197</b>	<b>90.0</b>	<b>6</b>	<b>2.7</b>	<b>219</b>

Tabel 10.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig	.	.	.	.	13	100.0	.	.	13
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	4	2.37	1	0.6	159	94.1	5	3.0	169
<b>TOTAAL</b>	<b>4</b>	<b>2.2</b>	<b>1</b>	<b>0.5</b>	<b>175</b>	<b>94.6</b>	<b>5</b>	<b>2.7</b>	<b>185</b>

Tabel 10.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		ja, ooit twee keer SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	2	33.3	.	.	4	66.7	.	.	6
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig	4	22.2	.	.	13	72.2	1	5.6	18
HIV+	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Nihil	83	21.6	.	.	295	76.8	6	1.6	384
<b>TOTAAL</b>	89	21.7	.	.	314	76.6	7	1.7	410



## **11: GGD Zuidelijk Zuid Limburg**

Tabel 11.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	144	43.90	44	51.76	16	45.71	204	45.54	181	45.14
vrouw	184	56.10	41	48.24	19	54.29	244	54.46	220	54.86
<b>TOTAAL</b>	<b>328</b>	<b>100.00</b>	<b>85</b>	<b>100.00</b>	<b>35</b>	<b>100.00</b>	<b>448</b>	<b>100.00</b>	<b>401</b>	<b>100.00</b>

Tabel 11.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	19	5.79	11	12.79	2	5.71	32	7.13	32	7.98
februari	24	7.32	13	15.12	2	5.71	39	8.69	44	10.97
maart	21	6.40	9	10.47	3	8.57	33	7.35	34	8.48
april	30	9.15	4	4.65	3	8.57	37	8.24	30	7.48
mei	21	6.31	5	5.68	3	8.57	28	6.24	27	6.73
juni	37	11.28	4	4.65	5	14.29	46	10.24	31	7.73
juli	24	7.32	4	4.65	3	8.57	31	6.90	22	5.49
augustus	35	10.67	6	6.98	.	.	41	9.13	22	5.49
september	39	11.89	5	5.81	3	8.57	47	10.47	53	13.22
oktober	24	7.32	10	11.63	5	14.29	39	8.69	47	11.72
november	26	7.93	6	6.98	4	11.43	36	8.02	29	7.23
december	28	8.54	10	11.63	2	5.71	40	8.91	30	7.48
<b>TOTAAL</b>	<b>328</b>	<b>100.00</b>	<b>86</b>	<b>100.00</b>	<b>35</b>	<b>100.00</b>	<b>449</b>	<b>100.00</b>	<b>401</b>	<b>100.00</b>

Tabel 11.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>								
SOA-onderzoek	127	62.25	177	72.54	304	67.91	258	64.34
HIV-test	44	21.57	42	17.21	86	19.34	126	31.42
beide	22	10.78	21	8.61	43	9.45	17	4.24
onbekend	11	5.39	4	1.64	15	3.30	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>204</b>	<b>100.00</b>	<b>244</b>	<b>100.00</b>	<b>448</b>	<b>100.00</b>	<b>401</b>	<b>100.00</b>

Tabel 11.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1997	totaal 1996
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	.	.	.	1
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	80	2	4	86	124
SOA positief, geen HIV test	56	.	3	3	62	76
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	.	.	.	.	1
SOA negatief, geen HIV test	238	2	18	8	266	184
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	10	5	20	.	35	15
<b>TOTAAL</b>	<b>310</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>457</b>	<b>401</b>

Tabel 11.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	%	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	.	.	2	0.82	2	0.45	2	0.50
15-19	7	3.43	38	15.26	45	10.04	50	12.47
20-24	41	20.10	72	29.51	113	25.22	125	31.17
25-29	41	20.10	56	22.95	97	21.65	81	20.20
30-34	33	16.18	33	13.52	66	14.73	57	14.21
35-39	34	16.67	19	7.79	53	11.83	33	8.23
40-44	19	9.31	8	3.28	27	6.03	20	4.99
45-54	19	9.31	11	4.51	30	6.70	16	3.99
>54	7	3.43	5	2.05	12	2.68	6	1.50
??	3	1.47	.	.	3	0.67	11	2.74
<b>TOTAAL</b>	<b>204</b>	<b>100.00</b>	<b>244</b>	<b>100.00</b>	<b>448</b>	<b>100.00</b>	<b>401</b>	<b>100.00</b>

Tabel 11.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	199	97.55	219	89.75	418	93.30	376	93.77
Turkije	.	.	1	0.41	1	0.22	1	0.25
Marokko	1	0.49	.	.	1	0.22	.	.
Sur./ Ant./ Aru.	.	.	.	.	.	.	.	.
overig	3	1.47	24	9.84	27	6.03	6	1.50
onbekend	1	0.49	.	.	1	0.22	18	4.49
<b>TOTAAL</b>	<b>204</b>	<b>100.00</b>	<b>244</b>	<b>100.00</b>	<b>448</b>	<b>100.00</b>	<b>401</b>	<b>100.00</b>

Tabel 11.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	161	78.92	145	80.11
homoseksueel	26	12.75	19	10.50
biseksueel	8	3.92	5	2.76
onbekend	9	4.41	12	6.63
<b>TOTAAL</b>	<b>204</b>	<b>100.00</b>	<b>181</b>	<b>100.00</b>

Tabel 11.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitue(e)	3	1.52	47	19.92	50	11.52	41	10.22
prostituant(e)	10	5.05	1	0.42	11	2.53	10	2.49
geen van beide	178	89.90	181	76.69	359	82.72	283	70.57
onbekend	7	3.54	7	2.96	15	3.22	67	16.71
<b>TOTAAL</b>	<b>198</b>	<b>100.00</b>	<b>236</b>	<b>100.00</b>	<b>434</b>	<b>100.00</b>	<b>401</b>	<b>100.00</b>

Tabel 11.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	24	11.76	36	14.75	60	13.39	54	13.47
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	1	0.25
nee	161	78.92	175	71.72	336	75.00	289	72.07
onbekend	19	9.31	33	13.52	52	11.61	57	14.21
<b>TOTAAL</b>	<b>204</b>	<b>100.00</b>	<b>244</b>	<b>100.00</b>	<b>448</b>	<b>100.00</b>	<b>401</b>	<b>100.00</b>

Tabel 11.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>								
Gonorroë (excl.PVG)	3	1.5	1	0.4	4	0.9	4	1.0
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primair	.	.	4	1.6	4	0.9	.	.
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	10	4.9	10	4.0	20	4.4	26	6.4
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	.	.	.	.	2	0.5
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	1	0.5	.	.	1	0.2	1	0.2
" : primo: HSV type 2	.	.	2	0.8	2	0.4	2	0.5
" : recidief	.	.	.	.	.	.	2	0.5
Genitale wratten	9	4.4	10	4.0	19	4.2	35	8.6
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	.	.	.	.	.	.	.	.
Bacteriele Vaginose	1	0.5	6	2.4	7	1.6	3	0.7
Trichomoniasis	.	.	1	0.4	1	0.2	.	1.0
Candidiasis	1	0.5	7	2.8	8	1.8	4	0.2
Schaamluis	.	.	.	.	.	.	.	.
Scabies	1	0.5	.	.	1	0.2	1	0.2
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	3	0.7
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	.	.	.	.	.	.	1	0.2
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	26	12.6	41	16.5	67	15.1	84	20.6
HIV -	60	29.3	60	24.2	120	26.2	140	34.3
Nihil *	119	58.1	147	59.3	266	58.7	184	45.1
<b>TOTAAL</b>	205	100.0	248	100.0	453	100.0	408	100.0

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 11.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal #	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorrhoe	.	.	.	.	1	33.3	.	.	.	.	1	33.3	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	3
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	.	.	3	30.0	1	10.0	2	20.0	3	30.0	1	10.0	.	.	.	.	.	.	.	10
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
genitale wratten	.	.	.	.	1	11.1	2	22.2	1	11.1	2	22.2	1	11.1	1	11.1	1	11.1	.	.	.	9
overig	.	.	.	.	.	.	2	66.7	.	.	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	.	.	7	3.9	36	20.1	36	20.1	29	16.2	27	15.1	1	9.5	18	10.1	6	3.4	3	1.7	.	179
<b>TOTAAL</b>	.	.	7	3.4	41	20.0	41	20.0	33	16.1	34	16.6	20	9.8	19	9.3	7	3.4	3	1.5	.	205

Tabel 11.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal #		
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%			
<b>DIAGNOSE</b>																							
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	3	75.0	1	25.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
Chlamydia	.	.	3	30.0	3	30.0	3	30.0	1	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	.	.	2	
genitale wratten	.	.	2	20.0	2	20.0	4	40.0	2	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
overig	.	.	6	42.9	4	28.6	3	21.4	.	.	1	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Nihil *	2	1.0	27	13.0	64	30.9	45	21.7	29	14.0	18	8.7	8	3.9	10	4.8	4	1.9	.	.	.	207	
<b>TOTAAL</b>	2	0.8	38	15.3	73	29.4	59	23.8	33	13.3	19	7.7	8	3.2	11	4.4	5	2.0	.	.	.	248	

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 11.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	3	75.0	.	.	.	.	.	.	1	25.0	.	.	4
Syfilis: Prim. & Sec.	1	25.0	.	.	.	.	.	.	3	75.0	.	.	4
Chlamydia infectie	17	85.0	.	.	.	.	.	.	3	15.0	.	.	20
Herpes genitalis	2	66.7	.	.	.	.	.	.	1	33.3	.	.	3
Genitale wratten	18	94.7	.	.	.	.	.	.	1	5.3	.	.	19
Overig	15	88.2	.	.	.	.	.	.	2	11.8	.	.	17
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	365	94.3	1	0.3	1	0.3	.	.	19	4.9	1	0.3	387
<b>TOTAAL</b>	421	92.7	1	0.2	1	0.2	.	.	30	6.6	1	0.2	454

Tabel 11.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	2	66.7	1	33.3	.	.	.	.	3
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	7	70.0	3	30.0	.	.	.	.	10
Herpes genitalis	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Genitale wratten	7	77.8	1	11.1	1	11.1	.	.	9
Overig	2	66.7	.	.	1	33.3	.	.	3
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	143	79.9	21	11.7	6	3.4	9	5.1	179
<b>TOTAAL</b>	162	79.0	26	12.7	8	3.9	9	4.4	205

Tabel 11.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	.	.	1	33.3	2	66.7	.	.	3
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	1	10.0	9	90.0	.	.	10
Herpes genitalis	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Genitale wratten	1	11.11	.	.	8	88.9	.	.	9
Overig	.	.	.	.	3	100.0	.	.	3
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	2	1.2	9	5.2	155	89.6	7	4.1	173
<b>TOTAAL</b>	3	1.5	11	5.5	178	89.5	7	3.5	199

Tabel 11.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	1	25.0	.	.	3	75.0	.	.	4
Chlamydia infectie	1	10.0	.	.	9	90.0	.	.	10
Herpes genitalis	.	.	.	.	1	50.0	1	50.0	2
Genitale wratten	1	10.0	.	.	9	90.0	.	.	10
Overig	.	.	.	.	12	92.3	1	7.7	13
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	45	22.5	1	0.5	149	74.5	5	2.5	200
<b>TOTAAL</b>	48	20.0	1	0.4	184	76.7	7	2.9	240

Tabel 11.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		ja, ooit twee keer SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	.	.	4	100.0	.	.	4
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	2	50.0	2	50.0	4
Chlamydia infectie	.	.	.	.	17	85.0	3	15.0	20
Herpes genitalis	.	.	.	.	2	66.7	1	33.3	3
Genitale wratten	3	15.8	.	.	14	73.7	2	10.5	19
Overig	2	11.8	.	.	14	82.4	1	5.9	17
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	55	14.2	.	.	288	74.4	44	11.4	387
<b>TOTAAL</b>	60	13.2	.	.	341	75.1	53	11.7	454



## 12: GGD Zuid Kennemerland

Tabel 12.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	40	47.62	120	63.49	3	30.00	163	57.60	187	49.21
vrouw	44	52.38	69	36.51	7	70.00	120	42.40	175	46.05
onbekend	.	.	.	.	.	.	.	.	18	4.74
<b>TOTAAL</b>	<b>84</b>	<b>100.00</b>	<b>189</b>	<b>100.00</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>	<b>283</b>	<b>100.00</b>	<b>380</b>	<b>100.00</b>

Tabel 12.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	9	10.47	17	8.76	.	.	26	8.97	24	6.32
februari	3	3.49	21	10.82	1	10.00	25	8.62	32	8.42
maart	4	4.65	17	8.76	.	.	21	7.24	33	8.68
april	2	2.33	19	9.79	1	10.00	22	7.59	23	6.05
mei	9	10.47	10	5.15	2	20.00	21	7.24	25	6.58
juni	9	10.47	18	9.28	1	10.00	28	9.66	28	7.37
juli	11	12.79	24	12.37	1	10.00	36	12.41	48	12.63
augustus	4	4.65	12	6.19	.	.	16	5.52	23	6.05
september	7	8.14	16	8.25	3	30.00	26	8.97	28	7.37
oktober	11	12.79	16	8.25	.	.	27	9.31	40	10.53
november	11	12.79	11	5.67	1	10.00	23	7.93	21	5.53
december	6	6.98	13	6.70	.	.	19	6.55	35	9.21
onbekend	.	.	.	.	.	.	.	.	20	5.26
<b>TOTAAL</b>	<b>86</b>	<b>100.00</b>	<b>194</b>	<b>100.00</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>	<b>290</b>	<b>100.00</b>	<b>380</b>	<b>100.00</b>

Tabel 12.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>								
SOA-onderzoek	2	1.23	2	1.67	4	1.41	83	21.84
HIV-test	37	22.70	31	25.83	68	24.03	254	66.84
beide	114	69.94	67	55.83	181	63.96	27	7.11
onbekend	10	6.13	20	16.67	30	10.60	16	4.21
<b>TOTAAL</b>	<b>163</b>	<b>100.00</b>	<b>120</b>	<b>100.00</b>	<b>283</b>	<b>100.00</b>	<b>380</b>	<b>100.00</b>

Tabel 12.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1997	totaal 1996
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	2	.	2	1
geen SOA onderzoek, HIV negatief	4	.	181	7	192	295
SOA positief, geen HIV test	.	35	2	3	40	39
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	.	.	5	5	1
SOA negatief, geen HIV test	.	34	1	11	46	39
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	.	1	.	4	5	5
<b>TOTAAL</b>	<b>4</b>	<b>70</b>	<b>186</b>	<b>30</b>	<b>290</b>	<b>380</b>

Tabel 12.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	.	.	.	.	.	.	4	1.05
15-19	6	3.68	17	14.17	23	8.13	52	13.68
20-24	32	19.63	29	24.17	61	21.55	80	21.05
25-29	41	25.15	30	25.00	71	25.09	77	20.26
30-34	31	19.02	15	12.50	46	16.25	57	15.00
35-39	22	13.50	9	7.50	31	10.95	41	10.79
40-44	10	6.13	11	9.17	21	7.42	19	5.00
45-54	16	9.82	9	7.50	25	8.83	26	6.84
>54	4	2.45	.	.	4	1.41	14	3.68
??	1	0.61	.	.	1	0.35	10	2.63
<b>TOTAAL</b>	<b>163</b>	<b>100.00</b>	<b>120</b>	<b>100.00</b>	<b>283</b>	<b>100.00</b>	<b>380</b>	<b>100.00</b>

Tabel 12.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	150	92.02	113	94.17	263	92.93	339	89.21
Turkije	1	0.61	.	.	1	0.35	1	0.26
Marokko	2	1.23	.	.	2	0.71	3	0.79
Sur./ Ant./ Aru.	.	.	.	.	.	.	2	0.53
overig	10	6.13	6	5.00	16	5.65	21	5.53
onbekend	.	.	1	0.83	1	0.35	14	3.68
<b>TOTAAL</b>	<b>163</b>	<b>100.00</b>	<b>120</b>	<b>100.00</b>	<b>283</b>	<b>100.00</b>	<b>380</b>	<b>100.00</b>

Tabel 12.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	138	84.66	153	81.82
homoseksueel	14	8.59	25	13.37
biseksueel	7	4.29	5	2.67
onbekend	4	2.45	4	2.14
<b>TOTAAL</b>	163	100.00	187	100.00

Tabel 12.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitutie(e)	1	0.63	4	3.39	5	1.81	6	1.58
prostituant(e)	12	7.55	.	.	12	4.33	36	9.47
geen van beide	146	91.82	113	95.76	259	93.50	320	84.21
onbekend	.	.	1	0.85	1	0.36	18	4.74
<b>TOTAAL</b>	159	100.00	118	100.00	277	100.00	380	100.00

Tabel 12.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	6	3.68	10	8.33	16	5.65	34	8.95
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	.	.
nee	.	.	.	.	.	.	332	87.37
onbekend	157	96.32	110	91.67	267	94.35	14	3.68
<b>TOTAAL</b>	163	100.00	120	100.00	283	100.00	380	100.00

Tabel 12.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>								
Gonorroë (excl.PVG)	2	1.2	1	0.8	3	1.0	1	
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.	.	
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	1	0.3
" : primair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	1	0.6	3	2.3	4	1.4	3	0.8
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	1	0.6	.	.	1	0.3	.	.
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : recidief	1	0.6	2	1.5	3	1.0	1	0.3
Genitale wratten	2	1.2	2	1.5	4	1.4	6	1.6
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	3	1.8	.	.	3	1.0	3	0.8
Bacteriele Vaginose	.	.	16	12.3	16	5.5	5	1.3
Trichomoniasis	.	.	.	.	.	.	.	.
Candidiasis	7	4.3	3	2.3	10	3.4	2	0.5
Schaamluis	.	.	.	.	.	.	.	.
Scabies	.	.	.	.	.	.	.	.
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	2	1.2	3	2.3	5	1.7	20	5.2
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	2	1.2	.	.	2	0.7	1	0.3
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	21	12.9	31	23.7	51	17.7	43	11.2
HIV -	121	74.2	76	58.0	197	67.0	301	78.6
Nihil *	21	12.9	24	18.3	45	15.3	39	10.2
<b>TOTAAL</b>	163	100.0	131	100.0	293	100.0	383	100.0

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 12.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100	.	.	.	.	.	2
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
genitale wratten	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	2
overig	.	.	1	8.3	1	8.3	2	16.7	1	8.3	5	41.7	.	.	1	8.3	1	8.3	.	.	.	12
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	2
Nihil *	.	.	5	3.5	31	21.8	37	26.1	28	19.7	16	11.3	10	7.0	11	7.8	3	2.1	1	0.7	.	142
<b>TOTAAL</b>	.	.	6	3.7	32	19.6	41	25.2	31	19.0	22	13.5	10	6.1	16	9.8	4	2.5	1	0.6	.	163

Tabel 12.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	1
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	1	33.3	1	33.3	.	.	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
herpes genitalis	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	2
genitale wratten	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
overig	.	.	6	26.1	4	18.2	7	30.4	3	13.0	.	.	2	8.7	.	.	.	.	.	.	.	22
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	.	.	11	11.6	23	24.2	23	24.2	12	12.6	9	9.5	8	8.4	9	9.5	.	.	.	.	.	95
<b>TOTAAL</b>	.	.	19	15.1	30	24.0	30	23.8	16	12.7	9	7.1	12	9.5	9	7.1	.	.	.	.	.	125

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 12.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	3	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	5	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
Herpes genitalis	2	50.0	.	.	.	.	.	.	2	50.0	.	.	4
Genitale wratten	4	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
Overig	32	91.4	.	.	.	.	.	.	2	5.6	1	0.7	35
HIV+	2	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Nihil	227	93.4	2	0.8	2	0.8	.	.	12	.	.	.	243
<b>TOTAAL</b>	275	92.9	2	0.7	2	0.7	.	.	16	5.4	1	0.3	296

Tabel 12.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	2	100.0	.	.	.	.	.	.	2
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Herpes genitalis	1	50.0	1	50.0	.	.	.	.	2
Genitale wratten	2	100.0	.	.	.	.	.	.	2
Overig	11	91.7	1	8.3	.	.	.	.	12
HIV+	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	2
Nihil	121	85.2	11	7.8	6	4.2	4	2.8	142
<b>TOTAAL</b>	<b>138</b>	<b>84.7</b>	<b>14</b>	<b>8.6</b>	<b>7</b>	<b>4.3</b>	<b>4</b>	<b>2.5</b>	<b>163</b>

Tabel 12.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	.	.	2	100.0	.	.	.	.	2
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	.	.	1	0.7	.	.	1
Herpes genitalis	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Genitale wratten	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Overig	1	9.1	.	.	10	90.9	.	.	11
HIV+	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Nihil	.	.	10	7.2	129	92.8	.	.	139
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>	<b>0.6</b>	<b>12</b>	<b>7.6</b>	<b>146</b>	<b>91.8</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>159</b>

Tabel 12.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitutée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	.	.	3	100.0	.	.	3
Herpes genitalis	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Genitale wratten	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Overig	3	13.0	.	.	20	97.0	.	.	23
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	1	1.1	.	.	91	97.9	.	.	93
<b>TOTAAL</b>	<b>5</b>	<b>4.0</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>118</b>	<b>95.2</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>124</b>

Tabel 12.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		ja, ooit twee keer SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	3	100.0	3
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	1	20.0	.	.	.	.	4	80.0	5
Herpes genitalis	2	50.0	.	.	.	.	2	50.0	4
Genitale wratten	2	50.0	.	.	.	.	2	50.0	4
Overig	5	14.3	.	.	.	.	30	85.7	35
HIV+	1	50.0	.	.	.	.	1	50.0	2
Nihil	9	3.7	.	.	.	.	234	96.3	243
<b>TOTAAL</b>	20	6.8	.	.	.	.	276	93.2	296



## DEEL E GEGEVENS VOOR GGD'S AFZONDERLIJK 1998

### 1. GG en GD Amsterdam

Tabel 1.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man							8450	53.0	8300	53.2
vrouw							7490	47.0	7310	46.8
onbekend							0	.	0	.
<b>TOTAAL</b>							<b>15940</b>	<b>100.0</b>	<b>15610</b>	<b>100.0</b>

Tabel 1.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari							1245	7.8	1213	7.8
februari							1229	7.7	1136	7.3
maart							1299	8.1	1157	7.4
april							1191	7.5	1276	8.2
mei							1166	7.3	1186	7.6
juni							1336	8.4	1312	8.4
juli							1500	9.4	1577	10.1
augustus							1354	8.5	1423	9.1
september							1479	9.3	1532	9.8
oktober							1465	9.2	1400	9.0
november							1436	9.0	1207	7.7
december							1240	7.8	1191	7.6
onbekend							0	.	0	.
<b>TOTAAL</b>							<b>15940</b>	<b>100.0</b>	<b>15610</b>	<b>100.0</b>

Tabel 1.5:  
 Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

LEEFTIJD	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<14	2	0.0	11	0.1	13	0.1	11	0.1
15-19	180	2.1	691	9.2	871	5.5	841	5.4
20-24	1164	13.8	2247	30.0	3411	21.4	3195	20.5
25-29	1856	22.0	1872	25.0	3728	23.4	3970	25.4
30-34	1842	21.8	1148	15.3	2990	18.8	3011	19.3
35-39	1385	16.4	690	9.2	2075	13.0	1947	12.5
40-44	786	9.3	427	5.7	1213	7.6	1174	7.5
45-54	902	10.7	358	4.8	1260	7.9	1128	7.2
>54	333	3.9	46	0.6	379	2.4	333	2.1
??	0	.	0	.	0	.	0	.

TOTAAL	8450	100.0	7490	100.0	15940	100.0	15610	100.0
--------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Tabel 1.6:  
Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	4999	59.2	4634	61.9	9363	58.7	9219	59.1
Turkije	277	3.3	37	0.5	314	2.0	442	2.8
Marokko	377	4.5	103	1.4	480	3.0	507	3.2
Sur./ Ant./ Aru.	952	11.3	814	10.9	1766	11.1	1808	11.6
overig	1845	21.8	1902	25.4	3747	23.5	3634	23.3
onbekend	0	.	0	.	0	.	.	.
TOTAAL	8450	100.0	7490	100.0	15940	100.0	15610	100.0

Tabel 1.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	5895	69.8	6078	73.2
homoseksueel	2247	26.6	1915	23.1
biseksueel	294	3.5	283	3.4
onbekend	14	0.2	24	0.3
<b>TOTAAL</b>	<b>8450</b>	<b>100.0</b>	<b>8300</b>	<b>100.0</b>

Tabel 1.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostituë(e)	257	3.0	1546	20.6	1803	11.3	2005	12.8
prostituante(e)	1084	12.8	0	.	1084	6.8	1203	7.7
geen van beide	7069	83.7	5936	79.3	13005	81.6	12349	79.1
onbekend	40	0.5	8	0.1	48	0.3	53	0.3
<b>TOTAAL</b>	<b>8450</b>	<b>100.0</b>	<b>7490</b>	<b>100.0</b>	<b>15940</b>	<b>100.0</b>	<b>15610</b>	<b>100.0</b>

Tabel 1.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit lues of gonorrhoe	2007	23.8	767	10.2	2774	17.4	2893	18.5
ja, ooit twee lues of gonorrhoe	125	1.5	14	0.2	139	0.9	124	0.8
nee	1860	22.0	2118	28.3	3978	25.0	3911	25.1
onbekend	4458	52.8	4591	61.3	9049	56.8	8682	55.6
<b>TOTAAL</b>	<b>8450</b>	<b>100.0</b>	<b>7490</b>	<b>100.0</b>	<b>15940</b>	<b>100.0</b>	<b>15610</b>	<b>100.0</b>

Tabel 1.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>								
Gonorroë (excl.PVG)	385	3.8	54	0.6	439	2.2	451	2.4
Gonorroë: PVG	36	0.4	8	0.1	44	0.2	61	0.3
Syfilis: niet gespecificeerd	5	0.1	9	0.1	14	0.1	11	0.1
" : primair	6	0.1	4	0.0	10	0.1	12	0.1
" : secundair	10	0.1	1	0.0	11	0.1	6	0.0
" : latens recens	6	0.1	8	0.1	14	0.1	19	0.1
" : latens tarda	40	0.4	24	0.2	64	0.3	67	0.4
Chlamydia infectie	876	8.7	704	7.3	1580	8.0	1482	8.0
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	124	1.2	131	1.4	255	1.3	229	1.2
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : recidief	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	287	2.8	159	1.7	446	2.3	429	2.3
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	3081	30.4	0	.	3081	15.6	2994	16.9
Bacteriele Vaginose	0	.	582	6.0	582	2.9	625	3.4
Trichomoniasis	0	.	234	2.4	234	1.2	260	1.4
Candidiasis	0	.	1359	14.1	1359	6.9	1361	7.3
Schaamluis	41	0.4	10	0.1	51	0.3	71	0.4
Scabies	28	0.3	3	0.0	31	0.2	43	0.2
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	2089	20.6	3452	35.9	5550	28.1	4497	24.1
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	22	0.2	3	0.0	25	0.1	23	0.1
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	7045	69.6	6745	70.1	13790	69.8	12738	68.5
HIV -	1416	14.0	1433	14.9	2849	14.4	2234	12.0
Nihil *	1660	16.4	1447	15.0	3107	15.7	3731	20.1
<b>TOTAAL</b>	10121	100.0	9625	100.0	19746	100.0	18603	100.0

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 1.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
<b>DIAGNOSE</b>																				
Gonorrhoe	0	.	15	3.6	43	10.2	81	19.2	98	23.3	91	21.6	46	10.9	39	9.3	8	1.9	421	
Syf.: Pr. & S.	0	.	0	.	0	.	8	50.0	2	12.5	3	18.8	1	6.3	0	.	2	12.5	16	
Chlamydia	0	.	29	3.3	179	20.4	211	24.1	220	25.1	110	12.6	57	6.5	55	6.3	15	1.7	876	
herpes genitalis	0	.	2	1.6	16	12.9	30	24.2	28	22.6	14	11.3	9	7.3	15	12.1	10	8.1	124	
genitale wratten	0	.	4	1.4	43	15.0	72	25.1	78	27.2	38	13.2	17	5.9	25	8.7	10	3.5	287	
overig	3	0.1	60	1.6	526	14.4	852	23.3	771	21.0	550	15.0	340	9.3	394	10.8	167	4.6	3663	
HIV+	0	.	0	.	1	4.5	6	27.3	9	40.9	3	13.6	2	9.1	1	4.5	0	.	22	
Nihil *	0	.	74	2.4	466	15.1	690	22.4	647	21.0	486	15.8	282	9.2	325	10.6	106	3.4	3076	
<b>TOTAAL</b>	3	0.0	174	2.2	1274	15.0	1950	23.0	1853	21.8	1295	15.3	754	8.9	854	10.1	318	3.7	8485	

Tabel 1.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
<b>DIAGNOSE</b>																				
Gonorrhoe	0	.	18	29.0	28	45.2	8	12.9	3	4.8	1	1.6	1	1.6	3	4.8	0	.	62	
Syf.: Pr. & S.	0	.	0	.	2	40.0	1	20.0	2	40.0	0	.	0	.	0	.	0	.	5	
Chlamydia	3	0.4	127	18.0	301	42.8	158	22.4	63	8.9	29	4.1	9	1.3	12	1.7	2	0.3	704	
herpes genitalis	0	.	12	9.2	29	22.1	40	30.5	27	20.6	14	10.7	4	3.1	4	3.1	1	0.8	131	
genitale wratten	0	.	19	11.9	71	44.7	39	24.5	17	10.7	4	2.5	4	2.5	5	3.1	0	.	159	
overig	5	0.1	411	8.5	1476	30.4	1235	25.5	757	15.6	430	8.9	275	5.7	234	4.8	25	0.5	4848	
HIV+	0	.	0	.	0	.	3	100.0	0	.	0	.	0	.	0	.	0	.	3	
Nihil *	5	0.2	241	8.4	816	28.3	720	25.0	476	16.5	276	9.6	184	6.4	139	4.8	23	0.8	2880	
<b>TOTAAL</b>	13	0.1	828	9.4	2723	31.0	2204	25.1	1335	15.2	754	8.6	477	5.4	398	4.5	51	0.6	8779	

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 1.14 t/m 1.18a.

Tabel 1.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	251	52.0	9	1.9	25	5.2	87	18.0	111	23.0	.	.	483
Syfilis: Prim. & Sec.	5	23.8	3	14.3	1	4.8	4	19.0	8	38.1	.	.	21
Chlamydia infectie	897	56.8	29	1.8	41	2.6	288	18.2	325	20.6	.	.	1580
Herpes genitalis	167	65.5	3	1.2	3	1.2	29	11.4	53	20.8	.	.	255
Genitale wratten	283	63.5	5	1.1	17	3.8	44	9.9	97	21.7	.	.	446
Overig	5457	64.1	96	1.1	166	2.0	814	9.6	1978	23.2	.	.	8511
HIV+	12	54.5	.	.	.	.	.	.	10	45.5	.	.	22
Nihil	3674	61.7	122	2.0	170	2.9	526	8.8	1464	24.6	.	.	5956
<b>TOTAAL</b>	10746	62.2	267	1.5	423	2.4	1792	10.4	4046	23.4	.	.	17274

Tabel 1.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	153	36.3	249	59.1	19	4.5	.	.	421
Syfilis: Prim. & Sec.	9	56.3	7	43.8	.	.	.	.	16
Chlamydia infectie	630	71.9	227	25.9	19	2.2	.	.	876
Herpes genitalis	93	75.0	28	22.6	3	2.4	.	.	124
Genitale wratten	157	54.7	118	41.1	12	4.2	.	.	287
Overig	2405	65.7	1107	30.2	147	4.0	4	0.1	3663
HIV+	2	9.1	18	81.8	2	9.1	.	.	22
Nihil	2231	72.5	727	23.6	112	3.6	6	0.2	3076
<b>TOTAAL</b>	<b>5680</b>	<b>66.9</b>	<b>2581</b>	<b>29.2</b>	<b>314</b>	<b>3.7</b>	<b>10</b>	<b>0.1</b>	<b>8485</b>

Tabel 1.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	8	1.9	33	7.8	377	89.5	3	0.7	421
Syfilis: Prim. & Sec.	0	.	2	12.5	14	87.5	0	.	16
Chlamydia infectie	20	2.3	88	10.0	763	87.1	5	0.6	876
Herpes genitalis	3	2.4	21	16.9	100	80.6	0	.	124
Genitale wratten	12	4.2	30	10.5	245	85.4	0	.	287
Overig	103	2.8	453	12.4	3096	84.5	11	0.3	3663
HIV+	2	9.1	0	.	20	90.9	0	.	22
Nihil	112	3.6	401	13.0	2546	82.8	17	0.6	3076
<b>TOTAAL</b>	<b>260</b>	<b>3.1</b>	<b>1028</b>	<b>12.1</b>	<b>7161</b>	<b>84.4</b>	<b>36</b>	<b>0.4</b>	<b>8485</b>

Tabel 1.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>							
Gonorrhoe	14	22.6	48	77.4	0	.	62
Syfilis: Prim. & Sec.	2	40.0	3	60.0	0	.	5
Chlamydia infectie	108	15.3	595	84.5	1	0.1	704
Herpes genitalis	15	11.5	116	88.5	0	.	131
Genitale wratten	30	18.9	129	81.1	0	.	159
Overig	809	16.7	4035	83.2	4	0.1	4848
HIV+	0	.	3	100.0	0	.	3
Nihil	708	24.6	2170	75.3	2	0.1	2880
<b>TOTAAL</b>	<b>1686</b>	<b>19.2</b>	<b>7099</b>	<b>58.5</b>	<b>7</b>	<b>0.1</b>	<b>8792</b>

Tabel 1.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit lues of gonorroe gehad		ja, ooit twee keer lues of gonorroe gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroe	201	41.6	12	2.5	74	15.3	196	40.6	483
Syfilis: Prim. & Sec.	7	33.3	0	.	5	23.8	9	42.9	21
Chlamydia infectie	318	20.1	16	1.0	388	24.6	858	54.3	1580
Herpes genitalis	37	14.5	6	2.4	62	24.3	150	58.8	255
Genitale wratten	74	16.6	6	1.3	102	22.9	264	59.2	446
Overig	1259	14.8	57	0.7	2084	24.5	5111	60.1	8511
HIV+	3	13.6	0	.	6	27.3	13	59.1	22
Nihil	905	15.2	43	0.7	1389	23.3	3619	60.8	5956
<b>TOTAAL</b>	<b>2804</b>	<b>16.2</b>	<b>140</b>	<b>0.4</b>	<b>4110</b>	<b>23.8</b>	<b>10220</b>	<b>59.2</b>	<b>17274</b>



**2: GG en GD Utrecht**

Tabel 2.2:

Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	283	64.17	130	51.59	419	52.44	832	55.76	805	52.96
vrouw	158	35.83	118	46.83	380	47.56	656	43.97	707	46.51
onbekend			4	1.59			4	0.27	8	0.53
<b>TOTAAL</b>	<b>441</b>	<b>100.00</b>	<b>252</b>	<b>100.00</b>	<b>799</b>	<b>100.00</b>	<b>1492</b>	<b>100.00</b>	<b>1520</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.3:

Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1997		totaal 1996	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	29	6.58	20	7.94	68	8.51	117	7.84	163	10.72
februari	38	8.62	24	9.52	60	7.51	122	8.18	157	10.33
maart	32	7.26	16	6.35	70	8.76	118	7.91	102	6.71
april	32	7.26	27	10.71	69	8.64	128	8.58	100	6.58
mei	28	6.35	14	5.56	37	4.63	79	5.29	110	7.24
juni	24	5.44	12	4.76	70	8.76	106	7.10	108	7.11
juli	40	9.07	17	6.75	94	11.76	151	10.12	143	9.41
augustus	43	9.75	15	5.95	75	9.39	133	8.91	123	8.09
september	43	9.75	37	14.68	59	7.38	139	9.32	151	9.93
oktober	40	9.07	23	9.13	73	9.14	136	9.12	160	10.53
november	42	9.52	23	9.13	54	6.76	119	7.98	101	6.64
december	50	11.34	24	9.52	70	8.76	144	9.65	102	6.71
<b>TOTAAL</b>	<b>441</b>	<b>100.00</b>	<b>252</b>	<b>100.00</b>	<b>799</b>	<b>100.00</b>	<b>1492</b>	<b>100.00</b>	<b>1520</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.4a:

Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>										
SOA-onderzoek	282	33.89	158	24.09			440	29.49	529	34.80
HIV-test	131	15.75	122	18.60	4	100.00	257	17.23	284	18.68
beide	417	50.12	376	57.23			793	53.15	707	46.51
<b>TOTAAL</b>	<b>832</b>	<b>100.00</b>	<b>656</b>	<b>100.00</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>1492</b>	<b>100.00</b>	<b>1520</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	totaal 1998	totaal 1997
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>					
geen SOA onderzoek, geen HIV test	.	1	.	1	.
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	251	.	251	281
geen SOA onderzoek, HIV negatief	89	.	9	98	119
SOA positief, geen HIV test	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV positief	1	.	70	71	55
SOA negatief, geen HIV test	342	.	1	343	420
SOA negatief, HIV positief	.	.	1	1	1
SOA negatief, HIV negatief	8	5	712	727	644
<b>TOTAAL</b>	<b>441</b>	<b>257</b>	<b>793</b>	<b>1492</b>	<b>1520</b>

Tabel 2.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1998		Totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>										
<14	3	0.36	4	0.61	.	.	7	0.47	8	0.53
15-19	18	2.16	65	9.91	1	25.0	84	5.63	85	5.59
20-24	172	20.67	238	36.28	.	.	410	27.48	426	28.03
25-29	218	26.20	172	26.22	.	.	390	26.14	388	25.53
30-34	146	17.55	71	10.81	1	25.0	218	14.61	250	16.45
35-39	102	12.26	54	8.22	.	.	156	10.46	123	8.09
40-44	86	10.34	26	3.96	.	.	112	7.51	92	6.05
45-54	53	6.37	22	3.35	.	.	75	5.03	109	7.17
>54	34	4.09	3	0.46	.	.	37	2.48	32	2.11
??	.	.	1	0.15	2	50.0	3	0.20	7	0.46
<b>TOTAAL</b>	<b>832</b>	<b>100.00</b>	<b>656</b>	<b>100.00</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>1492</b>	<b>100.00</b>	<b>1520</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>										
Nederland	699	84.01	594	90.55	2	50.00	1295	86.80	1325	87.17
Turkije	7	0.84	5	0.76	.	.	12	0.80	15	0.99
Marokko	22	2.64	5	0.76	.	.	27	1.81	29	1.91
Sur./ Ant./ Aru.	36	4.33	12	1.83	.	.	48	3.22	27	1.78
overig	58	6.97	31	4.72	.	.	89	5.97	108	7.11
onbekend	10	1.20	9	1.37	2	50.00	21	1.41	16	1.05
<b>TOTAAL</b>	<b>832</b>	<b>100.00</b>	<b>656</b>	<b>100.00</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>1492</b>	<b>100.00</b>	<b>1520</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	639	76.8	625	77.64
homoseksueel	153	18.39	128	15.90
biseksueel	32	3.85	37	4.60
onbekend	8	0.96	15	1.86
<b>TOTAAL</b>	<b>832</b>	<b>100.00</b>	<b>805</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>										
prostitu�e(e)	10	1.20	19	2.90	.	.	29	1.94	31	2.04
prostituante(e)	70	8.41	1	0.15	.	.	71	4.76	71	4.67
geen van beide	726	87.26	617	94.05	3	75.00	1346	90.21	1354	89.08
onbekend	26	3.13	19	2.90	1	25.00	46	3.08	64	4.21
<b>TOTAAL</b>	<b>832</b>	<b>100.00</b>	<b>656</b>	<b>100.00</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>1492</b>	<b>100.00</b>	<b>1520</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>										
ja, ooit een SOA	151	18.15	98	14.94	1	25.00	250	16.76	.	.
ja, ooit twee SOA	660	79.33	547	83.38	2	50.00	1209	81.03	1268	83.42
nee	21	2.52	11	1.68	1	25.00	33	2.21	57	3.75
onbekend										
<b>TOTAAL</b>	<b>832</b>	<b>100.00</b>	<b>656</b>	<b>100.00</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>1492</b>	<b>100.00</b>	<b>1520</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

DIAGNOSE	mannen		Vrouwen		onbekend		Totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Gonorrhoe (excl.PVG)	12	1.4	3	0.4			15	1.0	13	0.8
Gonorrhoe: PVG										
Syfilis: niet gespecificeerd	1	0.1	2	0.3			3	0.2	5	0.3
" : primair			1	0.1			1	0.1		
" : secundair										
" : latens recens			2	0.3			2	0.1	5	0.3
" : latens tarda	2	0.2	2	0.3			2	0.3		
Chlamydia infectie	48	5.5	46	6.5			94	6.0	87	5.5
Herpes genitalis: primo: HSV type ?									1	0.1
" : primo:HSV-type1&2										
" : primo: HSV type 1	2	0.2	4	0.6			6	0.4	5	0.3
" : primo: HSV type 2	3	0.3	2	0.3			5	0.3	3	0.2
" : recidief			1	0.1			1	0.1	3	0.2
Genitale wratten	13	1.5	21	3.0			34	2.2	41	2.6
Hepatitis B: acuut	2	0.2					2	0.1	2	0.1
Hepatitis B: chronisch	2	0.2					2	0.1		
Niet Specifieke Urethritis									6	0.4
Bacteriele Vaginose			2	0.3			2	0.1	2	0.1
Trichomoniasis									3	0.2
Candidiasis			4	0.6			4	0.3	2	0.1
Schaamluis			1	0.1			1	0.1		
Scabies	2	0.2					2	0.1	2	0.1
Ulcus molle										
Granuloma inguinale										
Overig/ niet gespecificeerd	2	0.2					2	0.1	3	0.2
PID										
HIV +	2	0.2					2	0.1	1	0.1
<i>gediagnostiseerde infecties</i>									184	11.6
HIV -	547	63.2	498	70.7	4	100	1049	66.6	980	61.9
Nihil *	228	26.3	115	16.3			343	21.8	420	26.5
<b>TOTAAL</b>	<b>866</b>	<b>100</b>	<b>705</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>1575</b>	<b>100</b>	<b>1584</b>	<b>100</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 2.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
<b>DIAGNOSE</b>																				
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	4	33.3	5	41.7	.	.	1	8.3	2	16.7	.	.	.	12
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	.	.	12	25.0	15	31.3	7	14.6	6	12.5	2	4.2	5	10.4	1	2.1	.	48
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	1	20.0	3	60.0	.	.	1	20.0	.	.	.	5
genitale wratten	.	.	.	.	2	15.4	3	23.1	2	15.4	2	15.4	2	15.4	1	7.7	1	7.7	.	13
overig	.	.	.	.	1	9.1	5	45.5	2	18.2	.	.	3	27.3	.	.	.	.	.	11
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	2
Nihil *	3	0.4	18	2.4	157	21.1	194	26.0	128	17.2	91	12.2	79	10.6	43	5.8	32	4.3	.	745
<b>TOTAAL</b>	3	0.4	18	2.4	172	20.6	221	26.4	146	17.5	102	12.2	87	10.4	53	6.3	34	4.1	.	836

Tabel 2.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??	totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	#	
<b>DIAGNOSE</b>																					
Gonorroë	.	.	1	33.3	.	.	.	.	1	33.3	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia	.	.	3	6.5	23	50.0	10	21.7	5	10.9	2	4.3	1	2.2	2	4.3	.	.	.	.	46
herpes genitalis	.	.	.	.	1	14.3	2	28.6	2	28.6	.	.	1	14.3	1	14.3	.	.	.	.	7
genitale wratten	.	.	6	28.6	6	28.6	5	23.8	.	.	1	4.8	2	9.5	1	4.8	.	.	.	.	21
overig	.	.	.	.	3	23.1	6	46.2	.	.	2	15.4	.	.	2	15.4	.	.	.	.	13
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	4	0.7	55	9.6	207	36.2	151	26.4	63	11.0	50	8.7	22	3.8	16	2.8	3	0.5	1	0.2	572
<b>TOTAAL</b>	4	0.7	65	9.8	240	36.3	174	26.2	71	10.7	57	8.6	26	3.9	22	3.3	3	0.5	1	0.2	663

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 2.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	9	60.0	3	20.0	1	6.7	2	13.3	.	.	.	.	15
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	75	79.8	2	2.1	4	4.3	9	9.6	4	4.3	.	.	94
Herpes genitalis	10	83.3	.	.	.	.	.	.	2	16.7	.	.	12
Genitale wratten	31	91.2	.	.	1	2.9	.	.	2	5.9	.	.	34
Overig	20	83.3	.	.	.	.	1	4.2	3	12.5	.	.	24
HIV+	1	50.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	2
Nihil	1156	87.4	9	0.7	21	1.6	37	2.8	78	5.9	21	1.6	1322
<b>TOTAAL</b>	1302	86.6	14	0.9	27	1.8	49	3.3	90	6.0	21	1.4	1503

Tabel 2.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	6	50.0	5	41.7	1	8.3	.	.	12
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	42	87.5	5	10.4	1	2.1	.	.	48
Herpes genitalis	4	80.0	1	20.0	.	.	.	.	5
Genitale wratten	10	76.9	3	23.1	.	.	.	.	13
Overig	3	27.3	7	63.6	1	9.1	.	.	11
HIV+	1	50.0	1	50.0	.	.	.	.	2
Nihil	576	77.3	132	17.7	29	3.9	8	1.1	745
<b>TOTAAL</b>	642	76.8	154	18.4	32	3.8	8	1.0	836

Tabel 2.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	.	.	2	16.7	10	83.3	.	.	12
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	2	4.2	45	93.3	1	2.1	48
Herpes genitalis	.	.	.	.	4	80.0	1	20.0	5
Genitale wratten	.	.	.	.	13	100.0	.	.	13
Overig	.	.	.	.	11	100.0	.	.	11
HIV+	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Nihil	10	1.3	66	8.9	645	86.6	24	3.2	745
<b>TOTAAL</b>	10	1.2	70	8.4	730	87.3	26	3.1	836

Tabel 2.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	.	.	.	.	3	100.0	.	.	3
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	2	4.3	.	.	43	93.5	1	2.2	46
Herpes genitalis	1	14.3	.	.	5	71.4	1	14.3	7
Genitale wratten	1	4.8	.	.	19	90.5	1	4.8	21
Overig	2	15.4	.	.	11	84.6	.	.	13
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	14	2.4	1	0.2	541	94.6	16	2.8	572
<b>TOTAAL</b>	20	3.0	1	0.2	623	94.0	19	2.9	663

Tabel 2.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		Totaal
	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>							
Gonorrhoe	8	53.3	7	46.7	.	.	15
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	16	17.0	77	81.9	1	1.1	94
Herpes genitalis	2	16.7	9	75.0	1	8.3	12
Genitale wratten	7	20.6	27	79.4	.	.	34
Overig	8	33.3	15	62.5	1	4.2	24
HIV+	1	50.0	1	50.0	.	.	2
Nihil	217	16.4	1079	81.7	25	1.9	1321
<b>TOTAAL</b>	260	17.3	1215	80.8	28	1.9	1503



**3: GGD Rotterdam e.o.**

Tabel 3.2:

Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	410	50.81	7	30.43	2	50.00	419	50.24	213	49.42
vrouw	397	49.19	16	69.57	2	50.00	415	49.76	217	50.35
onbekend									1	0.23
<b>TOTAAL</b>	<b>807</b>	<b>100.00</b>	<b>23</b>	<b>100.00</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>834</b>	<b>100.00</b>	<b>431</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3.3:

Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	31	3.84	4	17.39	.	.	35	4.19	24	5.57
februari	45	5.57	4	17.39	2	50.00	51	6.11	17	3.94
maart	34	4.21	4	17.39	2	50.00	40	4.79	13	3.02
april	42	5.20	11	47.83	.	.	53	6.35	16	3.71
mei	22	2.72	.	.	.	.	22	2.63	51	11.83
juni	56	6.93	.	.	.	.	56	6.71	41	9.51
juli	61	7.55	.	.	.	.	61	7.31	71	16.47
augustus	109	13.49	.	.	.	.	109	13.05	41	9.51
september	88	10.89	.	.	.	.	88	10.54	24	5.57
oktober	126	15.59	.	.	.	.	126	15.09	50	11.60
november	118	14.60	.	.	.	.	118	14.13	43	9.98
december	68	8.42	.	.	.	.	68	8.14	40	9.28
onbekend	8	0.99	.	.	.	.	8	0.96		
<b>TOTAAL</b>	<b>808</b>	<b>100.00</b>	<b>23</b>	<b>100.00</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>835</b>	<b>100.00</b>	<b>431</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3.4a:

Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>										
SOA-onderzoek	139	33.17	115	27.71	.	.	254	30.46	178	41.30
HIV-test	162	38.66	179	43.13	.	.	341	40.89	105	24.36
beide	65	15.51	52	12.53	.	.	117	14.03	12	2.78
onbekend	53	12.65	69	16.63	.	.	122	14.63	136	31.55
<b>TOTAAL</b>	<b>419</b>	<b>100.00</b>	<b>415</b>	<b>100.00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>834</b>	<b>100.00</b>	<b>431</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1998	totaal 1997
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, geen HIV test						
geen SOA onderzoek, HIV positief	2	.	.	3	5	15
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	13	.	5	18	111
SOA positief, geen HIV test	246	301	67	106	720	287
SOA positief, HIV positief	1	.	.	1	2	3
SOA positief, HIV negatief	1	.	1	.	2	15
SOA negatief, geen HIV test	5	27	49	7	88	.
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	.	.	.	.	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>255</b>	<b>341</b>	<b>117</b>	<b>122</b>	<b>835</b>	<b>431</b>

Tabel 3.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1998		Totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>										
<14										
15-19	17	4.06	47	11.33	.	.	64	7.67	35	8.12
20-24	68	16.23	122	29.4	.	.	190	22.78	88	20.42
25-29	95	22.67	117	28.19	.	.	212	25.42	102	23.67
30-34	81	19.33	45	10.84	.	.	126	15.11	74	17.17
35-39	49	11.69	28	6.75	.	.	77	9.23	52	12.06
40-44	37	8.83	29	6.99	.	.	66	7.91	25	5.80
45-54	50	11.93	18	4.34	.	.	68	8.15	34	7.89
>54	16	3.82	7	1.69	.	.	23	2.76	21	4.87
??	6	1.43	2	0.48	.	.	8	0.96	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>419</b>	<b>100.00</b>	<b>415</b>	<b>100.00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>834</b>	<b>100.00</b>	<b>431</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>										
Nederland	247	58.95	249	60.00	.	.	496	59.47	.	.
Turkije	22	5.25	7	1.69	.	.	29	3.48	.	.
Marokko	24	5.73	4	0.96	.	.	28	3.36	.	.
Sur./ Ant./ Aru.	73	17.42	66	15.90	.	.	139	16.67	.	.
overig	26	6.21	43	10.36	.	.	69	8.27	428	99.30
onbekend	27	6.44	46	11.08	.	.	73	8.75	3	0.70
<b>TOTAAL</b>	<b>419</b>	<b>100.00</b>	<b>415</b>	<b>100.00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>834</b>	<b>100.00</b>	<b>431</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	346	82.58	.	.
homoseksueel	48	11.46	.	.
biseksueel	20	4.77	.	.
onbekend	5	1.19	213	100.00
<b>TOTAAL</b>	<b>419</b>	<b>100.00</b>	<b>213</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>										
prostituë(e)	8	2.48	45	13.85	.	.	53	8.19	26	6.03
prostituante(e)	61	18.94	1	0.31	.	.	62	9.58	25	5.80
geen van beide	246	76.40	274	84.31	.	.	520	80.37	276	64.04
onbekend	7	2.17	5	1.54	.	.	12	1.85	104	24.13
<b>TOTAAL</b>	<b>322</b>	<b>100.00</b>	<b>325</b>	<b>100.00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>647</b>	<b>100.00</b>	<b>305</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>										
ja, ooit een SOA	44	10.50	21	5.06	.	.	65	7.79	52	12.06
ja, ooit twee SOA	61	14.56	43	10.36	.	.	104	12.47	10	2.32
nee	74	17.66	92	22.17	.	.	166	19.90	.	.
onbekend	240	57.28	259	62.41	.	.	499	59.83	369	85.61
<b>TOTAAL</b>	<b>419</b>	<b>100.00</b>	<b>415</b>	<b>100.00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>834</b>	<b>100.00</b>	<b>431</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

DIAGNOSE	mannen		vrouwen		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Gonorrhoe (excl.PVG)	42	9.3	12	2.7	.	.	54	6.0	43	9.0
Gonorrhoe: PVG	3	0.7	1	0.2	.	.	4	0.4	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primair	14	3.1	7	1.6	.	.	21	2.3	18	3.8
" : secundair	2	0.4	5	1.1	.	.	7	0.8	8	1.7
" : latens recens	22	4.9	15	3.4	.	.	37	4.1	23	4.8
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	47	10.4	72	16.1	.	.	119	13.3	83	17.3
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	.	.	.	.	.	.	39	8.1
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : recidief	16	3.6	12	2.7	.	.	28	3.1	.	.
Genitale wratten	47	10.4	50	11.2	.	.	97	10.8	72	15.0
Hepatitis B: acuut	15	3.3	4	0.9	.	.	19	2.1	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	7	1.6	1	0.2	.	.	8	0.9	10	2.1
Bacteriele Vaginose	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Trichomoniasis	3	0.7	22	4.9	.	.	25	2.8	29	6.0
Candidiasis	3	0.7	1	0.2	.	.	4	0.4	5	1.0
Schaamluis	2	0.4	.	.	.	.	2	0.2	4	0.8
Scabies	3	0.7	.	.	.	.	3	0.3	2	0.4
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	175	38.9	179	40.0	.	.	354	39.5	.	.
PID	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	7	1.6	.	.	.	.	7	0.8	18	3.8
<i>gediagnostiseerde infecties</i>									354	73.8
HIV -	2	0.4	18	4.0	.	.	20	2.2	126	26.3
Nihil *	40	8.9	48	10.7	.	.	88	9.8	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>450</b>	<b>100</b>	<b>447</b>	<b>100</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>897</b>	<b>100</b>	<b>480</b>	<b>100</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 3.13a:

Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#
Gonorroë	.	.	.	.	6	13.3	8	17.8	12	26.7	11	24.4	3	6.7	3	6.7	1	2.2	1	2.2	45
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	3	18.8	5	31.3	1	6.3	2	12.5	4	25.0	1	6.3	.	.	16
Chlamydia	.	.	1	2.1	9	19.1	11	23.4	11	23.4	7	14.9	2	4.3	2	4.3	3	6.4	1	2.1	47
Herpes genitalis	.	.	2	12.5	1	6.3	1	6.3	3	18.8	4	25.0	2	12.5	3	18.8	.	.	.	.	16
genitale wratten	.	.	2	4.3	12	25.5	11	23.4	9	19.1	6	12.8	1	2.1	3	6.4	3	6.4	.	.	47
overig	.	.	10	4.3	37	16.1	49	21.3	40	17.4	23	10.0	26	11.3	33	14.3	9	3.9	3	1.3	230
HIV+	.	.	1	14.3	.	.	1	14.3	1	14.3	2	28.6	1	14.3	1	14.3	.	.	.	.	7
Nihil *	.	.	2	4.8	6	14.3	17	40.5	6	14.3	2	4.8	4	9.5	4	9.5	.	.	1	2.4	42
<b>TOTAAL</b>	.	.	18	4.0	71	15.8	101	22.4	87	19.3	56	12.4	41	9.1	53	11.8	17	3.8	6	1.3	450

Tabel 3.13b:

Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	4	30.8	4	30.8	3	23.1	1	7.7	.	.	1	7.7	.	.	.	.	.	.	13	
Syf.: Pr. & S.	.	.	1	8.3	2	16.7	3	25.0	1	8.3	1	8.3	2	16.7	1	8.3	1	8.3	.	.	12	
Chlamydia	.	.	8	11.1	28	38.9	21	29.2	10	13.9	1	1.4	2	2.8	.	.	1	1.4	1	1.4	72	
herpes genitalis	.	.	2	16.7	3	25.0	2	16.7	2	16.7	1	8.3	.	.	.	.	1	8.3	1	8.3	12	
genitale wratten	.	.	11	22.0	6	12.0	17	34.0	8	16.0	3	6.0	.	.	4	8.0	1	2.0	.	.	50	
overig	.	.	20	9.0	58	26.1	63	28.4	23	10.4	22	9.9	21	9.5	11	5.0	4	1.8	.	.	222	
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	.	.	7	10.9	27	42.2	17	26.6	4	6.3	2	3.1	5	7.8	2	3.1	.	.	.	.	64	
<b>TOTAAL</b>	.	.	53	11.9	128	28.8	126	28.3	49	11.0	30	6.7	31	7.0	18	4.0	8	1.8	2	0.4	445	

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 3.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	27	46.6	1	1.7	5	8.6	16	27.6	5	8.6	4	6.9	58
Syfilis: Prim. & Sec.	11	39.3	1	3.6	3	10.7	6	21.4	5	17.9	2	7.1	28
Chlamydia infectie	58	48.3	6	5.0	3	2.5	25	20.8	9	8.5	19	15.8	120
Herpes genitalis	18	64.3	.	.	.	.	7	25.0	1	3.6	2	7.1	28
Genitale wratten	67	69.1	3	3.1	7	7.2	9	9.3	6	6.2	5	5.2	97
Overig	277	61.3	15	3.3	12	2.7	64	14.2	43	9.5	41	9.1	452
HIV+	3	42.9	1	14.3	.	.	2	28.6	.	.	1	14.3	7
Nihil	68	64.2	4	3.8	1	0.9	20	18.9	6	5.7	7	6.6	106
<b>TOTAAL</b>	529	59.0	31	3.5	31	3.5	149	16.6	75	8.4	81	9.0	896

Tabel 3.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	32	71.1	10	22.2	3	6.7	.	.	45
Syfilis: Prim. & Sec.	15	93.8	1	6.3	.	.	.	.	16
Chlamydia infectie	39	83.7	5	10.6	3	6.4	.	.	47
Herpes genitalis	14	87.5	2	12.5	.	.	.	.	16
Genitale wratten	38	80.9	8	17.0	1	2.1	.	.	47
Overig	194	84.3	21	9.1	11	4.8	4	1.7	230
HIV+	4	57.1	3	42.9	.	.	.	.	7
Nihil	33	78.6	5	11.9	3	7.1	1	2.4	42
<b>TOTAAL</b>	369	82.0	55	12.2	21	4.7	5	1.1	450

Tabel 3.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituant		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	5	17.9	20	71.4	3	10.7	28
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	9	64.3	5	35.7	.	.	14
Chlamydia infectie	.	.	9	22.5	31	77.5	.	.	40
Herpes genitalis	.	.	3	20.0	11	73.3	1	6.7	15
Genitale wratten	.	.	5	13.5	31	83.8	1	2.7	37
Overig	7	4.2	23	13.9	133	80.6	2	1.2	165
HIV+	.	.	.	.	5	100.0	.	.	5
Nihil	1	2.4	12	28.6	28	66.7	1	2.4	42
<b>TOTAAL</b>	8	2.3	66	19.1	264	76.3	8	2.3	346

Tabel 3.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituée		prostituante		geen van beide		onbekend		Totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	1	12.5	.	.	7	87.5	.	.	8
Syfilis: Prim. & Sec.	5	45.5	1	9.1	5	45.5	.	.	11
Chlamydia infectie	8	13.8	.	.	49	84.5	1	1.7	58
Herpes genitalis	1	10.0	.	.	8	80.0	1	10.0	10
Genitale wratten	3	7.7	1	2.6	35	89.7	.	.	39
Overig	23	14.2	.	.	137	84.6	2	1.2	162
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	8	12.9	.	.	52	83.9	2	3.2	62
<b>TOTAAL</b>	49	14.0	2	0.6	293	83.7	6	1.7	350

Tabel 3.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>							
Gonorrhoe	19	32.8	16	27.6	23	39.7	58
Syfilis: Prim. & Sec.	6	21.4	9	32.1	13	46.4	28
Chlamydia infectie	19	15.8	48	40.0	53	44.2	120
Herpes genitalis	6	21.4	12	42.9	10	35.7	28
Genitale wratten	25	25.8	31	32.0	41	42.3	97
Overig	88	19.5	41	9.1	323	71.5	452
HIV+	.	.	7	100.0	.	.	7
Nihil	22	20.8	18	17.0	66	62.3	106
<b>TOTAAL</b>	185	20.6	182	20.3	529	59.0	896



#### **4: GGD Arnhem**

Tabel 4.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	117	20.53	41	60.29	51	45.95	209	27.72	189	26.73
vrouw	453	79.47	27	39.71	60	54.05	540	72.28	518	73.27
onbekend									.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>570</b>	<b>100.00</b>	<b>68</b>	<b>100.00</b>	<b>111</b>	<b>100.00</b>	<b>749</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	41	7.19	15	22.06	4	3.60	60	8.01	63	8.91
februari	37	6.49	8	11.76	4	3.60	49	6.54	68	9.62
maart	46	8.07	6	8.82	11	9.91	63	8.41	52	7.36
april	57	10.00	3	4.41	11	9.91	71	9.48	51	7.21
mei	35	6.14	5	7.35	7	6.31	47	6.28	52	7.36
juni	59	10.35	8	11.76	22	19.82	89	11.88	59	8.35
juli	63	11.05	2	2.94	7	6.31	72	9.61	61	8.63
augustus	46	8.07	12	17.65	8	7.21	66	8.81	65	9.19
september	50	8.77	1	1.47	5	4.50	56	7.48	61	8.63
oktober	58	10.18	1	1.47	4	3.60	63	8.41	61	8.63
november	39	6.84	2	2.94	13	11.71	54	7.21	66	9.34
december	39	6.84	5	7.35	15	13.51	59	7.88	48	6.79
<b>TOTAAL</b>	<b>570</b>	<b>100.00</b>	<b>68</b>	<b>100.00</b>	<b>111</b>	<b>100.00</b>	<b>749</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>										
SOA-onderzoek	117	55.98	450	83.33			567	75.70	539	76.24
HIV-test	41	19.62	27	5.00			68	9.08	120	16.97
Beide	51	24.40	62	11.48			113	15.09	48	6.79
Onbekend			1	0.19			1	0.13		
<b>TOTAAL</b>	<b>209</b>	<b>100.00</b>	<b>539</b>	<b>100.00</b>			<b>749</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1998	totaal 1997
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	.	.	.	1
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	68	.	.	68	118
SOA positief, geen HIV test	197	.	2	1	200	128
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	.	11	.	11	6
SOA negatief, geen HIV test	369	.	1	.	370	411
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	1	.	99	.	100	43
<b>TOTAAL</b>	<b>567</b>	<b>68</b>	<b>113</b>	<b>1</b>	<b>749</b>	<b>707</b>

Tabel 4.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14							1	0.14
15-19	8	3.83	43	7.96	51	6.81	61	8.63
20-24	32	15.31	205	37.96	237	31.64	190	26.87
25-29	48	22.97	130	24.07	178	23.77	173	24.47
30-34	38	18.18	76	14.07	114	15.22	118	16.69
35-39	33	15.79	45	8.33	78	10.41	44	6.22
40-44	14	6.70	20	3.70	34	4.54	44	6.22
45-54	27	12.92	17	3.15	44	5.87	56	7.92
>54	9	4.31	3	0.56	12	1.60	19	2.69
??			1	0.19	1	0.13	1	0.14
<b>TOTAAL</b>	<b>209</b>	<b>100.00</b>	<b>540</b>	<b>100.00</b>	<b>749</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	176	84.21	343	63.52	519	69.29	517	73.13
Turkije	1	0.48	2	0.37	3	0.40	2	0.28
Marokko	2	0.96	5	0.93	7	0.93	12	1.70
Sur./ Ant./ Aru.	10	4.78	16	2.96	26	3.47	29	4.10
overig	12	5.74	149	27.59	161	21.50	127	17.96
onbekend	8	3.83	25	4.63	33	4.41	20	2.83
<b>TOTAAL</b>	<b>209</b>	<b>100.00</b>	<b>540</b>	<b>100.00</b>	<b>749</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	157	75.12	151	79.89
homoseksueel	37	17.70	28	14.81
biseksueel	13	6.22	6	3.17
onbekend	2	0.96	4	2.12
<b>TOTAAL</b>	<b>209</b>	<b>100.00</b>	<b>189</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostituté(e)	3	1.44	356	66.05	359	47.99	342	48.37
prostituant(e)	31	14.83	.	.	31	4.14	18	2.55
geen van beide	169	80.86	178	33.02	347	46.39	327	46.25
onbekend	6	2.87	5	0.93	11	1.47	20	2.83
<b>TOTAAL</b>	<b>209</b>	<b>100.00</b>	<b>539</b>	<b>100.00</b>	<b>748</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	.	.	.	.	.	.	179	25.32
ja, ooit twee SOA	33	15.79	148	27.41	181	24.17	.	.
nee	149	71.29	298	55.19	447	59.68	464	65.63
onbekend	27	12.92	94	17.41	121	16.15	64	9.05
<b>TOTAAL</b>	<b>209</b>	<b>100.00</b>	<b>540</b>	<b>100.00</b>	<b>749</b>	<b>100.00</b>	<b>707</b>	<b>100.00</b>

Tabel 4.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

DIAGNOSE	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Gonorroë (excl.PVG)	5	2.3	13	2.2	18	2.3	15	2.1
Gonorroë: PVG							1	0.1
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	2	0.3	2	0.3	2	0.3
" : primair							2	0.3
" : secundair							.	.
" : latens recens	.	.	1	0.2	1	0.1	.	.
" : latens tarda							.	.
Chlamydia infectie	22	10.2	37	6.4	59	7.4	43	5.9
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	1	0.5	1	0.2	2	0.3	.	.
" : primo:HSV-type1&2							.	.
" : primo: HSV type 1							.	.
" : primo: HSV type 2							.	.
" : recidief							.	.
Genitale wratten	1	0.5	5	0.9	6	0.8	17	2.3
Hepatitis B: acuut							.	.
Hepatitis B: chronisch							.	.
Niet Specifieke Urethritis	1	0.5	.	.	1	0.1	4	0.6
Bacteriele Vaginose	.	.	119	20.5	119	14.9	43	5.9
Trichomoniasis	.	.	1	0.2	1	0.1	.	.
Candidiasis	.	.	29	5.0	29	3.6	14	1.9
Schaamluis	.	.	1	0.2	1	0.1	.	.
Scabies	2	0.9	.	.	2	0.3	.	.
Ulcus molle							.	.
Granuloma inguinale							.	.
Overig/ niet gespecificeerd	1	0.5	5	0.9	6	0.8	11	1.5
PID							.	.
HIV +							1	0.1
<i>gediagnostiseerde infecties</i>							153	20.9
HIV -	92	42.6	87	15.0	179	22.5	167	22.9
Nihil *	91	42.1	279	48.1	370	46.5	411	56.2
<b>TOTAAL</b>	<b>216</b>	<b>100</b>	<b>580</b>	<b>100</b>	<b>796</b>	<b>100</b>	<b>731</b>	<b>100</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 4.13a:  
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal #	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorrhoe	.	.	2	40.0	1	20.0	.	.	1	20.0	.	.	1	20.0	.	.	.	.	.	.	.	5
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	3	13.6	5	22.7	6	27.3	4	18.2	2	9.1	1	4.5	.	.	1	4.5	.	.	.	22
herpes genitalis	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
genitale wratten	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Overig	.	.	.	.	2	50.0	.	.	1	25.0	.	.	1	25.0	.	.	.	.	.	.	.	4
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	.	.	5	2.8	25	13.9	40	22.2	34	18.9	29	16.1	13	7.2	26	14.4	8	4.4	.	.	.	180
<b>TOTAAL</b>	.	.	10	4.7	32	15.0	48	22.5	39	18.3	33	15.5	15	7.0	27	12.7	9	4.2	.	.	.	213

Tabel 4.13b:  
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		Totaal #	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorrhoe	.	.	.	.	7	53.8	5	38.5	1	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	9	24.3	20	54.1	6	16.2	1	2.7	1	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37
herpes genitalis	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
genitale wratten	.	.	2	40.0	2	40.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	20.0	.	.	.	.	.	5
overig	.	.	14	8.9	65	41.1	33	20.9	19	12.0	15	9.5	5	3.2	6	3.8	1	0.6	.	.	.	158
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	.	.	26	7.3	122	34.1	92	25.7	58	16.2	29	8.1	15	4.2	13	3.6	2	0.6	1	0.3	.	358
<b>TOTAAL</b>	.	.	49	8.6	217	37.9	138	24.1	79	13.8	45	7.9	20	3.5	20	3.5	3	0.5	1	0.2	.	572

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 4.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	N
<b>DIAGNOSE</b>														
Gonorrhoe	14	77.8	.	.	.	.	3	16.7	1	5.6	.	.		18
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.
Chlamydia infectie	38	64.4	1	1.7	.	.	6	10.2	12	20.3	2	3.4		59
Herpes genitalis	1	50.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.		2
Genitale wratten	6	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		6
Overig	100	61.7	2	1.2	1	0.6	6	3.7	47	29.0	6	3.7		162
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.
Nihil	384	71.4	1	0.2	6	1.1	14	2.6	105	19.5	28	5.2		538
<b>TOTAAL</b>	543	69.2	4	0.5	7	0.9	29	3.7	166	21.1	36	4.6		785

Tabel 4.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	3	60.0	2	40.0	.	.	.	.	5
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	17	77.3	4	18.2	1	4.5	.	.	22
Herpes genitalis	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Genitale wratten	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
Overig	3	75.0	1	25.0	.	.	.	.	4
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	135	75.0	31	17.2	12	6.7	.	.	180
<b>TOTAAL</b>	159	74.6	39	18.3	13	6.1	2	0.9	213

Tabel 4.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	1	20.0	1	20.0	3	60.0	.	.	5
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	1	4.5	2	9.1	19	86.4	.	.	22
Herpes genitalis	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Genitale wratten	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Overig	.	.	.	.	3	75.0	1	25.0	4
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	2	1.1	28	15.6	145	80.6	5	2.8	180
<b>TOTAAL</b>	4	1.9	31	14.6	172	80.8	6	2.8	213

Tabel 4.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	8	61.5	.	.	5	38.5	.	.	13
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	20	55.6	.	.	16	44.4	.	.	36
Herpes genitalis	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Genitale wratten	3	60.0	.	.	2	40.0	.	.	5
Overig	117	74.1	.	.	41	25.9	.	.	158
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	228	63.7	.	.	125	34.9	5	1.4	358
<b>TOTAAL</b>	377	66.0	.	.	189	33.1	5	0.9	571

Tabel 4.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>							
Gonorrhoe	6	33.3	8	44.4	4	22.2	18
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	13	22.0	39	66.1	7	11.9	59
Herpes genitalis	.	.	2	100.0	.	.	2
Genitale wratten	2	33.3	4	66.7	.	.	6
Overig	54	33.3	88	54.3	20	12.3	162
HIV+	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	120	22.3	324	60.2	94	17.5	538
<b>TOTAAL</b>	195	24.8	465	59.2	125	15.9	785



## **5: GGD regio Nijmegen**

Tabel 5.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	253	44.62	63	49.61	1	9.09	317	44.96	307	38.28
vrouw	314	55.38	64	50.39	10	90.91	388	55.04	495	61.72
<b>TOTAAL</b>	<b>567</b>	<b>100.00</b>	<b>127</b>	<b>100.00</b>	<b>11</b>	<b>100.00</b>	<b>705</b>	<b>100.00</b>	<b>802</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	61	10.59	13	10.24	2	18.18	76	10.64	63	7.85
februari	35	6.08	10	7.87	1	9.09	46	6.44	60	7.47
maart	48	8.33	14	11.02	2	18.18	64	8.96	59	7.35
april	38	6.60	12	9.45	.	.	50	7.00	62	7.72
mei	30	5.21	10	7.87	1	9.09	41	5.74	79	9.84
juni	57	9.90	9	7.09	.	.	66	9.24	73	9.09
juli	35	6.08	12	9.45	1	9.09	48	6.72	76	9.46
augustus	52	9.03	9	7.09	1	9.09	62	8.68	52	6.48
september	60	10.42	15	11.81	.	.	75	10.50	64	7.97
oktober	55	9.55	7	5.51	2	18.18	64	8.96	75	9.34
november	59	10.24	9	7.09	1	9.09	69	9.66	79	9.84
december	45	7.81	7	5.51	.	.	52	7.28	61	7.60
onbekend	1	0.17	.	.	.	.	1	0.14	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>576</b>	<b>100.00</b>	<b>127</b>	<b>100.00</b>	<b>11</b>	<b>100.00</b>	<b>714</b>	<b>100.00</b>	<b>803</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>								
SOA-onderzoek	252	79.50	315	81.19	567	80.43	597	74.44
HIV-test	63	19.87	61	15.72	124	17.59	197	24.56
beide	2	0.63	11	2.84	13	1.84	4	0.50
onbekend	.	.	1	0.26	1	0.14	4	0.50
<b>TOTAAL</b>	<b>317</b>	<b>100.00</b>	<b>388</b>	<b>100.00</b>	<b>705</b>	<b>100.00</b>	<b>802</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA				totaal	totaal
	onderzoek	HIV test	beide	onbekend	1998	1997
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	.	.	.	3
geen SOA onderzoek, HIV negatief	4	123	.	.	127	193
SOA positief, geen HIV test	220	.	2	1	223	187
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	.	.	.	.	1
SOA negatief, geen HIV test	351	1	1	.	353	417
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	1	.	8	.	9	2
<b>TOTAAL</b>	<b>576</b>	<b>124</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>714</b>	<b>803</b>

Tabel 5.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	2	0.63	5	1.29	7	0.99	8	1.00
15-19	13	4.10	43	11.08	56	7.94	51	6.34
20-24	54	17.03	122	31.44	176	24.96	217	26.99
25-29	78	24.61	95	24.48	173	24.54	209	26.00
30-34	52	16.40	46	11.86	98	13.90	116	14.43
35-39	39	12.30	38	9.79	77	10.92	83	10.35
40-44	17	5.36	24	6.19	41	5.82	51	6.36
45-54	40	12.62	11	2.84	51	7.23	50	6.23
>54	21	6.62	3	0.77	24	3.40	16	2.00
??	1	0.32	1	0.26	2	0.28	3	0.37
<b>TOTAAL</b>	<b>317</b>	<b>100.00</b>	<b>388</b>	<b>100.00</b>	<b>705</b>	<b>100.00</b>	<b>802</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	268	84.54	296	76.29	564	800.00	618	77.06
Turkije	3	0.95	.	.	3	0.43	9	1.12
Marokko	3	0.95	2	0.52	5	0.71	6	0.75
Sur./ Ant./ Aru.	5	1.58	5	1.29	10	1.42	12	1.50
overig	37	11.67	85	21.91	122	17.30	156	19.45
onbekend	1	0.32	.	.	1	0.14	1	0.12
<b>TOTAAL</b>	<b>317</b>	<b>100.00</b>	<b>388</b>	<b>100.00</b>	<b>705</b>	<b>100.00</b>	<b>802</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	243	76.66	251	81.76
homoseksueel	51	16.09	40	13.03
biseksueel	23	7.26	14	4.56
onbekend	.	.	2	0.65
<b>TOTAAL</b>	<b>317</b>	<b>100.00</b>	<b>307</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitu�e(e)	3	0.95	95	24.48	98	13.92	173	21.57
prostituant(e)	36	11.39	.	.	36	5.11	43	5.36
geen van beide	274	86.71	291	75.00	565	80.26	582	72.57
onbekend	3	0.95	2	0.52	5	0.71	4	0.50
<b>TOTAAL</b>	<b>316</b>	<b>100.00</b>	<b>388</b>	<b>100.00</b>	<b>704</b>	<b>100.00</b>	<b>802</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	1	0.32	3	0.77	4	0.57	126	15.71
ja, ooit twee SOA	46	14.51	56	14.43	102	14.47	.	.
nee	262	82.65	324	83.51	586	83.12	646	80.55
onbekend	8	2.52	5	1.29	13	1.84	30	3.74
<b>TOTAAL</b>	<b>317</b>	<b>100.00</b>	<b>388</b>	<b>100.00</b>	<b>705</b>	<b>100.00</b>	<b>802</b>	<b>100.00</b>

Tabel 5.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

DIAGNOSE	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Gonorroë (excl.PVG)	10	3.1	2	0.5	12	1.6	3	0.4
Gonorroë: PVG	2	0.6	.	.	2	0.3	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	5	0.6
" : primair	1	0.3	.	.	1	0.1	.	.
" : secundair	.	.	.	.	.	.	2	0.2
" : latens recens	1	0.3	12	2.9	13	1.8	3	0.4
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	18	5.6	30	7.3	48	6.5	51	6.2
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	2	0.6	.	.	2	0.3	3	0.4
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	1	0.2	1	0.1	2	0.2
" : primo: HSV type 2	6	1.9	1	0.2	7	1.0	2	0.2
" : recidief	1	0.3	1	0.2	2	0.3	1	0.1
Genitale wratten	10	3.1	8	2.0	18	2.5	15	1.8
Hepatitis B: acuut	1	0.3	.	.	1	0.1	2	0.2
Hepatitis B: chronisch	1	0.3	1	0.2	2	0.3	1	0.1
Niet Specifieke Urethritis	3	0.9	5	1.2	8	1.1	11	1.3
Bacteriele Vaginose	2	0.6	44	10.7	46	6.3	38	4.6
Trichomoniasis	3	0.9	.	.	3	0.4	.	.
Candidiasis	10	3.1	49	12.0	59	8.0	55	6.7
Schaamluis	1	0.3	1	0.2	2	0.3	4	0.5
Scabies	.	.	.	.	.	.	1	0.1
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	13	0.4	8	2.0	21	2.9	5	0.6
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	.	.	.	.	.	.	3	0.4
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>85</i>	<i>26.2</i>	<i>163</i>	<i>39.8</i>	<i>248</i>	<i>33.8</i>	<i>207</i>	<i>25.2</i>
HIV -	64	19.8	74	18.0	138	18.8	196	23.9
Nihil *	175	54.0	173	42.2	348	47.4	417	50.9
<b>TOTAAL</b>	<b>324</b>	<b>100</b>	<b>410</b>	<b>100</b>	<b>734</b>	<b>100</b>	<b>820</b>	<b>100</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 5.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	1	8.3	1	8.3	.	.	2	16.7	2	16.7	1	8.3	2	16.7	3	25.0	.	.	12	
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
Chlamydia	.	.	.	.	4	22.2	5	27.8	4	22.2	1	5.6	1	5.6	1	5.6	2	11.1	.	.	18	
herpes genitalis	.	.	1	11.1	.	.	2	22.2	.	.	2	22.2	.	.	2	22.2	2	22.2	.	.	9	
genitale wratten	1	10.0	1	10.0	3	30.0	1	10.0	2	20.0	1	10.0	1	10.0	.	.	.	.	.	.	10	
overig	.	.	1	2.9	8	22.9	2	5.7	7	20.0	3	8.6	2	5.7	9	25.7	3	8.6	.	.	35	
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	1	0.4	9	3.8	39	16.3	69	28.9	39	16.3	31	13.0	12	5.0	26	10.9	12	5.0	1	0.4	239	
<b>TOTAAL</b>	<b>2</b>	<b>0.6</b>	<b>13</b>	<b>4.0</b>	<b>55</b>	<b>17.0</b>	<b>80</b>	<b>24.7</b>	<b>54</b>	<b>16.7</b>	<b>40</b>	<b>12.3</b>	<b>17</b>	<b>5.2</b>	<b>40</b>	<b>12.3</b>	<b>22</b>	<b>6.8</b>	<b>1</b>	<b>0.3</b>	<b>324</b>	

Tabel 5.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	.	.	2	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	7	23.3	15	50.0	5	16.7	1	3.3	2	6.7	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	1	33.3	1	33.3	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	3
genitale wratten	.	.	1	12.5	1	12.5	5	62.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12.5	.	.	.	8
overig	2	1.7	17	14.2	40	33.3	23	19.2	8	6.7	13	10.8	8	6.7	6	5.0	3	2.5	.	.	120	
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	3	1.2	23	9.4	73	29.8	65	26.5	36	14.7	23	9.4	15	6.1	5	2.0	1	0.4	1	0.4	245	
<b>TOTAAL</b>	<b>5</b>	<b>1.2</b>	<b>48</b>	<b>11.8</b>	<b>131</b>	<b>32.1</b>	<b>98</b>	<b>24.0</b>	<b>46</b>	<b>11.3</b>	<b>39</b>	<b>9.6</b>	<b>24</b>	<b>5.9</b>	<b>11</b>	<b>2.7</b>	<b>5</b>	<b>1.2</b>	<b>1</b>	<b>0.2</b>	<b>408</b>	

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 5.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	13	86.7	.	.	.	.	1	6.7	1	6.7	.	.	15
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	41	83.7	.	.	2	4.1	2	4.1	4	8.2	.	.	49
Herpes genitalis	12	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
Genitale wratten	13	72.2	.	.	.	.	.	.	5	27.8	.	.	18
Overig	111	70.3	.	.	3	1.9	.	.	44	27.8	.	.	158
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	404	82.6	3	0.6	1	0.2	7	1.4	73	14.9	1	0.2	489
<b>TOTAAL</b>	594	80.1	3	0.4	6	0.8	10	1.3	128	17.3	1	0.1	742

Tabel 5.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	4	33.3	7	58.3	1	8.3			12
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	.	.			1
Chlamydia infectie	14	77.8	4	22.2	.	.			18
Herpes genitalis	6	66.7	2	22.2	1	11.1			9
Genitale wratten	7	70.0	3	30.0	.	.			10
Overig	26	74.3	7	20.0	2	5.7			35
HIV+	.	.	.	.	.	.			.
Nihil	188	78.7	32	13.4	19	7.9			239
<b>TOTAAL</b>	246	75.9	55	17.0	23	7.1			324

Tabel 5.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	.	.	1	8.3	11	91.7	.	.	12
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	.	.	.	.	18	100.0	.	.	18
Herpes genitalis	.	.	.	.	9	100.0	.	.	9
Genitale wratten	.	.	.	.	10	100.0	.	.	12
Overig	.	.	6	17.1	29	82.9	.	.	35
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	3	1.3	29	12.2	20.	85.3	3	1.3	238
<b>TOTAAL</b>	3	0.9	36	11.1	281	87.0	3	0.9	323

Tabel 5.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitutée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	.	.			2	100.0	.	.	2
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.			.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	1	3.3			29	96.7	.	.	30
Herpes genitalis	.	.			2	66.7	1	33.3	3
Genitale wratten	1	12.5			7	87.5	.	.	8
Overig	45	37.5			74	61.7	1	0.8	120
HIV+	.	.			.	.	.	.	.
Nihil	51	20.8			194	79.2	.	.	245
<b>TOTAAL</b>	98	24.0			308	75.5	2	0.5	408

Tabel 5.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>							
Gonorrhoe	8	53.3	6	40.0	1	6.7	15
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	7	14.3	41	83.7	1	2.0	49
Herpes genitalis	6	50.0	6	50.0	.	.	12
Genitale wratten	4	22.2	14	77.8	.	.	18
Overig	31	19.6	124	78.5	3	1.9	158
HIV+	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	58	11.9	422	86.3	9	1.8	489
<b>TOTAAL</b>	115	15.5	613	82.6	14	1.9	742



## 6: GGD Den Haag

Tabel 6.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	136	52.11	38	66.67	12	52.17	186	54.55	213	62.28
vrouw	125	47.89	19	33.33	11	47.83	155	45.45	129	37.72
<b>TOTAAL</b>	<b>261</b>	<b>100.00</b>	<b>57</b>	<b>100.00</b>	<b>23</b>	<b>100.00</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>

Tabel 6.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	19	7.20	3	5.26	1	4.53	23	6.69	27	7.89
februari	11	4.17	7	12.28	.	.	18	5.23	17	4.97
maart	25	9.47	6	10.53	.	.	31	9.01	21	6.14
april	14	5.30	3	5.26	.	.	17	4.94	34	9.94
mei	34	12.88	4	7.02	2	8.70	40	11.63	24	7.02
juni	30	11.36	3	5.26	3	13.04	36	10.47	15	4.39
juli	29	10.98	5	8.77	2	8.70	36	10.47	36	10.53
augustus	26	9.85	3	5.26	3	13.04	32	9.30	42	12.28
september	23	8.71	3	5.26	.	.	26	7.56	29	8.48
oktober	10	3.79	2	3.51	3	13.04	15	4.36	34	9.94
november	18	6.82	6	10.53	1	4.35	25	7.27	33	9.65
december	25	9.47	9	15.79	8	34.78	42	12.21	30	8.77
onbekend	.	.	3	5.26	.	.	3	0.87	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>264</b>	<b>100.00</b>	<b>57</b>	<b>100.00</b>	<b>23</b>	<b>100.00</b>	<b>344</b>	<b>100.00</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>

Tabel 6.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>								
SOA-onderzoek	128	68.82	112	72.26	240	70.38	236	69.01
HIV-test	38	20.43	21	13.55	59	17.30	52	15.20
beide	19	10.22	21	13.55	40	11.73	50	14.62
onbekend	1	0.54	1	0.65	2	0.59	4	1.17
<b>TOTAAL</b>	<b>186</b>	<b>100.00</b>	<b>155</b>	<b>100.00</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>

Tabel 6.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1998	totaal 1997
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	1	.	.	1	.
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	55	1	.	56	40
SOA positief, geen HIV test	189	.	4	2	195	224
SOA positief, HIV positief	.	.	3	.	3	.
SOA positief, HIV negatief	53	3	13	.	69	76
SOA negatief, geen HIV test	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV positief	1	.	19	.	20	2
SOA negatief, HIV negatief	.	.	.	.	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>243</b>	<b>59</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>344</b>	<b>342</b>

Tabel 6.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	2	1.08	2	1.29	4	1.17	1	0.29
15-19	9	4.84	19	12.26	28	8.21	17	4.97
20-24	30	16.13	37	23.87	67	19.65	75	21.93
25-29	57	30.65	37	23.87	94	27.57	72	21.05
30-34	26	13.98	24	15.48	50	14.66	62	18.13
35-39	16	8.60	14	9.03	30	8.80	50	14.62
40-44	17	9.14	7	4.52	24	7.04	31	9.06
45-54	24	12.90	11	7.10	35	10.26	20	5.85
>54	1	0.54	3	1.94	4	1.17	6	1.75
??	4	2.15	1	0.65	5	1.47	8	2.34
<b>TOTAAL</b>	<b>186</b>	<b>100.00</b>	<b>155</b>	<b>100.00</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>

Tabel 6.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	103	55.38	104	67.10	207	60.70	231	67.54
Turkije	18	9.68	4	2.58	22	6.45	28	8.19
Marokko	10	5.38	2	1.29	12	3.52	9	2.63
Sur./ Ant./ Aru.	23	12.37	10	6.45	33	9.68	32	9.36
overig	26	13.98	31	20.00	57	16.72	37	10.82
onbekend	6	3.23	4	2.58	10	2.93	5	1.46
<b>TOTAAL</b>	<b>186</b>	<b>100.00</b>	<b>155</b>	<b>100.00</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>

Tabel 6.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	155	83.33	176	82.63
homoseksueel	25	13.44	34	15.96
biseksueel	3	1.61	3	1.41
onbekend	3	1.61	.	.
<b>TOTAAL</b>	186	100.00	213	100.00

Tabel 6.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitu�e(e)	2	1.14	24	16.67	26	8.13	15	4.57
prostituant(e)	40	22.73	.	.	40	12.50	46	14.02
geen van beide	123	69.89	114	79.17	237	74.06	264	80.48
onbekend	11	6.25	6	4.17	17	5.31	3	0.91
<b>TOTAAL</b>	176	100.00	144	100.00	320	100.00	328	100.00

Tabel 6.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	3	1.61	1	0.65	4	1.17	58	16.96
ja, ooit twee SOA	44	23.66	31	20.00	75	21.99	.	.
nee	108	58.06	96	61.94	204	59.82	243	71.05
onbekend	31	16.67	27	17.42	58	17.01	41	11.99
<b>TOTAAL</b>	186	100.00	155	100.00	341	100.00	342	100.00

Tabel 6.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>								
Gonorroë (excl.PVG)	12	6.0	4	2.3	16	4.3	35	9.4
Gonorroë: PVG							.	
Syfilis: niet gespecificeerd	5	2.5	3	1.7	8	2.2	4	1.1
" : primair	4	2.0	.	.	4	1.1	9	2.4
" : secundair	1	0.5	2	1.2	3	0.8	2	0.5
" : latens recens	.	.	3	1.7	3	0.8	3	0.8
" : latens tarda	5	2.5	3	1.7	8	2.2	1	0.3
Chlamydia infectie	26	13.0	29	16.9	55	14.8	69	18.6
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	5	2.5	4	2.3	9	2.4	8	2.2
" : primo:HSV-type1&2	.	.	1	0.6	1	0.3	.	.
" : primo: HSV type 1	1	0.5	2	1.2	3	0.8	.	.
" : primo: HSV type 2	4	2.0	4	2.3	8	2.2	1	0.3
" : recidief	1	0.5	2	1.2	3	0.8	4	1.1
Genitale wratten	12	6.0	14	8.1	26	7.0	26	7.0
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	1	0.3
Niet Specifieke Urethritis	34	17.0	4	2.3	38	10.2	41	11.0
Bacteriele Vaginose	.	.	7	4.1	7	1.9	8	2.2
Trichomoniasis	1	0.5	.	.	1	0.3	1	0.3
Candidiasis	2	1.0	20	11.6	22	5.9	21	5.7
Schaamluis	.	.	.	.	.	.	4	1.1
Scabies	3	1.5	1	0.6	4	1.1	7	1.9
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	2	1.0	3	1.7	5	1.3	5	1.3
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	1	0.5	.	.	1	0.3	.	.
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	119	59.5	106	61.6	225	60.5	250	67.2
HIV -	49	24.5	30	17.4	79	21.2	42	11.3
Nihil *	32	16.0	36	20.9	68	18.3	80	21.5
<b>TOTAAL</b>	200	100	172	100	372	100	372	100

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 6.13a:  
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	1	8.3	3	25.0	4	33.3	1	8.3	.	.	2	16.7	1	8.3	.	.	.	.	.	12
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	40.0	1	20.0	2	40.0	.	.	.	.	.	5
Chlamydia	1	3.8	2	7.7	3	11.5	13	50.0	4	15.4	1	3.8	1	3.8	1	3.8	.	.	.	.	.	26
herpes genitalis	.	.	1	9.1	4	36.4	3	27.3	3	27.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
genitale wratten	.	.	2	16.7	4	33.3	4	33.3	.	.	1	8.3	.	.	1	8.3	.	.	.	.	.	12
overig	.	.	1	1.9	4	7.7	19	36.5	8	15.4	4	7.7	7	13.5	9	17.3	.	.	.	.	.	52
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	1
Nihil *	1	1.3	4	5.0	13	16.3	21	26.3	11	13.8	9	11.3	6	7.5	11	13.8	1	1.3	3	3.8	80	
<b>TOTAAL</b>	<b>2</b>	<b>1.0</b>	<b>11</b>	<b>5.5</b>	<b>31</b>	<b>15.6</b>	<b>64</b>	<b>32.2</b>	<b>27</b>	<b>13.6</b>	<b>17</b>	<b>8.5</b>	<b>17</b>	<b>8.5</b>	<b>25</b>	<b>12.6</b>	<b>1</b>	<b>0.5</b>	<b>4</b>	<b>2.0</b>	<b>199</b>	

Tabel 6.13b:  
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	.	.	2	50.0	1	25.0	.	.	.	.	1	25.0	.	.	.	.	.	.	.	4
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Chlamydia	.	.	5	17.2	8	27.6	6	20.7	2	6.9	5	17.2	1	3.4	1	3.4	.	.	.	1	3.4	29
herpes genitalis	.	.	2	15.4	1	7.7	7	53.8	1	7.7	.	.	1	7.7	1	7.7	.	.	.	.	.	13
genitale wratten	1	7.1	2	14.3	3	21.4	4	28.6	3	21.4	.	.	1	7.1	.	.	.	.	.	.	.	14
overig	.	.	6	13.6	10	22.7	11	25.0	7	15.9	5	11.4	2	4.5	2	4.5	1	2.3	.	.	.	44
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	1	1.6	6	9.4	19	29.7	11	17.2	12	18.8	5	7.8	1	1.6	7	10.9	2	3.1	.	.	64	
<b>TOTAAL</b>	<b>2</b>	<b>1.2</b>	<b>21</b>	<b>12.4</b>	<b>44</b>	<b>25.9</b>	<b>40</b>	<b>23.5</b>	<b>26</b>	<b>15.3</b>	<b>15</b>	<b>8.8</b>	<b>7</b>	<b>4.1</b>	<b>11</b>	<b>6.5</b>	<b>3</b>	<b>1.8</b>	<b>1</b>	<b>0.6</b>	<b>170</b>	

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 6.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	12	70.6	.	.	.	.	1	5.9	3	17.6	1	5.9	17
Syfilis: Prim. & Sec.	3	42.9	1	14.3	1	14.3	2	28.6	.	.	.	.	7
Chlamydia infectie	21	38.2	7	12.7	5	9.1	9	16.4	11	20.0	2	3.6	55
Herpes genitalis	19	76.0	3	12.0	.	.	1	4.0	1	4.0	1	4.0	25
Genitale wratten	14	53.8	3	11.5	1	3.8	3	11.5	5	19.2	.	.	26
Overig	47	49.0	6	6.3	2	2.1	13	13.5	26	27.1	2	2.1	96
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	101	69.7	4	2.8	4	2.8	8	5.5	22	15.2	6	4.1	145
<b>TOTAAL</b>	217	58.3	24	6.5	13	3.5	37	9.9	69	18.5	12	3.2	372

Tabel 6.15:  
Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	4	3.3	1	8.3	7	58.3	.	.	12
Syfilis: Prim. & Sec.	4	80.0	.	.	.	.	1	20.0	5
Chlamydia infectie	26	100.0	.	.	.	.	.	.	26
Herpes genitalis	10	90.9	1	9.1	.	.	.	.	11
Genitale wratten	12	100.0	.	.	.	.	.	.	12
Overig	42	80.8	8	15.4	1	1.9	1	1.9	52
HIV+	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
Nihil	69	86.3	9	11.3	1	1.3	1	1.3	80
<b>TOTAAL</b>	167	83.9	26	13.1	3	1.5	3	1.5	199

Tabel 6.16a:  
Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituë		prostituunt		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	1	9.1	3	27.3	7	63.6	.	.	11
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	5	100.0	.	.	.	.	5
Chlamydia infectie	.	.	3	11.5	22	84.6	1	3.8	26
Herpes genitalis	1	10.0	.	.	9	90.0	.	.	10
Genitale wratten	.	.	4	33.3	7	58.3	1	8.3	12
Overig	.	.	14	28.0	33	66.0	3	6.0	50
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	.	.	13	17.6	55	74.3	6	8.1	74
<b>TOTAAL</b>	2	1.1	42	22.2	134	70.9	11	5.8	189

Tabel 6.16b:  
Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituëe		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	1	33.3	.	.	2	66.7	.	.	3
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	1	50.0	1	50.0	2
Chlamydia infectie	5	20.0	.	.	18	72.0	2	8.0	25
Herpes genitalis	.	.	.	.	13	10.0	.	.	13
Genitale wratten	2	14.3	.	.	12	85.7	.	.	14
Overig	11	26.2	.	.	28	66.7	3	7.1	42
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	11	18.6	.	.	47	79.7	1	1.7	59
<b>TOTAAL</b>	30	19.0	.	.	121	76.6	7	4.4	158

Tabel 6.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>							
Gonorroë	8	47.1	3	17.6	6	35.3	17
Syfilis: Prim. & Sec.	2	28.6	3	42.9	2	28.6	7
Chlamydia infectie	21	38.2	25	45.5	9	16.4	55
Herpes genitalis	8	32.0	17	68.0	.	.	25
Genitale wratten	7	26.9	17	65.4	2	7.7	26
Overig	20	20.8	56	58.3	20	20.8	96
HIV+	1	100.0	.	.	.	.	1
Nihil	21	14.5	99	68.3	25	17.2	145
<b>TOTAAL</b>	<b>88</b>	<b>23.7</b>	<b>220</b>	<b>59.1</b>	<b>64</b>	<b>17.2</b>	<b>372</b>



## **7: GGD Midden Brabant**

Tabel 7.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	257	48.22	85	55.92	.	.	342	49.93	341	54.04
vrouw	276	51.78	67	44.08	.	.	343	50.07	290	45.96
<b>TOTAAL</b>	<b>533</b>	<b>100.00</b>	<b>152</b>	<b>100.00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>685</b>	<b>100.00</b>	<b>631</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	41	7.68	17	11.11	.	.	58	8.44	64	10.13
februari	52	9.74	8	5.23	.	.	60	8.73	48	7.59
maart	34	6.37	9	5.88	.	.	43	6.26	46	7.28
april	36	6.74	15	9.80	.	.	51	7.42	41	6.49
mei	33	6.18	16	10.46	.	.	49	7.13	42	6.65
juni	43	8.05	11	7.19	.	.	54	7.86	45	7.12
juli	56	10.49	8	5.23	.	.	64	9.32	67	10.60
augustus	38	7.12	14	9.15	.	.	52	7.57	45	7.12
september	51	9.55	9	5.88	.	.	60	8.73	62	9.81
oktober	60	11.24	15	9.80	.	.	75	10.92	62	9.81
november	55	10.30	11	7.19	.	.	66	9.61	50	7.91
december	33	6.18	20	13.07	.	.	53	7.71	60	9.49
onbekend	2	0.37	.	.	.	.	2	0.29	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>534</b>	<b>100.00</b>	<b>153</b>	<b>100.00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>687</b>	<b>100.00</b>	<b>632</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>								
SOA-onderzoek	256	74.85	276	80.47	532	77.66	464	73.53
HIV-test	85	24.85	65	18.95	150	21.90	166	26.31
beide	.	.	.	.	.	.	.	.
onbekend	1	0.29	2	0.58	3	0.44	1	0.16
<b>TOTAAL</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>	<b>343</b>	<b>100.00</b>	<b>685</b>	<b>100.00</b>	<b>631</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1998	totaal 1997
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.					.
geen SOA onderzoek, HIV negatief		151	.	2	153	167
SOA positief, geen HIV test	176	.	.	1	177	133
SOA positief, HIV positief						.
SOA positief, HIV negatief						.
SOA negatief, geen HIV test						332
SOA negatief, HIV positief						.
SOA negatief, HIV negatief	357	.	.	.	357	.
<b>TOTAAL</b>	<b>533</b>	<b>151</b>	<b>.</b>	<b>3</b>	<b>687</b>	<b>632</b>

Tabel 7.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	.	.	1	0.29	1	0.15	5	0.79
15-19	14	4.09	49	14.29	63	9.20	60	9.51
20-24	82	23.98	128	37.32	210	30.66	145	22.98
25-29	80	23.39	79	23.03	159	23.21	149	23.61
30-34	62	18.13	35	10.20	97	14.16	116	18.38
35-39	36	10.53	20	5.83	56	8.18	69	10.94
40-44	20	5.85	15	4.37	35	5.11	27	4.28
45-54	32	9.36	8	2.33	40	5.84	43	6.81
>54	13	3.80	3	0.87	16	2.34	17	2.69
??	3	0.88	5	1.46	8	1.17	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>	<b>343</b>	<b>100.00</b>	<b>685</b>	<b>100.00</b>	<b>631</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	274	80.12	280	81.36	554	80.88	509	80.67
Turkije	8	2.34	2	0.58	10	1.46	9	1.43
Marokko	6	1.75	.	.	6	0.88	10	1.58
Sur./ Ant./ Aru.	16	4.68	18	5.25	34	4.96	26	4.12
overig	33	9.65	38	11.08	71	10.36	74	11.73
onbekend	5	1.46	5	1.46	10	1.46	3	0.48
<b>TOTAAL</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>	<b>343</b>	<b>100.00</b>	<b>685</b>	<b>100.00</b>	<b>631</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	289	84.50	305	89.44
homoseksueel	33	9.65	19	5.57
biseksueel	15	4.39	16	4.69
onbekend	5	1.46	1	0.29
<b>TOTAAL</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitu�e(e)	.	.	22	6.45	22	3.23	23	3.66
prostituant(e)	43	12.61	.	.	43	6.30	32	5.09
geen van beide	295	86.51	318	93.26	613	89.88	573	91.10
onbekend	3	0.88	1	0.29	4	0.59	1	0.16
<b>TOTAAL</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>	<b>682</b>	<b>100.00</b>	<b>629</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	1	0.29	.	.	1	0.15	137	21.71
ja, ooit twee SOA	77	22.51	45	13.12	122	17.81	.	.
nee	259	75.73	287	83.67	546	79.71	487	77.18
onbekend	5	1.46	11	3.21	16	2.34	7	1.11
<b>TOTAAL</b>	<b>342</b>	<b>100.00</b>	<b>343</b>	<b>100.00</b>	<b>685</b>	<b>100.00</b>	<b>631</b>	<b>100.00</b>

Tabel 7.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>								
Gonorroë (excl.PVG)	6	1.7	.	.	6	0.9	5	0.8
Gonorroë: PVG	4	1.2	.	.	4	0.6	2	0.3
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primair	1	0.3	1	0.3	2	0.3	5	0.8
" : secundair	.	.	.	.	.	.	1	0.2
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	40	11.7	58	16.8	98	14.2	50	7.9
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	2	0.3
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	2	0.3
" : recidief	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	8	2.3	2	0.6	10	1.5	11	1.7
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	13	3.8	2	0.6	15	2.2	13	2.0
Bacteriele Vaginose	.	.	8	2.3	8	1.2	18	2.8
Trichomoniasis	.	.	3	0.9	3	0.4	5	0.8
Candidiasis	6	1.7	27	7.8	33	4.8	24	3.8
Schaamluis	1	0.3	.	.	1	0.1	1	0.2
Scabies	.	.	.	.	.	.	.	.
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	79	23.0	101	29.2	180	26.1	139	21.8
HIV -	85	24.8	67	19.4	152	22.1	166	26.1
Nihil *	179	52.2	178	51.4	357	51.8	332	52.1
<b>TOTAAL</b>	343	100	346	100	689	100	637	100

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 7.13a:  
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal #	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorroë	.	.	.	.	1	10.0	1	10.0	2	20.0	1	10.0	1	10.0	2	20.0	1	10.0	.	.	.	10
Syf.: Pr. & S.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia	.	.	.	.	7	17.5	20	50.0	5	12.5	5	12.5	1	2.5	2	5.0	.	.	.	.	.	40
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
genitale wratten	.	.	.	.	1	12.5	1	12.5	3	37.5	1	12.5	1	12.5	1	12.5	.	.	.	.	.	8
overig	.	.	3	15.0	.	.	6	30.0	4	20.0	2	10.0	3	15.0	1	5.0	.	.	1	5.0	.	20
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	.	.	10	3.8	73	27.7	52	19.7	48	18.2	26	9.8	14	5.3	27	10.2	12	4.5	2	0.8	.	264
<b>TOTAAL</b>	.	.	14	1.4	82	23.9	80	23.3	62	18.1	36	10.5	20	5.8	33	9.6	13	3.8	3	0.9	.	343

Tabel 7.13b:  
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal #	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia	.	.	7	12.1	30	51.7	13	22.4	8	13.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
genitale wratten	.	.	.	.	2	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
overig	.	.	6	15.0	21	52.5	5	12.5	1	2.5	2	5.0	3	7.5	1	2.5	.	.	1	2.5	40	
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	1	0.4	36	14.7	78	31.8	60	24.5	26	10.6	18	7.3	12	4.9	7	2.9	3	1.2	4	1.6	245	
<b>TOTAAL</b>	1	0.3	49	14.2	131	37.9	79	22.8	35	10.1	20	5.8	15	4.3	8	2.3	3	0.9	5	1.4	.	346

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 7.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		Totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	8	72.7	.	.	.	.	1	9.1	2	18.2	.	.	11
Syfilis: Prim. & Sec.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	50.0	2
Chlamydia infectie	78	79.6	2	2.0	.	.	6	6.1	8	8.2	4	4.1	98
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	9	90.0	.	.	.	.	1	10.0	.	.	.	.	10
Overig	43	71.7	.	.	3	5.0	7	11.7	5	8.3	2	3.3	60
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	420	82.4	8	1.6	3	0.6	20	3.9	56	11.0	3	0.6	510
<b>TOTAAL</b>	559	80.9	10	1.4	6	0.9	35	5.1	71	10.3	10	1.4	691

Tabel 7.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	30.0	7	70.0	.	.	.	.	10
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	38	95.0	1	2.5	1	2.5	.	.	40
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	5	62.5	2	25.0	1	12.5	.	.	8
Overig	19	95.0	1	5.0	.	.	.	.	20
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	223	84.5	22	8.3	14	5.3	5	1.9	264
<b>TOTAAL</b>	289	84.3	33	9.6	16	4.7	5	1.5	343

Tabel 7.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	3	30.0	7	70.0	.	.	.	.	10
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	3	7.5	36	90.0	1	2.5	.	.	40
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	.	.	8	100.0	.	.	.	.	8
Overig	1	5.0	19	95.0	.	.	.	.	20
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	36	13.7	225	85.6	2	0.8	.	.	263
<b>TOTAAL</b>	43	12.6	296	86.5	3	0.9	.	.	342

Tabel 7.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituante		geen van beide		onbekend		Totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	.	.	.	.	57	100.0	.	.	57
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Overig	1	2.5	.	.	39	97.5	.	.	40
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	21	8.6	.	.	222	91.0	1	0.4	244
<b>TOTAAL</b>	22	6.4	.	.	321	93.3	1	0.3	344

Tabel 7.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>							
Gonorrhoe	7	63.6	3	27.3	1	9.1	11
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	2	100.0	.	.	2
Chlamydia infectie	19	19.4	76	77.6	3	3.1	98
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	2	20.0	8	80.0	.	.	10
Overig	8	13.3	51	85.0	1	1.7	60
HIV+	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	89	17.5	410	80.4	11	2.2	510
<b>TOTAAL</b>	125	18.1	550	79.6	16	2.3	691



**8: GGD Groningen Stad en Ommelanden**

Tabel 8.2:

Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	223	49.34	3	100.00	39	45.35	265	48.98	299	48.62
vrouw	229	50.66	.	.	47	54.65	276	51.02	316	51.38
<b>TOTAAL</b>	<b>452</b>	<b>100.00</b>	<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>86</b>	<b>100.00</b>	<b>541</b>	<b>100.00</b>	<b>615</b>	<b>100.00</b>

Tabel 8.3:

Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	13	2.86	.	.	7	8.14	20	3.68	52	8.44
februari	40	8.81	.	.	7	8.14	47	8.66	42	6.82
maart	68	14.98	1	33.33	10	11.63	79	14.55	55	8.93
april	31	6.83	.	.	4	4.65	35	6.45	47	7.63
mei	41	9.03	.	.	.	.	41	7.55	26	4.22
juni	36	7.93	.	.	7	8.14	43	7.92	52	8.44
juli	37	8.15	.	.	12	13.95	49	9.02	58	9.42
augustus	36	7.93	.	.	.	.	36	6.63	55	8.93
september	65	14.32	1	33.33	8	9.30	74	13.63	76	12.34
oktober	24	5.29	1	33.33	10	11.63	35	6.45	62	10.06
november	28	6.17	.	.	10	11.63	38	7.00	53	8.60
december	33	7.27	.	.	11	12.79	44	8.10	37	6.01
onbekend	2	0.44	.	.	.	.	2	0.37	1	0.16
<b>TOTAAL</b>	<b>454</b>	<b>100.00</b>	<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>86</b>	<b>100.00</b>	<b>543</b>	<b>100.00</b>	<b>616</b>	<b>100.00</b>

Tabel 8.4a:

Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>								
SOA-onderzoek	193	72.83	185	67.03	378	69.87	476	77.40
HIV-test	2	0.75	3	1.09	5	0.92	3	0.49
beide	63	23.77	80	28.99	143	26.43	129	20.98
onbekend	7	2.64	8	2.90	15	2.77	7	1.14
<b>TOTAAL</b>	<b>265</b>	<b>100.00</b>	<b>276</b>	<b>100.00</b>	<b>541</b>	<b>100.00</b>	<b>615</b>	<b>100.00</b>

Tabel 8.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1998	totaal 1997
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	2	.	.	.	2	.
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	1	.	.	1	1
SOA positief, geen HIV test	127	1	11	9	148	200
SOA positief, HIV positief	1	.	.	.	1	1
SOA positief, HIV negatief	1	.	8	.	9	10
SOA negatief, geen HIV test	246	2	54	4	306	308
SOA negatief, HIV positief	1	.	.	1	2	.
SOA negatief, HIV negatief	1	1	71	1	74	96
<b>TOTAAL</b>	<b>379</b>	<b>5</b>	<b>144</b>	<b>15</b>	<b>543</b>	<b>616</b>

Tabel 8.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	3	1.13	6	2.17	9	1.66	1	0.16
15-19	10	3.77	37	13.41	47	8.69	52	8.46
20-24	48	18.11	96	34.78	144	26.02	173	28.13
25-29	55	20.75	58	21.01	113	20.89	123	20.00
30-34	28	10.57	31	11.23	59	10.91	87	14.15
35-39	45	16.98	17	6.16	62	11.46	53	8.62
40-44	28	10.57	17	6.16	45	8.32	43	6.99
45-54	32	12.08	9	3.26	41	7.58	58	9.43
>54	15	5.66	3	1.09	18	33.33	19	3.09
??	1	0.38	2	0.72	3	0.55	6	0.98
<b>TOTAAL</b>	<b>265</b>	<b>100.00</b>	<b>276</b>	<b>100.00</b>	<b>541</b>	<b>100.00</b>	<b>615</b>	<b>100.00</b>

Tabel 8.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	211	79.62	240	86.96	451	83.36	497	80.81
Turkije	3	1.13	.	.	3	0.55	6	0.98
Marokko	1	0.38	.	.	1	0.18	3	0.49
Sur./ Ant./ Aru.	11	4.15	3	1.09	14	2.59	25	4.07
overig	34	12.83	28	10.14	62	11.46	73	11.87
onbekend	5	1.89	5	1.81	10	1.85	11	1.79
<b>TOTAAL</b>	<b>265</b>	<b>100.00</b>	<b>276</b>	<b>100.00</b>	<b>541</b>	<b>100.00</b>	<b>615</b>	<b>100.00</b>

Tabel 8.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	190	71.70	244	81.61
homoseksueel	52	19.62	33	11.04
biseksueel	13	4.91	9	3.01
onbekend	10	3.77	13	4.35
<b>TOTAAL</b>	<b>265</b>	<b>100.00</b>	<b>299</b>	<b>100.00</b>

Tabel 8.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitu�e(e)	2	0.77	47	17.03	49	9.12	55	9.11
prostituant(e)	24	9.20	.	.	24	4.47	37	6.13
geen van beide	215	82.38	214	77.54	429	79.89	469	77.64
onbekend	20	7.66	15	5.43	35	6.52	43	7.12
<b>TOTAAL</b>	<b>261</b>	<b>100.00</b>	<b>276</b>	<b>100.00</b>	<b>537</b>	<b>100.00</b>	<b>604</b>	<b>100.00</b>

Tabel 8.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	4	1.51	1	0.36	5	0.92	163	26.50
ja, ooit twee SOA	77	29.06	68	24.64	145	26.80	.	.
nee	141	53.21	167	60.51	308	56.93	350	56.91
onbekend	43	16.23	40	14.49	83	15.34	102	16.59
<b>TOTAAL</b>	<b>265</b>	<b>100.00</b>	<b>276</b>	<b>100.00</b>	<b>541</b>	<b>100.00</b>	<b>615</b>	<b>100.00</b>

Tabel 8.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

DIAGNOSE	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Gonorroë (excl.PVG)	5	1.8	5	1.7	10	1.8	21	3.3
Gonorroë: PVG							1	0.2
Syfilis: niet gespecificeerd	1	0.4	1	0.3	2	0.4	5	0.8
" : primair	2	0.7	1	0.3	3	0.5	3	0.5
" : secundair	1	0.4	.	.	1	0.2	2	0.3
" : latens recens							2	0.3
" : latens tarda	1	0.4	1	0.3	2	0.4	4	0.6
Chlamydia infectie	19	7.0	28	9.4	47	8.2	91	14.0
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	3	1.1	2	0.7	5	0.9	3	0.5
" : primo:HSV-type1&2							.	.
" : primo: HSV type 1	4	1.5	1	0.3	5	0.9	2	0.3
" : primo: HSV type 2	3	1.1	3	1.0	6	1.1	5	0.8
" : recidief	.	.	2	0.7	2	0.4	3	0.5
Genitale wratten	20	7.3	25	8.4	45	7.9	34	5.3
Hepatitis B: acuut							.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	1	0.3	1	0.2	.	.
Niet Specifieke Urethritis	5	1.8	.	.	5	0.9	8	1.2
Bacteriele Vaginose	.	.	8	2.7	8	1.4	16	2.5
Trichomoniasis	.	.	2	0.7	2	0.4	3	0.5
Candidiasis	3	1.1	5	1.7	8	1.4	20	3.1
Schaamluis	.	.	2	0.7	2	0.4	1	0.2
Scabies	12	4.4	6	2.0	18	3.2	4	0.6
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	3	1.1	1	0.3	4	0.7	2	0.3
PID	.	.	.	.	.	.	2	0.3
HIV +	4	1.5	1	0.3	5	0.9	1	0.2
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>86</i>	<i>31.5</i>	<i>95</i>	<i>32.0</i>	<i>181</i>	<i>31.8</i>	<i>233</i>	<i>36.0</i>
HIV -	38	13.9	46	15.5	84	14.7	107	16.5
Nihil *	149	54.6	156	52.6	305	53.5	308	47.5
<b>TOTAAL</b>	<b>273</b>	<b>100.0</b>	<b>297</b>	<b>100.0</b>	<b>570</b>	<b>100.0</b>	<b>648</b>	<b>100.0</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 8.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	.	.	.	.	1	20.0	2	40.0	.	.	.	.	1	20.0	.	.	1	20.0	.	.	.	5
Syf.: Pr. & S.	.	.	1	33.3	.	.	.	.	.	.	1	33.3	.	.	.	.	1	33.3	.	.	.	3
Chlamydia	.	.	.	.	5	26.3	7	36.8	1	5.3	2	10.5	4	21.1	.	.	.	.	.	.	.	19
herpes genitalis	.	.	.	.	4	40.0	.	.	2	20.0	3	30.0	.	.	.	.	1	10.0	.	.	.	10
genitale wratten	.	.	.	.	2	10.0	7	35.0	1	5.0	8	40.0	2	10.0	.	.	.	.	.	.	.	20
overig	1	4.0	1	4.0	5	20.0	3	12.0	2	8.0	3	12.0	1	4.0	6	24.0	3	12.0	.	.	.	25
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	25.0	1	25.0	1	25.0	.	.	1	25.0	.	.	.	4
Nihil *	2	1.1	8	4.4	31	16.9	37	20.2	21	11.5	28	15.3	20	10.9	27	14.8	8	4.4	1	0.5	.	183
<b>TOTAAL</b>	<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>10</b>	<b>3.7</b>	<b>48</b>	<b>17.8</b>	<b>56</b>	<b>20.8</b>	<b>28</b>	<b>10.4</b>	<b>46</b>	<b>17.1</b>	<b>29</b>	<b>10.8</b>	<b>33</b>	<b>12.3</b>	<b>15</b>	<b>5.6</b>	<b>1</b>	<b>0.4</b>	<b>.</b>	<b>269</b>

Tabel 8.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

DIAGNOSE	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
Gonorroë	1	20.0	3	60.0	1	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
Syf.: Pr. & S.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia	1	3.6	5	17.9	11	39.3	6	21.4	1	3.6	1	3.6	1	3.6	1	3.6	.	.	1	3.6	.	28
herpes genitalis	.	.	4	50.0	1	12.5	2	25.0	1	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
genitale wratten	1	4.0	2	8.0	11	44.0	3	12.0	3	12.0	3	12.0	2	8.0	.	.	.	.	.	.	.	25
overig	.	.	3	11.0	9	33.3	4	14.8	4	14.8	4	14.8	.	.	2	7.4	1	3.7	.	.	.	27
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	4	2.0	23	11.7	66	33.5	45	22.8	24	12.2	12	6.1	14	7.1	6	3.0	2	1.0	1	0.5	.	197
<b>TOTAAL</b>	<b>7</b>	<b>2.4</b>	<b>41</b>	<b>14.0</b>	<b>99</b>	<b>33.9</b>	<b>60</b>	<b>20.5</b>	<b>34</b>	<b>11.6</b>	<b>20</b>	<b>6.8</b>	<b>17</b>	<b>5.8</b>	<b>9</b>	<b>3.1</b>	<b>3</b>	<b>1.0</b>	<b>2</b>	<b>0.7</b>	<b>.</b>	<b>292</b>

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 8.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	9	81.8	.	.	.	.	.	.	1	9.1	1	9.1	11
Syfilis: Prim. & Sec.	3	75.0	.	.	.	.	.	.	1	25.0	.	.	4
Chlamydia infectie	38	80.9	.	.	.	.	2	4.3	5	10.6	2	4.3	47
Herpes genitalis	16	88.9	1	5.6	.	.	.	.	.	.	1	5.6	18
Genitale wratten	38	84.4	.	.	.	.	2	4.4	5	11.1	.	.	45
Overig	43	82.7	1	1.9	.	.	2	3.8	5	9.6	1	1.9	52
HIV+	3	60.0	.	.	.	.	.	.	2	40.0	.	.	5
Nihil	319	83.7	1	0.3	1	0.3	9	2.4	46	12.1	5	1.3	381
<b>TOTAAL</b>	469	83.3	3	0.5	1	0.2	15	2.7	65	11.5	10	1.8	563

Tabel 8.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	3	60.0	.	.	1	20.0	1	20.0	5
Syfilis: Prim. & Sec.	2	66.7	1	33.3	.	.	.	.	3
Chlamydia infectie	16	84.2	1	5.3	1	5.3	1	5.3	19
Herpes genitalis	10	100.0	.	.	.	.	.	.	10
Genitale wratten	10	50.0	9	45.0	1	5.0	.	.	20
Overig	14	56.0	7	28.0	.	.	4	16.0	25
HIV+	.	.	4	100.0	.	.	.	.	4
Nihil	136	74.3	32	17.5	11	6.0	4	2.2	183
<b>TOTAAL</b>	191	71.0	54	20.1	14	5.2	10	3.7	269

Tabel 8.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituuant		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	1	25.0	3	75.0	.	.	4
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	2
Chlamydia infectie	.	.	3	15.8	14	73.7	2	10.5	19
Herpes genitalis	.	.	1	10.0	9	90.0	.	.	10
Genitale wratten	.	.	.	.	19	100.0	.	.	19
Overig	.	.	.	.	20	80.0	5	20.0	25
HIV+	.	.	.	.	2	66.7	1	33.3	3
Nihil	2	1.1	18	9.9	150	82.4	12	6.6	182
<b>TOTAAL</b>	2	0.8	24	9.1	218	82.6	20	7.6	264

Tabel 8.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitutée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	1	20.0	.	.	4	80.0	.	.	5
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	3	10.7	.	.	21	75.0	4	14.3	28
Herpes genitalis	1	12.5	.	.	7	87.5	.	.	8
Genitale wratten	5	20.0	.	.	18	72.0	2	8.0	25
Overig	8	29.6	.	.	19	70.4	.	.	27
HIV+	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Nihil	33	16.8	.	.	155	78.7	9	4.6	197
<b>TOTAAL</b>	53	18.2	.	.	224	76.7	15	5.1	292

Tabel 8.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>							
Gonorrhoe	2	18.2	7	63.6	2	18.2	11
Syfilis: Prim. & Sec.	2	50.0	1	25.0	1	25.0	4
Chlamydia infectie	15	31.9	25	53.2	7	14.9	47
Herpes genitalis	3	16.7	14	77.8	1	5.6	18
Genitale wratten	19	42.2	19	42.2	7	15.6	45
Overig	12	23.1	32	61.5	8	15.4	52
HIV+	4	80.0	.	.	1	20.0	5
Nihil	99	26.0	224	58.8	58	15.2	381
<b>TOTAAL</b>	156	27.7	322	57.2	85	15.1	563



## **9: GGD Noord Kennemerland**

Tabel 9.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	72	28.24	51	53.13	20	15.38	143	29.73	136	32.30
vrouw	183	71.76	45	46.88	110	84.26	338	70.27	285	67.70
<b>TOTAAL</b>	<b>255</b>	<b>100.00</b>	<b>96</b>	<b>100.00</b>	<b>130</b>	<b>100.00</b>	<b>481</b>		<b>421</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	17	6.67	10	10.42	5	3.85	32	6.65	39	9.26
februari	17	6.67	11	11.46	2	1.54	30	6.24	16	3.80
maart	15	5.88	9	9.38	12	9.23	36	7.48	.	.
april	11	4.31	5	5.21	10	7.69	26	5.41	38	9.03
mei	19	7.45	9	9.38	19	14.62	47	9.77	35	8.31
juni	21	8.24	8	8.33	11	8.46	40	8.32	46	10.93
juli	22	8.63	4	4.17	12	9.23	38	7.90	33	7.84
augustus	32	12.55	6	6.25	6	4.62	44	9.15	51	12.11
september	28	10.98	9	9.38	15	11.54	52	10.81	55	13.06
oktober	14	5.49	5	5.21	17	13.08	36	7.48	45	10.69
november	39	15.29	8	8.33	16	12.31	63	13.10	37	8.79
december	19	7.45	12	12.50	5	3.85	36	7.48	26	6.18
onbekend	1	0.39	.	.	.	.	1	0.21	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>255</b>	<b>100.00</b>	<b>96</b>	<b>100.00</b>	<b>130</b>	<b>100.00</b>	<b>481</b>	<b>100.00</b>	<b>421</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>								
SOA-onderzoek	71	49.65	175	51.78	246	51.14	224	53.21
HIV-test	50	34.97	44	13.02	94	19.54	113	26.84
beide	19	13.29	111	32.84	130	27.03	78	18.53
onbekend	3	2.10	8	2.37	11	2.29	6	1.43
<b>TOTAAL</b>	<b>143</b>	<b>100.00</b>	<b>338</b>	<b>100.00</b>	<b>481</b>	<b>100.00</b>	<b>421</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1998	totaal 1997
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief						1
geen SOA onderzoek, HIV negatief		94	1	.	96	113
SOA positief, geen HIV test	86	.	4	4	94	77
SOA positief, HIV positief						.
SOA positief, HIV negatief	.	.	20	.	20	21
SOA negatief, geen HIV test	158	.	.	3	161	155
SOA negatief, HIV positief						.
SOA negatief, HIV negatief	1	.	105	4	110	54
<b>TOTAAL</b>	<b>246</b>	<b>94</b>	<b>130</b>	<b>11</b>	<b>481</b>	<b>421</b>

Tabel 9.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	.	5.59	3	0.89	3	0.62	3	0.71
15-19	8	23.78	29	8.58	37	7.69	44	10.45
20-24	34	24.48	114	33.73	148	30.77	103	24.47
25-29	35	16.08	109	32.25	144	29.94	109	25.89
30-34	23	6.29	38	11.24	61	12.68	57	13.54
35-39	9	9.79	11	3.25	20	4.16	46	10.93
40-44	14	7.69	13	3.85	27	5.61	20	4.75
45-54	11	6.29	18	5.33	29	6.03	33	7.84
>54	9	.	2	0.59	11	2.29	6	1.43
??	.	.	1	0.30	1	0.21	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>143</b>	<b>100.00</b>	<b>338</b>	<b>100.00</b>	<b>481</b>	<b>100.00</b>	<b>421</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	138	96.50	182	53.85	320	66.53	289	68.65
Turkije	.	.	.	.	.	.	1	0.24
Marokko	.	.	1	0.30	1	0.21	2	0.48
Sur./ Ant./ Aru.	.	.	.	.	.	.	.	.
overig	5	3.50	151	44.67	156	32.43	116	27.55
onbekend	.	.	4	1.18	4	0.83	13	3.09
<b>TOTAAL</b>	<b>143</b>	<b>100.00</b>	<b>338</b>	<b>100.00</b>	<b>481</b>	<b>100.00</b>	<b>421</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	123	86.01	120	88.24
homoseksueel	8	5.59	10	7.35
biseksueel	2	1.40	1	0.74
onbekend	10	6.99	5	3.68
<b>TOTAAL</b>	<b>143</b>	<b>100.00</b>	<b>136</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitu�e(e)	.	.	178	52.98	178	37.40	143	34.54
prostituant(e)	9	6.34	2	0.60	11	2.30	27	6.52
geen van beide	111	78.17	149	44.35	260	54.39	234	56.52
onbekend	22	15.49	7	2.08	29	6.07	10	2.41
<b>TOTAAL</b>	<b>142</b>	<b>100.00</b>	<b>336</b>	<b>100.00</b>	<b>478</b>	<b>100.00</b>	<b>414</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	.	.	.	.	.	.	36	8.55.
ja, ooit twee SOA	15	10.49	34	10.06	49	10.19	.	.
nee	88	61.54	131	38.76	219	45.53	175	41.57
onbekend	40	27.97	173	51.18	213	44.28	210	49.88
<b>TOTAAL</b>	<b>143</b>	<b>100.00</b>	<b>338</b>	<b>100.00</b>	<b>481</b>	<b>100.00</b>	<b>421</b>	<b>100.00</b>

Tabel 9.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>								
Gonorroë (excl.PVG)	.	.	6	1.6	6	1.2	7	1.6
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	9	6.1	28	7.6	37	7.2	22	4.9
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	2	0.5	2	0.4	.	.
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	1	0.2
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : recidief	.	.	1	0.3	1	0.2	.	.
Genitale wratten	5	3.4	4	1.1	9	1.7	8	1.8
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	1	0.2
Niet Specifieke Urethritis	.	.	.	.	.	.	1	0.2
Bacteriele Vaginose	3	2.0	11	3.0	14	2.7	3	0.7
Trichomoniasis	.	.	.	.	.	.	.	.
Candidiasis	2	1.4	25	6.8	27	5.2	57	12.8
Schaamluis	.	.	1	0.3	1	0.2	2	0.5
Scabies	.	.	.	.	.	.	.	.
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	14	9.5	17	4.6	31	6.0	1	0.2
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	.	.	.	.	.	.	1	0.2
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	33	22.3	95	25.9	128	24.9	106	23.5
HIV -	71	48.0	155	42.2	226	43.9	188	42.1
Nihil *	44	29.7	117	31.9	161	31.3	155	34.7
<b>TOTAAL</b>	148	100	367	100	515	100	447	100

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 9.13a:  
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorroe																						
Syf.: Pr. & S.																						
Chlamydia	.	.	.	.	1	11.1	3	33.3	3	33.3	.	.	2	22.2	.	.	.	.	.	.	.	9
herpes genitalis																						
genitale wratten	.	.	.	.	2	40.0	1	20.0	1	20.0	.	.	.	.	.	.	1	20.0	.	.	.	5
overig	.	.	2	10.5	2	10.5	9	47.4	3	15.8	1	5.3	.	.	.	.	2	10.5	.	.	.	19
HIV+																						
Nihil *	.	.	6	5.3	30	26.5	24	21.2	16	14.2	8	7.1	12	10.6	11	9.7	6	5.3	.	.	.	113
<b>TOTAAL</b>	.	.	8	5.5	35	24.0	37	25.3	23	15.8	9	6.2	14	9.6	11	7.5	9	6.2	.	.	.	146

Tabel 9.13b:  
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorroe	.	.	2	33.3	3	50.0	1	16.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
Syf.: Pr. & S.																						
Chlamydia	.	.	4	14.3	13	46.4	10	35.7	1	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
herpes genitalis	.	.	.	.	1	33.3	2	66.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
genitale wratten	.	.	1	25.0	1	25.0	1	25.0	.	.	.	.	1	25.0	.	.	.	.	.	.	.	4
overig	.	.	4	7.4	15	27.8	21	38.9	3	5.6	.	.	7	13.0	3	5.6	.	.	1	1.9	.	54
HIV+																						
Nihil *	3	1.2	21	8.3	83	32.7	78	30.7	34	13.4	11	4.3	7	2.8	15	5.9	2	0.8	.	.	.	254
<b>TOTAAL</b>	3	0.9	32	9.2	116	33.2	113	32.4	38	10.9	11	3.2	15	4.3	18	5.2	2	0.6	1	0.3	.	349

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 9.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	3	50.0	.	.	.	.	.	.	3	50.0	.	.	6
Syfilis: Prim. & Sec.			.	.			.	.			.	.	
Chlamydia infectie	22	59.5	.	.	.	.	.	.	15	40.5	.	.	37
Herpes genitalis	3	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Genitale wratten	7	77.8	.	.	.	.	.	.	2	22.2	.	.	9
Overig	53	72.6	.	.	.	.	.	.	20	27.4	.	.	73
HIV+			.	.			.	.					
Nihil	240	65.4	.	.	1	0.3	.	.	122	33.2	4	1.1	367
<b>TOTAAL</b>	328	66.3	.	.	1	0.2	.	.	162	32.7	4	0.8	495

Tabel 9.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe									
Syfilis: Prim. & Sec.									
Chlamydia infectie	7	77.8	2	22.2	.	.	.	.	9
Herpes genitalis									
Genitale wratten	4	80.0	.	.	.	.	1	20.0	5
Overig	14	73.7	1	5.3	1	5.3	3	15.8	19
HIV+									
Nihil	100	88.5	5	4.4	1	0.9	7	6.2	113
<b>TOTAAL</b>	<b>125</b>	<b>85.6</b>	<b>8</b>	<b>5.5</b>	<b>2</b>	<b>1.4</b>	<b>11</b>	<b>7.5</b>	<b>146</b>

Tabel 9.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.							
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.							
Chlamydia infectie	.	.	.	.	6	66.7	3	33.3	9
Herpes genitalis	.	.							
Genitale wratten	.	.	.	.	2	40.0	3	60.0	5
Overig	.	.	.	.	16	84.2	3	15.8	19
HIV+	.	.							
Nihil	.	.	9	8.0	88	78.6	15	13.4	112
<b>TOTAAL</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>9</b>	<b>6.2</b>	<b>112</b>	<b>77.2</b>	<b>24</b>	<b>16.6</b>	<b>145</b>

Tabel 9.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	5	83.3	.	.	1	16.7	.	.	6
Syfilis: Prim. & Sec.									
Chlamydia infectie	16	57.1	1	3.6	11	39.3	.	.	28
Herpes genitalis	.	.	1	33.3	1	33.3	1	33.3	3
Genitale wratten	1	25.0	.	.	3	75.0	.	.	4
Overig	24	44.4	1	1.9	26	48.1	3	5.6	54
HIV+									
Nihil	138	54.8	.	.	111	44.0	3	1.2	252
<b>TOTAAL</b>	<b>184</b>	<b>53.0</b>	<b>.</b>	<b>0.9</b>	<b>153</b>	<b>44.1</b>	<b>7</b>	<b>2.0</b>	<b>347</b>

Tabel 9.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>							
Gonorroë	.	.	2	33.3	4	66.7	6
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.					
Chlamydia infectie	9	24.3	9	24.3	19	51.4	37
Herpes genitalis	1	33.3	1	33.3	1	33.3	3
Genitale wratten	2	22.2	2	22.2	5	55.6	9
Overig	12	16.4	29	39.7	32	43.8	73
HIV+							
Nihil	28	7.6	178	48.5	161	43.9	367
<b>TOTAAL</b>	52	10.5	221	44.6	222	44.8	495



## **10: GGD Leiden e.o.**

Tabel 10.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	30	45.45	121	50.84	1	50.00	152	49.67	219	53.94
vrouw	36	54.55	117	49.16	1	50.00	154	50.33	187	46.06
<b>TOTAAL</b>	<b>66</b>	<b>100.00</b>	<b>238</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>100.00</b>	<b>306</b>	<b>100.00</b>	<b>406</b>	<b>100.00</b>

Tabel 10.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	13	19.70	27	11.30	.	.	40	13.03	36	8.85
februari	8	12.12	22	9.21	.	.	30	9.77	29	7.13
maart	3	4.55	21	8.79	.	.	24	7.82	46	11.30
april	2	3.03	17	7.11	.	.	19	6.19	37	9.09
mei	5	7.58	16	6.69	.	.	21	6.84	37	9.09
juni	8	12.12	33	13.81	.	.	41	13.36	25	6.14
juli	3	4.55	22	9.21	.	.	25	8.14	53	13.02
augustus	10	15.15	19	7.95	.	.	29	9.45	27	6.63
september	8	12.12	15	6.28	.	.	23	7.49	22	5.41
oktober	.	.	14	5.86	1	50.00	15	4.89	34	8.35
november	4	6.06	19	7.95	.	.	23	7.49	30	7.37
december	2	3.03	14	5.86	1	50.00	17	5.54	31	7.62
<b>TOTAAL</b>	<b>66</b>	<b>100.00</b>	<b>239</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>100.00</b>	<b>307</b>	<b>100.00</b>	<b>407</b>	<b>100.00</b>

Tabel 10.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

BEZOEK I.V.M.	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA-onderzoek	29	19.08	36	23.38	65	21.24	93	22.91
HIV-test	117	76.97	111	72.08	228	74.51	297	73.15
beide	2	1.31	5	3.25	7	2.29	5	1.23
onbekend	4	2.63	2	1.30	6	1.96	11	2.71
<b>TOTAAL</b>	<b>152</b>	<b>100.00</b>	<b>16\54</b>	<b>100.00</b>	<b>306</b>	<b>100.00</b>	<b>406</b>	<b>100.00</b>

Tabel 10.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1998	totaal 1997
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	1	.	.	1	2
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	228	5	5	238	309
SOA positief, geen HIV test	20	.	.	.	20	21
SOA positief, HIV positief	.	.	1	.	1	.
SOA positief, HIV negatief	45	.	.	1	46	75
SOA negatief, geen HIV test	.	.	1	.	1	.
SOA negatief, HIV positief	.	.	1	.	1	.
SOA negatief, HIV negatief	.	.	1	.	1	.
<b>TOTAAL</b>	<b>65</b>	<b>229</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>307</b>	<b>407</b>

Tabel 10.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14							2	0.49
15-19	3	1.97	11	7.14	14	4.58	12	2.96
20-24	34	22.37	67	43.51	101	33.01	137	33.74
25-29	47	30.92	37	24.03	84	27.45	109	26.85
30-34	27	17.76	18	11.69	45	14.71	49	12.07
35-39	11	7.24	2	1.30	13	4.25	33	8.13
40-44	10	6.58	8	5.19	18	5.88	24	5.91
45-54	16	10.53	6	3.90	22	7.19	30	7.39
>54	2	1.32	2	1.30	4	1.31	8	1.97
??	2	1.32	3	1.95	5	1.63	2	0.49
<b>TOTAAL</b>	<b>152</b>	<b>100.00</b>	<b>154</b>	<b>100.00</b>	<b>306</b>	<b>100.00</b>	<b>406</b>	<b>100.00</b>

Tabel 10.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	190	71.71	121	78.57	230	75.16	330	81.28
Turkije	2	1.32	4	2.60	6	1.96	2	0.49
Marokko	1	0.66	1	0.65	2	0.65	5	1.23
Sur./ Ant./ Aru.	8	5.26	3	1.95	11	2.59	12	2.96
overig	30	19.74	23	14.94	53	17.32	57	14.04
onbekend	2	1.32	2	1.30	4	1.1	.	.
<b>TOTAAL</b>	<b>152</b>	<b>100.00</b>	<b>154</b>	<b>100.00</b>	<b>306</b>	<b>100.00</b>	<b>406</b>	<b>100.00</b>

Tabel 10.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	120	78.95	192	87.67
homoseksueel	20	13.16	17	7.76
biseksueel	5	3.29	9	4.11
onbekend	7	4.61	1	0.46
<b>TOTAAL</b>	152	100.00	219	100.00

Tabel 10.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitu�e(e)	.	.	4	2.76	4	1.38	4	1.00
prostituante(e)	10	6.94	.	.	10	3.46	17	4.24
geen van beide	128	88.89	136	93.79	264	91.35	370	92.27
onbekend	6	4.17	5	3.45	11	3.81	10	2.49
<b>TOTAAL</b>	144	100.00	145	100.00	289	100.00	401	100.00

Tabel 10.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	1	0.66	1	0.65	2	0.65	69	15.54
ja, ooit twee SOA	21	13.82	28	18.18	49	16.01	5	1.13
nee	119	78.29	118	76.62	237	77.45	340	76.58
onbekend	11	7.24	7	4.55	18	5.88	30	6.76
<b>TOTAAL</b>	152	100.00	154	100.00	306	100.00	444	100.00

Tabel 10.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>DIAGNOSE</b>								
Gonorroë (excl.PVG)	1	0.7	.	.	1	0.3	.	.
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	1	0.2
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	1	0.2
Chlamydia infectie	2	1.3	4	2.6	6	1.9	6	1.5
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	2	1.3	2	0.6	.	.
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : recidief	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	.	.	1	0.6	1	0.3	.	.
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	.	.	.	.	.	.	.	.
Bacteriele Vaginose	.	.	4	2.6	4	1.3	9	2.2
Trichomoniasis	.	.	.	.	.	.	.	.
Candidiasis	.	.	7	4.5	7	2.3	7	1.71
Schaamluis	1	0.7	.	.	1	0.3	.	.
Scabies	.	.	.	.	.	.	.	.
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	.	.	1	0.6	1	0.3	2	0.5
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	4	2.6	19	12.1	23	7.5	26	6.4
HIV -	122	80.3	117	75.0	239	77.6	308	75.3
Nihil *	26	17.1	20	12.8	46	14.9	75	18.3
<b>TOTAAL</b>	152	100	156	100	308	100	409	100

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 10.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal #		
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%			
<b>DIAGNOSE</b>																							
Gonorrhoe			.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Syf.: Pr. & S.																							
Chlamydia			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	.	2	
herpes genitalis																							
genitale wratten																							
overig			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	1	
HIV+																							
Nihil *			3	2.0	34	23.0	46	31.1	27	18.2	11	7.4	9	6.1	15	10.1	1	0.7	2	1.4		148	
<b>TOTAAL</b>			3	2.0	24	22.4	47	30.9	27	17.8	11	7.2	10	6.6	16	10.5	2	1.3	2	1.3		152	

Tabel 10.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal #	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorrhoe																						
Syf.: Pr. & S.																						
Chlamydia			2	50.0	2	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
herpes genitalis			.	.	1	50.0	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
genitale wratten			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	1
overig			.	.	4	36.4	3	27.3	3	27.3	1	9.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
HIV+			.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *			9	6.6	60	44.1	34	25.0	14	10.3	1	0.7	8	5.9	6	4.4	2	1.5	2	1.5		136
<b>TOTAAL</b>			11	7.1	68	43.9	37	23.9	18	11.6	2	1.3	8	5.2	6	3.9	2	1.3	3	1.9		155

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 10.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.													
Chlamydia infectie	5	83.3	.	.	.	.	.	.	1	16.7	.	.	6
Herpes genitalis	1	50.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	2
Genitale wratten	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Overig	9	75.0	.	.	.	.	2	16.7	1	8.3	.	.	12
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	213	74.7	6	2.1	2	0.7	9	3.2	50	17.5	5	1.8	285
<b>TOTAAL</b>	230	74.7	6	1.9	2	0.6	11	3.6	54	17.5	5	1.6	308

Tabel 10.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.									
Chlamydia infectie	1	50.0	.	.	1	50.0	.	.	2
Herpes genitalis									
Genitale wratten									
Overig	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
HIV+									
Nihil	119	80.4	18	22.2	4	2.7	7	4.7	148
<b>TOTAAL</b>	120	78.9	20	13.2	5	3.3	7	4.6	152

Tabel 10.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituuant		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe			.	.	1	100.0	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.									
Chlamydia infectie			.	.	2	100.0	.	.	2
Herpes genitalis									
Genitale wratten									
Overig									
HIV+									
Nihil			10	7.1	125	88.7	6	4.3	141
<b>TOTAAL</b>			10	6.9	128	88.9	6	4.2	144

Tabel 10.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	.	.	4	100.0	.	.	4
Syfilis: Prim. & Sec.									
Chlamydia infectie									
Herpes genitalis	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Genitale wratten	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Overig	1	11.1	.	.	8	88.9	.	.	9
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	3	2.3	.	.	121	93.8	5	3.9	129
<b>TOTAAL</b>	4	2.7	.	.	137	93.8	5	3.4	146

Tabel 10.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>							
Gonorroë	1	100.0	.	.	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.							
Chlamydia infectie	1	16.7	5	83.3	.	.	6
Herpes genitalis	2	100.0	.	.	.	.	2
Genitale wratten	.	.	1	100.0	.	.	1
Overig	4	33.3	8	66.7	.	.	12
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	1
Nihil	43	15.1	225	78.9	17	6.0	285
<b>TOTAAL</b>	51	16.6	239	77.6	18	5.8	308



## **11: GGD Zuidelijk Zuid Limburg**

Tabel 11.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	153	48.26	46	56.10	51	48.57	250	49.60	204	45.54
vrouw	164	51.74	36	43.90	54	51.43	254	50.40	244	54.46
<b>TOTAAL</b>	<b>317</b>	<b>100.00</b>	<b>82</b>	<b>100.00</b>	<b>105</b>	<b>100.00</b>	<b>504</b>	<b>100.00</b>	<b>448</b>	<b>100.00</b>

Tabel 11.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	21	6.62	6	7.32	6	5.71	33	6.55	32	7.13
februari	16	5.05	8	9.76	6	5.71	30	5.95	39	8.69
maart	36	11.36	13	15.85	11	10.48	60	11.90	33	7.35
april	19	5.59	7	8.54	5	4.76	31	6.15	37	8.24
mei	25	7.89	6	7.32	10	9.52	41	8.13	28	6.24
juni	31	9.78	8	9.76	5	4.76	44	8.73	46	10.24
juli	32	10.09	9	10.98	7	6.67	48	9.52	31	6.90
augustus	27	8.52	4	4.88	2	1.90	33	6.55	41	9.13
september	26	8.20	8	9.76	15	14.29	49	9.72	47	10.47
oktober	26	8.20	8	9.76	10	9.52	44	8.73	39	8.69
november	32	10.09	3	3.66	13	12.38	48	9.52	36	8.02
december	26	8.20	2	2.44	15	14.29	43	8.53	40	8.91
<b>TOTAAL</b>	<b>317</b>	<b>100.00</b>	<b>82</b>	<b>100.00</b>	<b>105</b>	<b>100.00</b>	<b>504</b>	<b>100.00</b>	<b>449</b>	<b>100.00</b>

Tabel 11.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>								
SOA-onderzoek	146	58.40	144	56.69	290	57.54	304	67.91
HIV-test	47	18.80	34	13.39	81	16.07	86	19.34
beide	54	21.60	71	27.95	125	24.80	43	9.45
onbekend	3	1.20	5	1.97	8	1.59	15	3.30
<b>TOTAAL</b>	<b>250</b>	<b>100.00</b>	<b>254</b>	<b>100.00</b>	<b>504</b>	<b>100.00</b>	<b>448</b>	<b>100.00</b>

Tabel 11.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1998	totaal 1997
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	77	4	1	82	86
geen SOA onderzoek, HIV negatief	68	1	5	2	76	62
SOA positief, geen HIV test	.	.	7	.	7	.
SOA positief, HIV negatief	211	1	24	5	241	266
SOA negatief, geen HIV test	1	.	.	.	1	.
SOA negatief, HIV positief	10	2	85	.	97	35
TOTAAL	290	81	125	8	504	457

Tabel 11.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	%	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	1	0.40	2	0.79	3	0.60	2	0.45
15-19	7	2.80	35	13.78	42	8.33	45	10.04
20-24	66	26.40	93	36.61	159	31.55	113	25.22
25-29	64	25.60	40	15.75	104	20.63	97	21.65
30-34	34	13.60	37	14.57	71	14.09	66	14.73
35-39	32	12.80	12	4.72	44	8.73	53	11.83
40-44	11	4.40	16	6.30	27	5.36	27	6.03
45-54	30	12.00	15	5.91	45	8.93	30	6.70
>54	4	1.60	2	0.79	6	1.19	12	2.68
??	1	0.40	2	0.79	3	0.60	3	0.67
TOTAAL	250	100.00	254	100.00	504	100.00	448	100.00

Tabel 11.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	232	92.80	244	96.06	476	94.44	418	93.30
Turkije	1	0.40	.	.	1	0.20	1	0.22
Marokko	1	0.40	1	0.39	2	0.40	1	0.22
Sur./ Ant./ Aru.	1	0.40	.	.	1	0.20	.	.
Overig	15	6.00	8	3.15	23	4.56	27	6.03
onbekend	.	.	1	0.39	1	0.20	1	0.22
TOTAAL	250	100.00	254	100.00	504	100.00	448	100.00

Tabel 11.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	199	79.60	161	78.92
homoseksueel	30	12.00	26	12.75
biseksueel	3	1.20	8	3.92
onbekend	18	7.20	9	4.41
<b>TOTAAL</b>	250	100.00	204	100.00

Tabel 11.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitu�e(e)	.	.	29	11.60	29	5.92	50	11.52
prostituant(e)	11	4.58	.	.	11	2.24	11	2.53
geen van beide	216	90.00	214	85.60	430	87.76	359	82.72
onbekend	13	5.42	7	2.80	20	4.08	15	3.22
<b>TOTAAL</b>	240	100.00	250	100.00	490	100.00	434	100.00

Tabel 11.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	1	0.40	2	0.79	3	0.60	60	13.39
ja, ooit twee SOA	39	15.60	29	11.42	68	13.49	.	.
nee	188	75.20	204	80.31	392	77.78	336	75.00
onbekend	22	8.80	19	7.48	41	8.13	52	11.61
<b>TOTAAL</b>	250	100.00	254	100.00	504	100.00	448	100.00

Tabel 11.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

DIAGNOSE	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Gonorrhoe (excl.PVG)	1	0.4	.	.	1	0.2	4	0.9
Gonorrhoe: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	2	0.8	1	0.4	3	0.6	.	.
" : primair	.	.	.	.	.	.	4	0.9
" : secundair	1	0.4	.	.	1	0.2	.	.
" : latens recens	.	.	1	0.4	1	0.2	.	.
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	18	6.9	10	3.8	28	5.4	20	4.4
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	3	1.2	3	0.6	1	0.2
" : primo: HSV type 2	1	0.4	1	0.4	2	0.4	2	0.4
" : recidief	1	0.4	.	.	1	0.2	.	.
Genitale wratten	14	5.4	14	5.4	28	5.4	19	4.2
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	2	0.8	.	.	2	0.4	.	.
Bacteriele Vaginose	1	0.4	2	0.8	3	0.6	7	1.6
Trichomoniasis	.	.	.	.	.	.	1	0.2
Candidiasis	3	1.2	13	5.0	16	3.1	8	1.8
Schaamluis	.	.	.	.	.	.	.	.
Scabies	.	.	.	.	.	.	1	0.2
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	2	0.8	.	.	2	0.4	.	.
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	1	0.4	.	.	1	0.2	.	.
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	47	18.1	45	17.3	92	17.7	67	15.1
HIV -	96	37.1	90	34.6	186	35.8	120	26.2
Nihil *	116	44.8	125	48.1	241	46.4	266	58.7
<b>TOTAAL</b>	259	100	260	100	519	100	453	100

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 11.13a:  
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia	.	.	.	.	5	27.8	5	27.8	4	22.2	3	16.7	.	.	1	5.6	.	.	.	.	18	
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	2	
genitale wratten	.	.	.	.	2	14.3	4	28.6	3	21.4	2	14.3	1	7.1	2	14.3	.	.	.	.	14	
overig	.	.	1	10.0	2	20.0	2	20.0	.	.	1	10.0	2	20.0	2	20.0	.	.	.	.	10	
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	1	
Nihil *	1	0.5	6	2.9	58	28.0	51	24.6	29	14.0	26	12.6	8	3.9	23	11.1	4	1.9	1	0.5	207	
<b>TOTAAL</b>	1	0.4	7	2.8	67	26.4	64	25.2	36	14.2	33	13.0	11	4.3	30	11.8	4	1.6	1	0.4	254	

Tabel 11.13b:  
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syf.: Pr. & S.	.	.	1	10.0	5	50.0	2	20.0	1	10.0	1	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
Chlamydia	.	.	.	.	1	25.0	1	25.0	1	25.0	.	.	1	25.0	.	.	.	.	.	.	.	4
herpes genitalis	.	.	.	.	6	42.9	2	14.3	1	7.1	2	14.3	1	7.1	2	14.3	.	.	.	.	14	
genitale wratten	.	.	.	.	6	42.9	2	14.3	1	7.1	2	14.3	1	7.1	2	14.3	.	.	.	.	14	
overig	.	.	1	5.9	7	41.2	2	11.8	5	29.4	.	.	.	.	1	5.9	1	5.9	.	.	.	17
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	2	0.9	33	15.5	76	35.7	33	15.5	31	14.6	9	4.2	14	6.6	12	5.6	1	0.5	2	0.9	213	
<b>TOTAAL</b>	2	0.8	35	13.6	95	36.8	40	15.5	39	15.1	12	4.7	16	6.2	15	5.8	2	0.8	2	0.8	258	

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 11.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>													
Gonorrhoe	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	27	96.4	.	.	.	.	.	.	1	3.6	.	.	28
Herpes genitalis	6	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
Genitale wratten	23	82.1	.	.	1	3.6	.	.	4	14.3	.	.	28
Overig	25	92.6	.	.	.	.	.	.	2	7.4	.	.	27
HIV+	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil	400	95.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	16	3.8	1	0.2	420
<b>TOTAAL</b>	483	94.3	1	0.2	2	0.4	1	0.2	24	4.7	1	0.2	512

Tabel 11.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	16	88.9	1	5.6	1	5.6	.	.	18
Herpes genitalis	2	100.0	.	.	.	.	.	.	2
Genitale wratten	11	78.6	2	14.3	1	7.1	.	.	14
Overig	8	80.0	1	10.0	.	.	1	10.0	10
HIV+	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
Nihil	164	79.2	25	12.1	1	0.5	17	8.2	207
<b>TOTAAL</b>	202	79.5	31	12.2	3	1.2	18	7.1	254

Tabel 11.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	.	.	1	5.6	16	88.9	1	5.6	18
Herpes genitalis	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Genitale wratten	.	.	.	.	13	92.9	1	7.1	14
Overig	.	.	.	.	9	90.0	1	10.0	10
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	.	.	10	5.1	177	89.8	10	5.1	197
<b>TOTAAL</b>	.	.	11	4.5	220	90.2	13	5.3	244

Tabel 11.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitué		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorrhoe									
Syfilis: Prim. & Sec.									
Chlamydia infectie	1	10.0	.	.	9	90.0	.	.	10
Herpes genitalis	.	.	.	.	3	75.0	1	25.0	4
Genitale wratten	2	14.3	.	.	12	85.7	.	.	14
Overig	3	17.6	.	.	14	82.4	.	.	17
HIV+									
Nihil	25	12.0	.	.	178	85.2	6	2.9	209
<b>TOTAAL</b>	31	12.2	.	.	216	85.0	7	2.8	254

Tabel 11.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>							
Gonorrhoe	.	.	1	100.0	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	6	21.4	22	78.6	.	.	28
Herpes genitalis	2	33.3	3	50.0	1	16.7	6
Genitale wratten	9	32.1	19	67.9	.	.	28
Overig	4	14.8	22	81.5	1	3.7	27
HIV+	1	100.0	.	.	.	.	1
Nihil	51	12.1	330	78.6	39	9.3	420
<b>TOTAAL</b>	73	14.3	398	77.7	41	8.0	512



**12: GGD Zuid Kennemerland**

Tabel 12.2:  
 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	34	44.74	97	58.43	7	58.33	138	54.33	163	57.60
vrouw	42	55.26	69	41.57	5	41.67	116	45.67	120	42.40
<b>TOTAAL</b>	<b>76</b>	<b>100.00</b>	<b>166</b>	<b>100.00</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>	<b>254</b>	<b>100.00</b>	<b>283</b>	<b>100.00</b>

Tabel 12.3:  
 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

MAAND	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
januari	7	9.09	19	11.45	1	8.33	27	10.59	26	8.97
februari	6	7.79	17	10.24	1	8.33	24	9.41	25	8.62
maart	9	11.69	25	15.06	1	8.33	35	13.73	21	7.24
april	5	6.49	13	7.83	.	.	18	7.06	22	7.59
mei	4	5.19	10	6.02	1	8.33	15	5.88	21	7.24
juni	4	5.19	12	7.23	.	.	16	6.27	28	9.66
juli	12	15.58	11	6.63	.	.	23	9.02	36	12.41
augustus	5	6.49	19	11.45	3	26.00	27	10.59	16	5.52
september	6	7.79	13	7.83	1	8.33	20	7.84	26	8.97
oktober	5	6.49	9	5.42	1	8.33	15	5.88	27	9.31
november	6	7.79	11	6.63	2	16.67	19	7.45	23	7.93
december	8	10.39	7	4.22	1	8.33	16	6.27	19	6.55
<b>TOTAAL</b>	<b>77</b>	<b>100.00</b>	<b>166</b>	<b>100.00</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>	<b>255</b>	<b>100.00</b>	<b>290</b>	<b>100.00</b>

Tabel 12.4a:  
 Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>BEZOEK I.V.M.</b>								
SOA-onderzoek	28	20.29	31	26.72	59	23.23	4	1.41
HIV-test	96	69.57	66	56.90	162	63.78	68	24.03
beide	13	9.42	16	13.79	29	11.42	181	63.96
onbekend	1	0.72	3	2.59	4	1.57	30	10.60
<b>TOTAAL</b>	<b>138</b>	<b>100.00</b>	<b>116</b>	<b>100.00</b>	<b>254</b>	<b>100.00</b>	<b>283</b>	<b>100.00</b>

Tabel 12.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1998	totaal 1997
<b>SOORT ONDERZOEK &amp; UITSLAG</b>						
geen SOA onderzoek, HIV positief						2
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	160	5	1	166	192
SOA positief, geen HIV test	37	1	4	1	43	40
SOA positief, HIV positief						.
SOA positief, HIV negatief	.	.	2	.	2	5
SOA negatief, geen HIV test	23	.	9	2	34	46
SOA negatief, HIV positief						.
SOA negatief, HIV negatief	.	1	9	.	10	5
<b>TOTAAL</b>	<b>60</b>	<b>162</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>255</b>	<b>290</b>

Tabel 12.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LEEFTIJD</b>								
<14	2	1.45	4	3.45	6	2.36	.	.
15-19	4	2.90	11	9.48	15	5.91	23	8.13
20-24	22	15.94	28	24.14	50	19.69	61	21.55
25-29	39	28.26	23	19.83	62	24.41	71	25.09
30-34	25	18.12	26	22.41	51	20.08	46	16.25
35-39	19	13.77	10	8.62	29	11.42	31	10.95
40-44	8	5.80	6	5.17	14	5.51	21	7.42
45-54	7	5.07	6	5.17	13	5.12	25	8.83
>54	10	7.25	1	0.86	11	4.33	4	1.41
??	2	1.45	1	0.86	3	1.18	1	0.35
<b>TOTAAL</b>	<b>138</b>	<b>100.00</b>	<b>116</b>	<b>100.00</b>	<b>254</b>	<b>100.00</b>	<b>283</b>	<b>100.00</b>

Tabel 12.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>LAND V. HERKOMST</b>								
Nederland	130	94.20	106	91.38	236	92.91	263	92.93
Turkije	.	.	1	0.86	1	0.39	1	0.35
Marokko	.	.	1	0.86	1	0.39	2	0.71
Sur./ Ant./ Aru.	1	0.72	.	.	1	0.39	.	.
overig	7	5.07	8	6.90	15	5.91	16	5.65
onbekend	.	.	.	.	.	.	1	0.35
<b>TOTAAL</b>	<b>138</b>	<b>100.00</b>	<b>116</b>	<b>100.00</b>	<b>254</b>	<b>100.00</b>	<b>283</b>	<b>100.00</b>

Tabel 12.7:  
 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%
<b>SEKSUELE GERICHTHEID</b>				
heteroseksueel	114	82.61	138	84.66
homoseksueel	21	15.22	14	8.59
biseksueel	1	0.72	7	4.29
onbekend	2	1.45	4	2.45
<b>TOTAAL</b>	<b>138</b>	<b>100.00</b>	<b>163</b>	<b>100.00</b>

Tabel 12.8:  
 Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>PROSTITUTIE</b>								
prostitu�e(e)	.	.	3	2.61	3	1.20	5	1.81
prostituant(e)	11	8.09	.	.	11	4.38	12	4.33
geen van beide	122	89.71	107	93.04	229	91.24	259	93.50
onbekend	3	2.21	5	4.35	8	3.19	1	0.36
<b>TOTAAL</b>	<b>136</b>	<b>100.00</b>	<b>115</b>	<b>100.00</b>	<b>251</b>	<b>100.00</b>	<b>277</b>	<b>100.00</b>

Tabel 12.10:  
 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>SOA IN ANAMNESE</b>								
ja, ooit een SOA	4	2.90	1	0.86	5	1.97	16	5.65
ja, ooit twee SOA	12	8.70	9	7.76	21	8.27	.	.
nee	119	86.23	101	87.07	220	86.61	.	.
onbekend	3	2.17	5	4.31	8	3.15	267	94.35
<b>TOTAAL</b>	<b>138</b>	<b>100.00</b>	<b>116</b>	<b>100.00</b>	<b>254</b>	<b>100.00</b>	<b>283</b>	<b>100.00</b>

Tabel 12.11:  
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

DIAGNOSE	mannen		vrouwen		totaal 1998		totaal 1997	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Gonorroë (excl.PVG)	3	2.2	.	.	3	1.2	3	1.0
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	2	1.4	4	3.4	6	2.3	4	1.4
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	.	.	.	.	1	0.3
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	1	0.8	1	0.4	.	.
" : primo: HSV type 2	.	.	1	0.8	1	0.4	.	.
" : recidief	.	.	.	.	.	.	3	1.0
Genitale wratten	2	1.4	3	2.5	5	2.0	4	1.4
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	2	1.4	.	.	2	0.8	3	1.0
Bacteriele Vaginose	.	.	6	5.1	6	2.3	16	5.5
Trichomoniasis	.	.	2	1.7	2	0.8	.	.
Candidiasis	5	3.6	2	1.7	7	2.7	10	3.4
Schaamluis	.	.	.	.	.	.	.	.
Scabies	.	.	.	.	.	.	.	.
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	3	2.2	8	6.8	11	4.3	5	1.7
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	.	.	.	.	.	.	2	0.7
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	17	15.6	27	22.9	44	17.2	51	17.7
HIV -	104	75.4	74	62.7	178	69.5	197	67.0
Nihil *	17	12.3	17	14.4	34	13.3	45	15.3
<b>TOTAAL</b>	138	100	118	100	256	100	293	100

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 12.13a:  
 Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	3	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Syf.: Pr. & S.																						
Chlamydia	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	2
herpes genitalis							1	50.0	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
genitale wratten	.	.	.	.	2	20.0	3	30.0	1	10.0	.	.	.	.	2	20.0	.	.	2	20.0	.	10
overig																						
HIV+																						
Nihil *	2	1.7	4	3.3	19	15.7	32	26.4	24	19.8	18	14.9	8	6.6	4	3.3	10	8.3	.	.	.	121
<b>TOTAAL</b>	2	1.4	4	2.9	22	15.9	39	28.3	25	18.1	19	13.8	8	5.8	7	5.1	10	7.2	2	1.4	.	138

Tabel 12.13b:  
 Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	<14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	
<b>DIAGNOSE</b>																						
Gonorrhoe																						
Syf.: Pr. & S.																						
Chlamydia	.	.	2	50.0	2	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
genitale wratten	.	.	.	.	2	66.7	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
overig	.	.	4	22.2	4	22.2	2	11.1	1	5.6	2	11.1	3	16.7	1	5.6	.	.	1	5.6	.	18
HIV+																						
Nihil *	4	4.5	5	5.6	20	22.5	20	22.5	24	27.0	7	7.9	3	3.4	5	5.6	1	1.1	.	.	.	89
<b>TOTAAL</b>	4	3.4	11	9.5	28	24.1	23	19.8	26	22.4	10	8.6	6	5.2	1	0.9	1	0.9	1	0.9	.	116

\*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 12.14:  
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>											
Gonorrhoe	2	66.7	.	.	.	.	.	.	1	33.3	3
Syfilis: Prim. & Sec.											
Chlamydia infectie	5	83.3	1	16.7	.	.	.	.	.	.	6
Herpes genitalis	2	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Genitale wratten	2	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	5
Overig	27	93.1	.	.	.	.	.	.	2	6.9	29
HIV+											
Nihil	195	92.9	.	.	1	0.5	1	0.5	13	6.2	210
<b>TOTAAL</b>	236	92.5	1	0.4	4	0.4	1	0.4	16	6.3	255

Tabel 12.15:  
 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë	1	33.3	2	66.7	.	.	.	.	3
Syfilis: Prim. & Sec.									
Chlamydia infectie	2	100.0	.	.	.	.	.	.	2
Herpes genitalis									
Genitale wratten	1	50.0	1	50.0	.	.	.	.	2
Overig	9	90.0	1	10.0	.	.	.	.	10
HIV+									
Nihil	101	83.5	17	14.0	1	0.8	2	1.7	121
<b>TOTAAL</b>	114	82.6	21	15.2	1	0.7	2	1.4	138

Tabel 12.16a:  
 Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë			1	33.3	2	66.7	.	.	3
Syfilis: Prim. & Sec.									
Chlamydia infectie			.	.	2	100.0	.	.	2
Herpes genitalis									
Genitale wratten			.	.	2	100.0	.	.	2
Overig			2	20.0	8	80.0	.	.	10
HIV+									
Nihil			8	6.7	108	90.8	3	2.5	119
<b>TOTAAL</b>			11	8.1	122	89.7	3	2.2	136

Tabel 12.16b:  
 Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitutée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
<b>DIAGNOSE</b>									
Gonorroë									
Syfilis: Prim. & Sec.									
Chlamydia infectie	.	.	.	.	4	100.0	.	.	4
Herpes genitalis	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Genitale wratten	.	.	.	.	3	100.0	.	.	3
Overig	1	5.6	.	.	16	88.9	1	5.6	18
HIV+									
Nihil	2	2.3	.	.	82	93.2	4	4.5	88
<b>TOTAAL</b>	3	2.6	.	.	107	93.0	5	4.3	115

Tabel 12.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
<b>DIAGNOSE</b>							
Gonorrhoe	3	100.0	.	.	.	.	3
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.					
Chlamydia infectie	1	16.7	5	83.3	.	.	6
Herpes genitalis	.	.	2	100.0	.	.	2
Genitale wratten	1	20.0	4	80.0	.	.	5
Overig	5	17.2	23	79.3	1	3.4	29
HIV+	.	.					
Nihil	17	8.1	186	88.6	7	3.3	210
<b>TOTAAL</b>	<b>27</b>	<b>10.6</b>	<b>220</b>	<b>86.3</b>	<b>8</b>	<b>3.1</b>	<b>255</b>